

పారిశ్రామిక సస్యములు

కర్త

గోపేటి చోగిరాజు

Asst. Director of Agriculture (Retd.)

ప్రకాశకులు

ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ప్రెస్సు

పటమటలంక

పారిశ్రామిక సస్యములు

కర్త

గోపేటి జోగిరాజు

Asst. Director of Agriculture (Retd.)

ప్రకాశకులు

ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ప్రెస్సు

పటమటలంక

హక్కులు
ప్రకాశకులవి

ప్రథమ ముద్ర
1000 ప్రతి

మ ముద్దుల పాటలు

అ త్తో బ రు

1952

వేల
రూ. 3-8-0

సర్వోదయ
పత్రిక



ಶ್ರೀ ಗೊಪೆಟಿ ಚೌಗಿರಾಜು

పీఠిక.

నేను రచింప మొదలుపెట్టిన వ్యవసాయ శాస్త్రమునది
దిది పదునారవ సంపుటము. గ్రామవాసులలో హెచ్చుమంది
వ్యవసాయముపై నాధారపడి యున్న మనదేశమున
పారిశ్రామిక సస్యములను కొన్నిటిని ప్రతిగ్రామమునను
కొంత విస్తీర్ణమున సాగుచేయుచో వానికి సంబంధించిన పరి
శ్రమల మూలమున గ్రామములందు కొన్ని వ్యవసాయేతర
కుటుంబములకు పని గల్గును. తీరిక కాలమున వ్యవసాయ
దారులుకూడ కొన్ని గృహ పరిశ్రమలను గల్పించుకొని
కొంత ధన మార్జించుకొన వచ్చును.

ఆంధ్ర గ్రంథాలయ బ్రహ్మవా రీగ్రంథమును తమ
గ్రామసేవా గ్రంథమాలలో నొకగ్రంథముగ ముద్రించి
నందులకు వారికి కృతజ్ఞుడను.

కొం డే వ రం }
తూర్పు గోదావరి జిల్లా }

గో ఫే టి జో గి రా జు
3-10-52

విషయ సూచిక

పుటలు

ప్రాతీక - పారిశ్రామిక స్వయంలన శాస్త్రీయ-వానివర్గీకరణము,

1, 2,

I నా ర పై రు లు

నాగననుసులందరి భేదములు - దూది, నాగ, కీచు వర్తమాలు. వానినొసగు ముఖ్యభాగాలు:- దూది లేక నాగ యేచల యొక్క సంఘటనము - సెల్యులోసు, అందరి ప్రధానద్రవ్యము - సెల్యులోసు ఉపయోగము.

3—6

1. ప్రత్తి-పారిశ్రామిక స్వయంలన దానిప్రాముఖ్యత-

6

చరిత్ర, వ్యాపకము:- ప్రత్తిసాగు విస్తీర్ణము - ప్రపంచమున - ఇండియాలో - పెన్నరాష్ట్రమున-తెలంగాణలో.

7—10

యొక్కయొక్క లక్షణములు - వివిధాంగముల స్వభావము - అయూరకములగు నీలిలో భేదములు.

10—14

గక భేదములు, వాని వర్గీకరణము - జీవీయరకములు - శెట్ల ప్రత్తిగకములు - యొక్క ప్రత్తిగకములు - ప్రాంతీయ వ్యాపార నామములు - పడమటి ప్రాంతపు ప్రత్తిరకములు (Westerns) - ఉత్తరాది ప్రత్తిరకములు (Northerns) - కాకినాడ ప్రత్తిరకములు (Cocanadas) - ఇతర రాష్ట్రము లందరి ప్రాంతీయ గకములు-అమెరికా రకములు-చాల భాగము ఏకవార్షికముగ సాగుచేయబడునది - కొన్ని బహువార్షికములు - తెలంగాణ జిల్లాలలో ఏకవార్షికములగు సాగునందున్న ముఖ్యరకములు-జవారిప్రత్తి - మంగారిప్రత్తి-కర్నూలు శెట్లప్రత్తి-కర్నూలుఎర్రప్రత్తి-కోస్తా జిల్లాల యొక్క ప్రత్తి-వరంగల్ ప్రత్తి - చిన్నప్రత్తి-కంభోడియ ప్రత్తి-అయూరకములందరి ముఖ్య కంకడములు - ఇండియాలో పశ్చిమ,

పశ్చిమోత్తర ప్రాంతములందు సాగునంగున్న యితర అపేరికా ప్రత్తికములు - బహువారి కముగ బెంచబడు ప్రత్తికములు - కొండప్రత్తి - పైడిప్రత్తి - పెద్దప్రత్తి - జడప్రత్తి.

14—35

ప్రత్తికనుకూలముగు బరిసితులు: సస్యము బాగుగ పెరిగి ఫలించుటకు తగిన ఉష్ణత-వర్షపాతము - అద్విత-మెట్ల నేలలు - నోట నేలలు - మాగాణిభూములు-అయా పరిసితులలో ప్రత్తిని విత్తదగు కాలములు.

36—38

పరివర్తనములు, మిశ్రణములు :- వర్షాధాగపు పంటకు - పెనుక శేసి విస్త్రుప్రత్తికి - పరివర్తనము వేయదగిన ముఖ్యసస్యములు - వానియొగ్గతా శోధములు - తేవడి నేలలకు దగిన యొక మామరి పరివర్తనము, మిశ్రణములు - తొలకరిని విస్త్రుప్రత్తికి - తేవడి నేలలందు - ఇంచులకు దగిన పరివర్తనములు - మిశ్రణములు - ప్రత్తిని మిశ్రణముగ సాగుచేయుట వలని లాభము - నీరుపెట్టి సాగుచేయుచో ప్రత్యేకపుసాగుయొక్క అనుకూలత - పరివర్తనము.

38—41

సాగువిధానములు - ఈదేశపు నేవ్యసాంప్రదాయముల అనుకూలత - కొందరు పాశ్చాత్య ప్రసిద్ధుల ప్రకారం - అయా పరిసితులందవలంబింప దగిన విధానములు - A. వర్షాధారమున 'పెనుక శేసి విస్త్రుప్రత్తి' - గుక్కి - గరుపకొడి నేలలలో-తేవడి నేలలలో-యెరువువేయుట-నేరుగ నీసస్యము నకు వేయుట-పెనుకటిసస్యమునకే వేయుట-విస్తుట-గొర్రునో-నాగటిచాలున-గొర్రునో వేసినపుడు చేయదగిన అంతరకృషి - విస్తులను నాగటి చాలున వేసినపుడు చేయదగిన అంతరకృషి. ప్రత్తి నేరుట - గుబడియంచనా - తేవడినేలలందు ప్రత్తి సాగువలని యాదాయవ్యయముల యంచనా - ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుచో - మిశ్రణముగ సాగుచేయుచో. B. తొలకరిని విత్తి సాగుచేయువిధానములు:-గుక్కి వర్షారా పనులు - విస్తుట-ఉత్తరకృషి-ప్రత్తి గుబడి- గరుపకొడి నేలలపై సాగు వలని ఆదాయవ్యయముల యంచనా. C. మాగాణిభూములందు

(Hemp) - విరివిగ నుత్పత్తియగు ప్రాంతములు - ఉపయోగము. (3) జీలగ, బెండ, తుత్తురబెండ.

122—125

7. కాండపు పట్టనుండి నారతీయదగు బహువార్షిక జాతులు:- (1) ర్హియా (Rhea) - దీనినాఁడే 'రామీ' నార - మొక్కస్వభావము - మొక్కలు పెరుగుచోట్లు - నారతీయు విధానము - యంత్రసహాయమున - నారయొక్క ఉపయోగము. (2) జిల్లేడు - నారతీయు విధానము - ఉపయోగము. (3) మెగలి - 'చల్ల' (చూడఁ) నుండి తీయబడు నార - ఉపయోగము. (4) అడ్డ, సోమింత, పాలకాడ.

126—128

8. కీత్తనార:- ఈ గణపు మొక్కల లక్షణములు - ఇందలి ముఖ్యజాతులు - అమెరికా కీత్తనార - సామాన్యజాతి నిలుపుటాకుల కీత్తనార - బొంబాయి కీత్తనార - యొకటాన్, లేక సిస్లో కీత్తనార - కీత్తనార సాగునకు దగినపరిస్థితులు - యంత్ర సహాయమున నారతీయుటకు విరివిగ సాగుచేయు విధానము - నారదీగుబడి - సిస్లో నారయొక్క విశిష్టత - నారి యుపయోగము.

128—135

9. మట్టలనుండి తీయబడు నితర జాతుల నారలు :- (1) మోరీసునార - మొక్క స్వభావము - విరివిగ బెంచబడు ప్రదేశములు. (2) సాగనార - మొక్కయొక్క స్వభావము - పెరుగుచోట్లు. (3) అనాసనార - దీనిశ్రేష్టత.

136—139

10. అరటినార - ఇంగులకు దగిన ప్రత్యేక రకము మన్నిల్లా అరటి - మన్నిల్లానార హెచ్చుగ ఉత్పత్తియగు ప్రదేశములు - లోటలను బెంచు విధానము - యంత్రసహాయమున నారతీయు విధానము - నారయుపయోగము.

140—142

11. తాటినార - నల్గు - వాని యుపయోగము - బొండునార - దానియుపయోగము - జవటలనార - ఈనాగ వొసగు జవటలను గోయు చెట్ల యుక్తవయసు - వయసు వృద్ధులను చిట్టి నారయొక్క గుణ్యతాభేదములు - నారను దీయు విధానము.

నము - ముడి నాకను గొని సాపుచేయుట - తరగతి వారీ
విభజన - నారకు నంగు వేయుట - ఇందులకు పయోగింప
బడు ద్రవ్యములు - యెగుమతి విధానము - నారనుదీయుటకు
వలయుపాటు - నారదిగుబడి - అదాయ వ్యయములు - ముడి
నార తీయువానికి - సాపుచేసి విక్రయించు వాని - అదాయ
వ్యయములు - ఆంధ్రదేశమున యీ నార పరిశ్రమ హెచ్చుగ
గల ప్రదేశములు - ఎగుమతి రేవులు - గమ్యస్థానములు -
జవట నార యొక్క ఉపయోగము - తాటియాకులు వైరాల
యితర యుపయోగములు.

143—150

12. కొబ్బరిపీచు:- పీచునొసగు జాతులలో కొబ్బరి
డొక్క ముఖ్యము - పీచునొసగు నితరజాతులు - ఆంధ్రదేశ
మున డొక్కలనుండి పీచును దీసి త్రాళ్లనువేయు విధానము -
డొక్కలనుండి పీచునుబడి - పలయుపాటు పీచును దీయు
టకు - పురిపేనుటకు - త్రాళ్లను వేయుటకు - ముప్పేట
సన్నత్రాడు - తొమ్మిదిపేటల లావుత్రాడు - చొప్పత్రాడు -
పిని గిట్టుబాటు లెక్కలు - పడమటి తీరమున కొబ్బరిపీచు
పరిశ్రమ వికరములు - డొక్కల నూరవేయువిధానము -
ఇటూరవేసి తీసిన పీచుశ్రేణు - రాట్నములతో పురిపేనుట
త్రాళ్లను వేయుట - దీనికిని చేతితో నిపనులను వేయుటకును
గల గిట్టుబాటు భేదములు - కొబ్బరిపీచు, పురిత్రాళ్లు వైరాల
యొపయోగము - ఎగుమతి - ఆంధ్రదేశమున - పశ్చిమ
తీరమున - విదేశముల కెగుమతియగు పీచు, పురి, త్రాళ్ల తర
గతులు - చెన్నరాష్ట్రమునుండి యెగుమతియగు దినుసుల
పరిమితులు.

150—160

13. నారతో గూడిన యితర దినుసుల నొసగు
జాతులు:- (1) ఈత, ఖరూర - అరుదుండి చాపలయల్లిక -
అకులు రెల చిని జావ్వలతో తట్టలు వైరాల యల్లిక.
(2) పేము - బెత్తములతో లేక వానిచీలికలు లేక పేళ్లతో
బుట్టలు, పెట్టెలు వైరాల నల్లుట - చేతికర్రలు తయారు

చేయుట. (3) పెదరు - ఈ పేర్లతో చాపలు, తడకలు, బుట్టలు, వస్త్రాల నలుట - పెదరుగడల నట్లె ఉపయోగించు పనులు - కాగితపు పరిశ్రమయందు పెదర్ల ప్రాధాన్యత. (౪) కాగితపు పరిశ్రమ వస్త్రాల కుపయోగించు ఇతర కృణ జాతులు:- వరిగడ్డి - అరిగడ్డి - ముంజిగడ్డి - అవురు గడ్డి. (౫) తుంగ:- ఈ కాడలతో చాపలనేత- ఇందులకుగాను ఒక జాతి తుంగను బ్రత్యేకముక బెంచువిధానము - అంగువలని యాదాయక్యములు. (౬) జమ్మ:- ఈ యాకుల నెండించి గూడలను చాపలను నేయుట.

161—167

14. పట్టుపురుగులను బెంచుట కుపచరించు జాతులు:- ఆమాదము-తూలికి - ఆ యా నార ఓనుసుల ఓగుడి బలమును తెలుపు పట్టిక.

168—171

II చమురు దినుసులు

గింజలనుండి చమురు రీయబడు ముఖ్యజాతులు - చమురుల వర్గీకరణము - అశోవక స్థిరతైలములు - శోవక స్థిర తైలములు - స్థిరతైలములు-స్థిర తైలములను దీయువిధానములు - స్థిర అస్థిరతైలములకు సంబంధించిన ముఖ్య పరిశ్రమలు - వన స్పృతిపరిశ్రమ - వర్ణలేపన, వార్నిషు పరిశ్రమలు - పరిమళ ద్రవ్య పరిశ్రమ - ఆయా పరిశ్రమల కుపచరించు చమురుల వాసన జాతులు:-

171—189

A. అశోవక స్థిర తైలముల నెనగునవి :-

i. ఏక వార్నిక జాతులు :-

1. వేరునెనగ - సాగు విస్తీర్ణము - ఉత్పత్తియగు గింజలు - చమురు - వేరునెనగనూనెకు సంబంధించిన ముఖ్య పరిశ్రమలు :- వనస్పతి పరిశ్రమ ప్రధానము.

189—193

2. ఆముదము - సాగు, విస్తీర్ణము - ఉత్పత్తి - గింజలు,
చమురు - తత్సంబంధ మగు పరిశ్రమలు - కంచెన చమురు
పరిశ్రమ ప్రధానము. 193—196

3. ఆశోషకస్థిరతైలముల నొసగు నితర జాతులు,
ఆచమురుల యుపయోగము - నూపు-ఆక-కలిసె-తునుంబా -
ప్రత్తి - సోయఅనుము. - ముల్లంగి వనైరా. 197—204

ii. బహువార్షిక జాతులు :-

1. కొబ్బెర - తోటల విస్తీర్ణము - ఉత్పత్తియగు
కొబ్బెర, కొబ్బెరనూనె - తత్సంబంధమగు పరిశ్రమలు. 204—209

2. జీడిమామిడి - తోటల విస్తీర్ణము - గింజలు
యుత్పత్తి, వీనినుండి పప్పుతీయు పరిశ్రమ - గింజల నగుమతి -
పప్పు యెగుమతి - గొల్లచమురు పరిశ్రమ - నీనియభివృద్ధి -
వర్జతు పరిశ్రమకు గల యవకాశములు. 209—214

3. ఆశోషకస్థిరతైలముల నొసగు నితర వృక్షజాతులు:-
వానిచమురుల యుపయోగము - ఇప్ప - వేప - బూరుగ,
మునగ వనైరాలు. 214—215

B. శోషక స్థిరతైలముల నొసగు జాతులు :-

i ఏకవార్షికములు:-

1. సీమయవినె - సాగువిస్తీర్ణము-ఉత్పత్తియగు గింజలు,
చమురు - వర్ణలేపన, వార్షికు పరిశ్రమలయందు నీని ప్రాము
ఖ్యత-దీనిశోషక స్వభావమును హెచ్చించు విధానము. 215—218

2. ఇతర యేకవార్షిక జాతులు, వాని చమురుల
యుపయోగము:- పొగాకు (గింజలు) - ఆభిని (గంజసాలు)-
గంజాయి (గింజలు)-నూర్యకాంతము వనైరా. 218—221

ii శోషకస్థిరతైలముల నొసగు బహువార్షిక జాతులు:-
ఆడవిగోరింట (కర్ర)-కర్రనూనె నొసగు నితరజాతులు-పొన్న
(గింజలు) - పెద్దనేపాళము. 221—222

C. అస్థిర పరిమళ తైలముల నైసగు జాతులు :-

i. కాండము లేక వేళ్లనుండియు పరిమళ తైలములు
దీయబడునవి :- చందము - లేవదారు - హృత్తికర్పూరము -
ఆవురు (కట్టివేళ్లు)-దాల్చిని (పట్ట). 222—227

ii. ఆకుల నుండి, పుష్పపత్రములనుండి పరిమళతైలములు
దీయబడునవి :- గంధతృణజాతులు - నిమ్మగడ్డి - కామంది
గడ్డి వైరా - యూకలిప్టస్ - గులాబీ - మసాలా - నారింజ
గణము నందలి జాతులు - మొగలి - గుల్మబీ - మాలతీ -
పన్నీరు - లవండరు వైరా. 227—231

iii. కాయల నుండియు, గింజలనుండియు పరిమళతైల
ములు దీయబడునవి :- ఏలకులు - మిరియాలు వైరా పరిమళ
ద్రవ్యములు - సంభాగములు-కాపత్రి, నారి-జండ్ల తొక్కలు
వైరాలు 231—232

అయాచమురు గినుసుల తాగితమ్య గరిమ - సిరతైల
ములు - అస్థిర తైలములు. 232—233

III ఇతర పారిశ్రామిక సస్యములు

రంగుద్రవ్యముల నొసగునవి - చక్క సంస్కారక
ద్రవ్యముల నొసగునవి - జిగురులు, స్వజములు, పాల
పేరుడులు (Latex Coagulumes) వైరాలు నొసగునవి.
రంగు పరిశ్రమ ప్రాచీనత - కృతకరంగు ద్రవ్యముల మూల
మున చెట్టుచేమలనుండి లభించు రంగుద్రవ్యముల ప్రాధాన్యత
తగ్గుట - జంతుచ్ఛేదములను సంస్కరించు విధానములు -
తానినయ్యతములగు కొన్ని జాతుల పట్టలు, కాయల మూల
మున - కొన్నిగసాయనిక ద్రవ్యముల మూలమున - కొన్ని
చిమురు గినుసుల మూలమున - జిగురులు - వాని స్వభావభేద
ములు - ఉపయోగము - స్వజములు - వాని స్వభావ భేద
ములు - ఉపయోగము, 234—240

A. రంగుద్రవ్యముల నెసగు ముఖ్యజాతులు:-

అద్రవ్యములలోగల యంగములు - వ్యభేదములు - రంగు
వేయుటకుదోడ్పడు దంశక ద్రవ్యములు - రంగులవేయు
విధాన భేదములు.

240—243

1. నీలి :- చరేత్ర, వ్యాపకము - నీలిమొక్క లక్షణ
ములు - రకములు - సాగున కనుకూలమగు పరిస్థితులు - సేవ్య
విధానము - మెట్ట నేలలందు - మాగాణి పోలములందు -
నీలిచేల యర్హములు - కోత - రొట్టడిగుబడి - నీలిమందును
దీయుటకు వలయు తొట్ల వస్త్రాల నిర్మాణము - తొట్లలో
రొట్ట నూరవేయుట - ఊరిన నీటినిచిలికి నీలిమందును దయ్యారు
చేయుట - నీలిమందు సంఘట్టనము - రొట్టయారిన నీటిలో
నగి జనించువిధము - మంటి గోలెములలో గృహపరిశ్రమగ
నీలిమందు దీయుట - నీలిమందు వ్యాపారము, వినియోగము -
నీలిరంగు వేయు విధానము - నీలిమందు యితర ఉపయోగము -
ఊర వేసి తీసినరొట్ట యెరువుగ నుపయోగించుట.

244—259

2. ఆకులనుండి రంగుద్రవ్యము లభించు నితరజాతులు,
వాని రంగుల యుపయోగము:- గోరింట - అడ్డసరము.

259—262

3. కుసుంబా (పూవు) :- దీనినుండి లభించు రంగు
ద్రవ్యము - దానిని తీయుట - దానితో రంగువేయుట -
పూవు యెగుమతి.

262—264

4. పూవులనుండి రంగుద్రవ్యము లభించు నితర
జాతులు, అవి యొసగు రంగుల వివరములు :- కుంకుమ
(పూవు) - మోడుగ-బాడిద - నీలగోరింట - నంగివృక్షము -
పారిజాతము - మెట్టతామర .

265—268

5. జాఫరా - అదియొసగు రంగుద్రవ్యము - దానిని
దీయుట - దానితో రంగువేయుట - వైద్యమున జాఫరా
గింజల యుపయోగము.

268—272

6. గింజలు లేక కాయలనుండి రంగు లభించు నితర జాతులు:- తంబిప- బండిగురివింద - గురివింద-నందివృక్షము - కుంకుమ లేక కపిలవృక్షము - నల్లబీడి - కొబ్బెర (గొక్క) - కరక కాయలు వస్త్రైరా. 272—274

7. పసుపు:- దీనితో రంగువేయు విధానము - చాయ పసుపు - కూరపసుపు - గుంపపసుపు - పసుపుగణ్యత - దానిని నిర్ణయించు పరిస్థితులు-పసుపుయొక్క యితరోపయోగములు. 274—277

8. తొగరు:- ఈ చెట్టులక్షణములు - ఇందలి రెండు జాతులు - ఈ పట్టతో రంగువేయుట. 277—279

9. చిరువేరు లేక చాయవేరు :- చరిత్ర, వ్యాపకము - మొక్కయొక్క స్వభావము - సాగున కనుకూలమగు పరిస్థితులు, సాగువిధానము - అదాయవ్యయములు - ఈ వేర్లతో రంగువేయుట. 279—283

10. కాండమునుండియు వేళ్ళనుండియు రంగుద్రవ్యములు లభించు నితరజాతులు, అవియొసగు రంగుల వివరములు:- మంజిష్ఠ - రక్తచందనము-పతంగ- పనస - ఇరర చూమిడి - తెలిచండ్ర - నల్లచండ్ర లేక కాచుతుమ్మ. 283 - 285

B. చర్మసంస్కారక ద్రవ్యములు వానియొసగు జాతులు:-

చర్మసంస్కారము వలని ప్రయోజనములు - చర్మ సంస్కార విధానము - గ్రామములంగు - కార్మానాలలో - ఊగవేయుట - మాంసఖండములను, క్రొవ్వు వస్త్రాలను గోకివేయుట- సున్నపు నీటిలో నూరబెట్టి రోములను గోకి వేయుట - సంస్కారక ద్రవ్యముల నూరవేసిన నీటిలో నూరబెట్టుట - చమురురాచి రుద్దుట - ముడుతలు లేకుండ సాపుచేయుట - వైవిధ్యమున సంస్కారమువలని రంగుమార్పు ఇతర రంగులను వేయుట. 286 - 289

i. చర్మసంస్కారమున కుపయోగించు అయ బాతుల
పట్ట లేక కర్ర, నేల తంకేడు పట్ట - నల్లతుమ్మ చెక్క -
నీమతుమ్మ (Wattles) చెక్క - జీడిమామిడిపట్ట -
నల్లచంద్రకర్ర - చంద్రకర్ర - పెద్దయునిరికపట్ట - నేలేడు
పట్ట - మడపట్ట - తుమ్మికపట్ట - ఓకు (Oak) పట్ట. 283—294

ii. చర్మసంస్కారమున కుపయోగించు కాయల నొసగు
జాతులు:- కరిక - తాడి - ఓడివి - పతంగ - పోక. 294—299

C. జిగురులు, సర్జములు, పాలపేరుడులు - వాని

నొసగు జాతులు:-

i. జిగురులు, అందలి భేదములు, జిగురుల నొసగు
ముఖ్యజాతులు:- తుమ్మ - వెలగ - దిరిసెన - ఇప్పవనైరా. 299—301

ii. సర్జములు వాని స్వభావభేదములు:- జిగురు సర్జ
ములు - చమరు సర్జములు - వాని వివిధోపయోగములు -
ధూపద్రవ్యములుగ - అగరుక్షత్తులు వనైరాలుగ - సంబార
ముగ - రంగుద్రవ్యములుగ - లేపనములుగ - వార్షిక్షులకు.
సర్జముల నొసగుముఖ్యజాతులు:- 1. గుగ్గిలము - గుగ్గిలమువంటి
సర్జముల నొసగు నితర జాతులు - అందుగ-కుందురుష్క-
మహిసాక్షి - నల్లదామర 2. సాంబ్రాణి - నీమసాంబ్రాణి
3. అగరుజాతులు - అగరుక్షత్తుల పరిశ్రమ కుపయోగించు
నితర ద్రవ్యములు 4. ఇంగువ 5. కాంఘోజి- రంగుల నొసగు
ఈగణమునందలి యితరజాతులు-మంగూస్థాన్ - ఇవరమామిడి
6. ఆరళూస - చమరు సర్జములలో ముఖ్యము - దీనిని దీయు
విధానము - దీనియుపయోగము-టంకద్రవ్యముగ -సబ్బులకు-
వర్ణలేపనములకు- వార్షిక్షులకు - చమరు సర్జములుగల యితర
జాతులు 7. దామర - చమరు సర్జములుగల యితరజాతులు

8. లక్క-దీవియుత్పత్తి కారణమగు కటకము - దాని
కనుకూలించు వృక్షజాతులు - తుసుమ - కేగు - పలాశ్రి -
మోదుగ వగైరా.

302—310

iii. పాలపేరుడులు :- చెట్లనుండిగారు పాల స్వభా
వము - అండలి భేదములు - పాలపేరుడులలో ప్రధానము
రబ్బరు - దీని ముఖ్యలక్షణము - స్థితిస్థాపకత్వము - గట్ట
పర్కా - దీని లక్షణములు. రబ్బరు తోటలు - ఇండియాలో
రబ్బరుతోటల విస్తీర్ణము - రబ్బరు జాతులు - పారాగరబ్బరు -
సియారబ్బరు - రబ్బరు నొసగు నితర జాతులు - ఇండియాలో
రబ్బరు ఉత్పత్తి - దాని ముఖ్యోపయోగములు - కృతక
రబ్బరు పోటీ. గట్టపర్కా - అసలు గట్టపర్కా - దాని
యుపయోగములు - దానినొసగు జాతులు విదేశీయులు -
కత్తమందు - దానియుపయోగము - గట్టపర్కా వంటి
ద్రవ్యముల నొసగు నితర జాతులు.

310—316

ప ట ము ల ప ట్టి క

పటపు సంఖ్య	వివరము	పుట
1	ప్రత్తి మొక్క	11
2	ప్రత్తియాకులు	12
3	ప్రత్తిపూవు	13
4	ప్రత్తికాయలు	„
5	ప్రత్తినింజలు, వానిసంఘటియండా దూడియే చలు	14
6	జీశవాళి (ఎర్రప్రత్తి) మొక్క	15
7	అమెరికా (కంబోడియా) ప్రత్తిమొక్క	16
8	మొక్క ప్రత్తియాకు, చేటిక, కాయ చెట్టు ప్రత్తియాకు, చేటిక, కాయ	17
9	అమెరికా (కంబోడియా) ప్రత్తియాకు, చేటిక, కాయ	19
10	అమెరికా (ఈజిప్టు) ప్రత్తియాకు „ „ చేటిక, కాయ	20 21
11	ప్రత్తియాకు మడతపురుగుచే చుట్టబడినది	61
12	ప్రత్తికాండపు నుసిపురుగు	62
13	కాయదొలుపు మచ్చలపురుగు	
14	లేతగులాబీ కాయ దొలుపు పురుగు	63
15	ఎర్రప్రత్తి నల్లులు	„
16	వడలు తెగులుపట్టిన ప్రత్తి మొక్క	64
17	దూడియేకుట	69

18	నూలుతీయుట	70
19	శ్లొబూరుగ యాకు	84
20	శ్లొబూరుగ కాయలగుడ్డి	85
21	నారకొగకు పెంచబడిన జనపచేను	90
22	పూచిన జనప మొక్క తల	91
23	జనప కాయ	92
24	నారకొగకు పెంచబడిన గోగుచేను	105
25	చేళవారినారగోగు అకు, పూవు, కాయ	107
26	కాకిగోగు అకు, కాయ, పూవు	108
27	జాటు రెమ్మ	118
28	జాటు కాయ	119
29	A. జాటు కాయలు - గుండ్రకము	120
	B. ,, కోలరకము	,,
30	సీమయవినె రెమ్మ, పూవులు, కాయ, గింజలు	123
31	గంజాఅకు	125
32	రియా రెమ్మ	126
33	కిత్తనార మొక్క	129
34	యుకటాన్ లేక సిగల్ కిత్తనార మొక్క	130
35	మోగీసు నారగుబ్బలు	136
36	అనాసనోట	139
37	అరటిచెట్టు	140
38	తాటిగోవు	144
39	కొబ్బగబొండ్లపు ఖండదృశ్యము	151
40	ఈత చెట్టు	161
41	పేపయాకు, కాయ	162

42	వెనురుపాద	164
43	తాలిక తుప్పలు	168
44	A. మగన్ వాడీ గానుగ	175
45	B. ,, ,, భండదృశ్యము	176
46	వేరు సెనగ రెమ్మ, కాయలు, గింజలు	191
47	అనుదపుటాకు, కాయ, గింజలు	194
48	అవరెమ్మ - పూవులు, కాయలతో	199
49	వలిసెపూవు (చెండు) గింజ	200
50	కుసుంబా పూవు (చెండు) గింజ	201
51	కొబ్బెరబొండము, లోని భాగములు	206
52	జీడిమామిడి పండు, గింజ	210
53	సీమయవిసె రెమ్మ, కాయ, గింజలు	216
54	మంచిగంధపు రెమ్మ	223
55	వారతికర్పూరపు రెమ్మ	225
56	యూకల్లిప్సస్ రెమ్మ, కాను	228
57	గుర్రబీపూవులు	229
58	మల్లెఅకుట, మొగ్గలు, పూవు	230
59	నీలిరెమ్మ	244
60	కుసుంబాచెండు నందలి యొక విడిపూవు	263
61	జాఫరా రెమ్మ - కాయలు, గెలతో	269
62	పసుపుగుంపలు	275
63	A. తొగరృతకు	278
	B. ,, కానుల గుత్తి	,,
64	చిరివేరు రెమ్మ	280

		పుట
65	నేలతండ్రి రెమ్మ	290
65	a. నల్లతుమ్మ రెమ్మ	291
66	కరక కాయ	296
67	దివి దివి కొమ్మ - కాయలతో	297
68	నల్లతుమ్మ రెమ్మ	300
69	లక్కగూళ్లు కట్టిన యొక కాండ భాగము	309
70	పారారబ్బరు ఆకు	318
71	త్రికోణపు (కత్తిమందు) చెముడు	316

అనుబంధము :

ఈ గ్రంథరచనకు తోడ్పడిన సారస్వతము

పుటలు 317—320

సవరణల పట్టిక *

పుట	పంక్తి	తప్పు, లేక తీసివేయవలసినది	ఒప్పు, లేక చేర్చవలసినది
1	20	పిండివిసరులు	పిండివిసరుట
7	5	సిమ్మట హైందవ	సిమ్మటి హైందవ
11	28	(Monopodial)	(Monopodials)
12	5	(Sympodial)	(Sympodials)
"	23	చీలియుండుటచే	"
	24	3-4 చేటికల	చీలియుండు 3-4 చేటికల
17	9-8 వ పటము	A. మొక్క-ప్రస్థి యాకు, క్రింద	A. మొక్క ప్రస్థి యాకు $\frac{1}{4}$,
"	10	B. చెట్టుప్రస్థి యాకు	B. చెట్టుప్రస్థి యాకు $\frac{1}{4}$,
18		ఉపజాతిలోనిది.*	ఉపజాతిలోనిది.
"		తెలుగు జిల్లాలలోని ఏర్రప్రస్థి	తెలుగు జిల్లాలలోని ఏర్రప్రస్థి*
"	16	బ్రోచ్, ఆర్తి	
"	23	మొక్కలు గురురుగ	మొక్కలలో గురురుగ
19	5 - 9వ పటము క్రింద	అమెరికా (కంబోడియా) ప్రస్థి యాకు,	అమెరికా (కంబోడియా) ప్రస్థి యాకు $\frac{1}{4}$
20	12- 10 వ పటము క్రింద	అమెరికా (ఈజిప్టు) ప్రస్థి యాకు	అమెరికా (ఈజిప్టు) ప్రస్థి యాకు $\frac{1}{4}$

*చదువరు లీ గ్రంథమును జదువ నారంభింపకముందే యీ పట్టిక యందు నూచింపబడిన సవరణలను అయా పుటలయందు చేసికొనవలగును.

పుట పంక్తి తప్పు, లేక తినివేయవలసినది ఒప్పు, లేక చేర్చవలసినది

21	2-		
	10వ	చేటిక 1	చేటిక
	పటము		
	క్రింద		
26	5	అంగుళములుండును	అంగుళముండును.
27	11	దూదియు కావచ్చెను.	దూదియు కావచ్చును.
„	21	వివిధాంశములు	వివిధాంశముల
33	1	యాకులుకొన్ని జీలక	యాకులుకొన్ని చీలక
34	17-		
	2వ	70	25
	కాలము		
35	14	వ్యవకృతములైన	వ్యవహృతములైన
36	5	అ నేలలండిది.	అ నేలలండిది హెచ్చు
		హెచ్చు	అ నేలలండిది హెచ్చు
37	14	యిట్లుబిల్బడు	
		చుండును.	యిట్లు విత్తబడుచుండును.
38	19	హార్చి	హార్చి
39	1	3. వ „	3. వ సంవత్సరము
„	24	పెసర, నెనగను	పెసర. నెనగను
43	9	అని వ్రాసెను *	అని వ్రాసెను *
	24	* He wrote	
		that . . .	* He wrote that
	28	Wheat "	wheat"
44	17	వైయున్నది *	వైయున్నది *
	23	* సామాన్యముగ	* సామాన్యముగ
45	6	* దీనికి పెంటను,	దీనికి పెంటను,
46	6	గ్న హెచ్చినను	హెచ్చినను
47	12	యెడనుగల	యెడనుగల
51	10	ముంగారి, ప్రత్తి	ముంగారి ప్రత్తి

పుట సంక్తి తప్ప, లేక తీసివేయవలసినది ఒప్పు, లేక చేర్చవలసినది

59	13	ఎకరమునకే	ఎకరమునకు
61	16	025 పాడిని	•025 పాడిని
62	11	platyedrma gossylana	Platyderma gossypi- dla
63	4	Oxycaremus	Oxycaremus
,,	19	(C 5 ₂)	C ₅ S ₂
74	11,12	యంత్రములమాన	యంత్రముల మూలమున
80	1	రాష్ట్రములందలి	రాష్ట్రములందలి
		యంత్రము	యంత్రము
,,	2	యొంద తెలుప	దూదిపరిమితి యొంద తెలుప
		బడెను.	బడెను.
83	9	పున్నవైనను	ఉన్నవైనను
,,	19	బెరుగుచున్నది	బెరుగుచున్నది.
85	6	పరుసలుగ	వరుసలుగ
86	2	malbaricum	malabaricum
87	3	Asce -	Asc -
,,	5	తరమగా నగు	తరమ గానగు
,,	7, 8	నిడివిచేత ప్రాకారము	నిడివిచేత ప్రాకారము
88	4	సం - శనిపుష్టి	సం - శనిపుష్టి
89	3	ప్రకృత ప్రధానములు	ప్రకృత ప్రధానములు
91	24	క్రేషముగు	క్రేషముగు
92	26	నేనిన	చేనిన
93	18	కాలమునను, తొల	కాలమునను తొలకరిని,
		కరిని	
,,	29	ముడులుకేరి యుం	ముడులుకేరియు ముడుగు.
		డును	
96	11	తెగులు పట్టని	తెగులు పట్టని
98	5	CaCl ₂	CaCl

పుట పంక్తి తప్పు, లేక తీసివేయవలసినది ఒప్పు, లేక చేర్చవలసినది

219	13	గింజలు	గింజలు
223	12	చందనతైలము,	చందనతైలము
224	2	దాని పరిమళము,	దానిపరిమళము
"	22,	} camphor N.O.	camphor - N. O.
	23		
226	12	Cinnomomum	Cinnamomum
227	15	c. martinii	C. martinii
231	7	Guettarda	Guettarda speciosa
		spesiosa	
"	8	farnesiana	farnesiana
235	6	లక్క కొచ్చియల్	లక్క, కొచ్చియల్
237	3	జుటిన్	జుటిన్
		పాలశేరుడుల	పాలశేరుడులలోనిక్క
		లోని కల్లరబ్బరు	రబ్బరు
241	9	బాఫరా కాయ	బాఫరా గింజలు
242	21	వేయబడు	వేయబడు
249	22	Obsollita	Obsoleta
251	4, 5	నీరుకట్టకుండు	నీరుకట్ట
256	1	(అందలి కాండములలో తేరిన లలో తేరిన దాని)	(అందలి కాండములలో తేరిన దాని)
260	20	సుమారు 400 సం వత్సరములకు	సుమారు 4000 సంవత్సరములకు
261	24	ప్రమానిచెక్కను,	ప్రమాని చెక్కను,
265	3	Crocusativus	Crocus sativus
"	6	(భౌను రు 13 లు)	(భౌను సుమారు రు 250 లు)
266	14	గాననగును, పగుల స్ఫుటముగ	మిగుల స్ఫుటముగ గాననగును.
"	22	ఈ చెట్లపైన మరి కొన్ని	ఈ చెట్లపైనను కొన్ని

పుట సం క్రి తప్ప, లేక తీసి వేయవలసినది బిప్ప, లేక చేర్చవలసినది

266	22	యితర స్వతస్సిద్ధముగ	యితర చెట్లపైనను స్వతస్సిద్ధముగ
,,	27	Erythrinain-dica	Erythrina indica
267	2	నిల్వయుంచు కొని	నిల్వయుంచుకొని
272	4	Polishes	polishes
,,	7	Astringent	Astringent
274	7	Coconut	
274	7	husk:-కొబ్బరి దొక్క	Coconut:- కొబ్బరి దొక్క (husk)
288	16	ఊదాసిందూర వర్ణము	ఊదా, సిందూరవర్ణము
288	16	ఇట్లు మృదువైన చెర్మములు	ఇట్టిచెర్మములు
292	5	acacia	—Acacia
294	18	myrabolam Terminalia	myrabolam - Terminalia
298	22	Betelnut	
		Areca	Betelnut - Areca
302	1	స్వజములు వానినొసగు	స్వజములు, వాని నొసగు
,,	6	స్వజములు గొప్ప	స్వజములు కొద్ది గొప్ప
,,	9	Oleoresins	Oleo - resins
304	18	ధూపమున	ధూపమున
306	11	కృతకపరిశ్రమ	కృతక పరిశ్రమ
309	14	చున్నది	చున్నది.
311	6	మొదలగు పాలి	మొదలగు బాతుల పాలులును
312	5	వస్తువులుగ	వస్తువులు & వినరులు
,,	,,	చేయబడుచున్నది.	చేయబడుచున్నది. యిటీవల
,,	12	ఇది	కాశము

పుట	సంక్తి	తప్పు, లేక తీసివేయవలసినది	ఒప్పు, లేక చేర్చవలసినది
313	25	మొగంటు	మొగ్గంటు
315	5	యానవాహన	యానసాధన
,,	7	Valknite	Vulcanite
316	9	euphorbia	Euphorbia
	22	Chikle gum	Chickle gum

ప్రావేశిక

బట్టలు, గోనెసంచులు, కాగితములు, చాపలు, రంగులు, సబ్బులు, అత్తరువులు, మోటారు టైర్లు మొదలగు సరకులను దయారు చేయుటకు బనికీవచ్చు ముడివస్తువుల నెసగు సస్యములు పారిశ్రామిక సస్యము లనబడును. కొన్ని పారిశ్రామిక ద్రవ్యములు ప్రత్యేకముగ సాగుచేయబడు సస్యములనుండి లభించుచున్నవి. కొన్ని సస్యముగ బేరుగు చెట్టుచేమలనుండి లభించుచున్నవి.

పారిశ్రామిక ద్రవ్యములను దినుసు స్వభావమును బట్టి యీ క్రింది విధమున మూడు ఋఖిలతరగతులుగ విభజింపవచ్చును.

I నారదినుసులు:—ఉ. ప్రత్తి, గోగు, కత్తివారి, తుంగ వస్త్రాదు.

II చమరు దినుసులు:—ఉ. ఆముదము, సీమయవిసె, నిమ్మగడ్డి, నట్టివేరు, మల్లె వస్త్రాలు.

III ఇతర పారిశ్రామిక ద్రవ్యములు:—ఇందు రంగు ద్రవ్యములు, జిగురుద్రవ్యములు వస్త్రాదు ఇతర ద్రవ్యములన్నియు చేరును. ఉ. నీలి, దివిడివి, తుమ్మ, చిబ్బరు వస్త్రాలు.

పై మూడు తరగతుల పారిశ్రామిక ద్రవ్యములే కాక ప్రధానముగ నాహార ద్రవ్యములుగ సరిగణింపబడు వస్తు, గోధుమలు మొదలగు కొన్ని తృణధాన్యములను కాయధాన్యములను గూడ ధాన్యపు దంపు, పిండి విసరులు యను దేశవ్యాప్తమగు గృహపరిశ్రమలకేకాక యిటీవల నీ సనులను శ్రేయ యంత్రపరికరములకుగూడ యవకాశము

గలిగించుచున్నవి. పారిశ్రామిక ద్రవ్యములుగ నెంచబడు ఆముదము మొదలగు నాహార యోగ్యముకాని చమురులే కాక నూపు, కొబ్బెర, ఆవ మొదలగు గొన్ని ప్రధానముగ నాహార ద్రవ్యములుగనే యెంచబడు చమురులుగూడ కొన్ని పరిశ్రమల కుపకరించుచున్నవి. చెరుకు వగైరాల నుండి తయారు చేయబడు మరిరెండు ముఖ్యహార ద్రవ్యములగు బెల్లము, చక్కెరయుగూడ దేశవ్యాప్తమగు గృహ యంత్రపరిశ్రమలకు అవకాశము గలిగించుచున్నవి.

విరివిగ నుత్పత్తియగు కొన్ని పండజాతులుకూడ ఇటీవల వానిని వివిధములుగ నిల్వజేయు క్రొత్తపరిశ్రమల కవకాశము గలిగించుచున్నవి. ఆహారద్రవ్యములతో సంబంధించిన యిట్టి పరిశ్రమలను గురించి ఆయా సస్యములను గురించి యిదివరలో ప్రచురింపబడిన సంపుటములందు సందర్భానుసారముగ దెలుపబడెను. ఈ సంపుటమున ప్రధానముగ పరిశ్రమలకే యుపయోగింపబడు ముఖ్యద్రవ్యముల నెసగు జాతులను గురించి మాత్రమే వివరింపబడును.

ఇండియాలో ఆయా రాష్ట్రములందలి పారిశ్రామిక సస్యములు సాగుచేయబడుచున్న మొత్తపు విస్తీర్ణములను దెలుపు అంకెలు లభింపలేదు. చెన్నరాజధానిలో నైనను నారపైరులకును రంగుదనుసుల నెసగు సస్యములకును సంబంధించిన సస్యముల విస్తీర్ణములకే లెక్కలు ప్రత్యేకము గలవు. ఆయా ముఖ్యపారిశ్రామిక సస్యముల విస్తీర్ణములు ముందు సందర్భాను సారముగ దెలుపబడెను.

౧. నార పైరులు

నారపైరుల నవి నెనునగు దినుసులందలి యేచల మృదుత్వమును, పొడవును బట్టి కౌఠ ఉపతరగతులుగ విభజింపవచ్చును. ఏచలు మృదువుగను కురుచగను నుండు దినుసు 'దూది' యన బడును. కొన్ని జాతుల గింజలు గాలికెగిరి, దూరముగ కొట్టుకొని పోవునట్లు చేసి వాని వ్యాపకమునకై ప్రకృతి సిద్ధముగ వానిపై నేర్పడియుండు రోమసమూహమే యిట్లు దూదిగ నుపయోగించునది. దూది నూలుగ వడకబడి బట్టలనేత, నవారు వగైరాలు నేయుటకును, దారము, టైపు, త్రాళ్లు వగైరాలను పేరుట కును, పరుపులు దిండ్లు వగైరాలకును, కొన్ని పరిశ్రమలందును నుపయోగింపబడుచున్నది.

దూది నెనునగుజాతులలో ప్రతి ప్రధానమైనది. బూరుగ చెట్టును, జిల్లేకు తుప్పలును గూడ నొక విధమగు దూది నెనునగును. కాని యీ కాయలందలి దూది ప్రతికాయలందలి దూదివలె దారముగ వడికి బట్టలుగ నేయుటకు బనికిరాదు. సామాన్యముగ పరుపులు దిండ్లు మొదలగు వానిని దయారుచేయుటకు మాత్రముపయోగింప బడుచుండును.

దూది యేచలకంటె మురుగుగను పొడవుగనునుండు యేచలుగల దినుసు నారయనబడును. ఇది సామాన్యముగ కొన్నిజాతుల పట్టనుండి దీయబడుచుండును. నారనెనునగు వార్షిక సస్యములలో ఇండియా మొత్తముపై బంగాళా

గోగు (Jute) ప్రధానమైనది. కాని యిది వంగరాష్ట్రము నందును ఆ పరిసరమునందును మాత్రమే సాగునందున్నది. ఆంధ్రదేశమునందు విరివిగ సాగునందున్న నార పైరులలో గోగు (Deccan hemp) ను జఘము (Sunn hemp) ను ముఖ్యమైనవి. గింజలకై సాగుచేయు అవిసె (Flax) కర్రలనుండియు, మత్తుద్రవ్యముల కొరకు సాగుచేయబడు గంజాయి (Indian hemp) కర్రల నుండియు గూడ కొన్ని రాష్ట్రములందు నారతీయబడుట కలదు. సీమయవిసె రమ్యా మొదలగు కొన్ని విదేశములందు నార కొరకు ప్రత్యేకముగ బెంచబడుచున్నది. అరుదుగ జీలుగ మొదలగు మరికొన్ని యేకవార్షిక జాతుల మొక్కల పట్ట నుండి కూడ నారతీయబడుట కలదు.

కొన్ని బహువార్షిక జాతుల మట్టలు ఆకులు, వగైరాల నుండి గూడ నారతీయబడుచున్నది. ఇట్టి జాతులలో కిత్తనార (American aloe) ప్రధానము. కిత్తనార మొక్కను బోలిన సాగనార మొదలగు మరికొన్ని జాతుల మట్టల (ఆకుల) నుండి కూడ కొన్ని చోట్ల నారతీయబడుచున్నది. అనాసయాకుల నుండియు అరటిడిప్పల (ఆకుల తొడిమల) నుండియుగూడ నారను దీయుటగలదు. తాటి కమ్మల నుండి కూడ పైజాతుల నారకంటె ముదుగుగ నుండు నార లభించుచున్నది. కొబ్బెర డొక్కల (కాయ పైభాగముల) నుండి కూడ పైనారలకంటె కరుచ యేచలుగల నారతీయబడుచు పారిశ్రామికముగ ప్రాముఖ్యత గలిగి

యున్నది. ఇట్లు కురుచ యేచలుగల నార 'పీచు' అని వ్యవహరింపబడుచుండును.

నారలు సామాన్యముగ మురుగు గుడ్డలు, గోనె సంచులు, త్రాళ్లు మొదలగు నానిని నేయుట కుపయోగింపబడుచున్నవి. అరటి, అనాస మొదలగు కొన్నిజాతుల నారనుండి మృదువగు బట్టలను గూడ నేయుచున్నారు. కొబ్బెరపీచుతోను, తాటినారతోను త్రాళ్లుపేయబడుచుండును. కొబ్బెరపీచుతో క్లాఫ్లు తుడుచుకొను చాపలు, మెత్తలు మొదలగునవి జేయబడుచున్నవి. బిరుసగుతాటి యేచలనుండి కుంచెలు వగైరాలు తయారు చేయబడుచున్నవి.

దూది యేచలైనను, నార యేచలైనను ప్రధానముగ $(C_6 H_{10} O_5)_x$ అను సాంకేతికముతో వ్యవహరింపబడు కర్బనము, ఉదజని, ఆమ్లజని అను మూడు మూలద్రవ్యములచే నేర్పడిన సెల్యులోసు (Cellulose) అను పదార్థముచే నేర్పడినవి. ప్రకృతిస్థితిముగ నీ యేచల సంఘటియండు నితర సేంద్రియ నిరింద్రియ ద్రవ్యములను రాసాయనికముగ దొలగించుటవలన స్వచ్ఛమగు సెల్యులోసు తయారుచేయబడి కాగితములు, కృతకపుష్పట్ట, కొన్ని లక్కపూత ద్రవ్యములు (Cellulose lacquers) ఫిల్మ్లు (Films) వగైరా పరిశ్రమలందు ప్రధాన ద్రవ్యముగ నుపయోగింపబడుచున్నది.

పట్టు పురుగులను బెంచి పట్టును దీయు పరిశ్రమను గురించి జంతుకృషి - రెండవభాగమున తెలుపబడును. కాని యీ పురుగులను బెంచుటకు తగిన జాతులను గురించి నార్థవంతలను గూర్చిన యీ భాగమున కడపట తెలుపబడును.

కృతకపుపట్టు (Rayon)ను దీయు దేశములందు కొన్ని జాతుల కర్రయే యిందులకు పయోగింపబడుచున్నది. ఈ దేశమున గూడ నిందులకు బనికడచ్చు వన్యజాతులు కొన్నిగలవు. అందుచే నిటీవల వీరికర్రనుండి కృతకపు పట్టును దీయు పరిశ్రమను నెలకొల్పుటకు యత్నములు జరుగుచున్నవి.

1. ప్రత్తి

Cotton - Gossypium sp. M. O. Malvaceae

హిం. కార్పాస్; కప్పాస్, కొప్పా; ఆ. పరుత్తి; క. హత్తి;
సం. కార్పాసి.

మానవుల జీవితావసరములలో ముఖ్యములు అన్న వస్తువులు. వస్తువుల నేతకుపకరించు ప్రధాన ద్రవ్యమగు దూది సెసగుటచే, ప్రపంచ పారిశ్రామిక సస్యములందు ప్రత్తియే అగ్రస్థానమును వహించుచున్నది.

చరిత్ర; వ్యాపకము

ప్రతి ధర్మతత్వమున మిగుల ప్రాచీన కాలమునుండియు సాగు నందుండిన జాతులలో నొకటిగ నెంచబడుచున్నది. సింధులోయలో నిటీవల బయలుపడిన ప్రాచీన నగరముల శిథిలములందు నాలుగువేల యేండ్ల క్రిందట వడుకబడిన నూలు కనబడెనట. ఋగ్వేదమునను, పిమ్మట హిందవ వాఙ్మయమునను గూడ నూలు బట్టల ప్రశంసగలదు.

ఈదేశమందంత ప్రాచీన కాలమునుండి కాకపోయినను చీనాలో కూడ క్రీస్తునకు పూర్వము నుండియు ప్రతి పెంపకమును, నూలు బట్టల వాడుకయు నుండెను.

ఇతర దేశములలో వీనివాడక వెనుక జేసి ప్రారంభింపబడి యుండెను. దక్షిణ, మధ్య ఆమెరికాలోను, పశ్చిమ యిండియా దీవులలోను అయాప్రాంతములం దైరోపీయులు ప్రవేశింపక పూర్వము నుండియు కొన్ని ప్రతి జాతుల పెంపకమును, నూలుగుడ్డల వాడుకయు నుండెను. ఇంగ్లండు వలెరా విరోపీయ దేశములందీ నూలు గుడ్డల యుపయోగము 15 వ శతాబ్దానంతరమే ప్రారంభమయ్యెను. పిమ్మట ఆమెరికా భిండమును, ఇండియాకు సమద్రయాన మార్గమును కనుగొనబడినప్పటినుండి ఆమెరికా, ఆఫ్రికా భిండములనుండి ప్రత్తిని దెచ్చుకొని నూలు వడికి బట్ట నేసికొనుటయు, ఇండియానుండి బట్టను దిగుమతి చేసికొనుటయు ప్రారంభమయ్యెను. విరోపీయులు క్రమముగ ముఖ్యముగ 18 వ శతాబ్దాంత్యభాగమునుండి - అవిరియంత్రములచే నడుపబడు నవీన సాధనములతో నూలును, గుడ్డలను విరివిగ దయారు చేయుచు నీ పరిశ్రమ యందు ప్రపంచమున సగ్రస్థానము వహించిరి. ఇండియానుండి యంతకు పూర్వము జరుగుచుండిన యీ సరకుల యెగుమతి యగిపోవుటయేకాక, ఇంగ్లండునుండి చౌకగ బట్టలు దిగుమతి చేయబడుటచే నీదేశమున నీ పరిశ్రమ క్రమముగ క్షీణదశకు వచ్చెను.

ఒకప్పుడు ప్రపంచఖ్యాతివడసిన థక్కా మజ్లసులవంటి యతి సున్నితమగు వస్త్రముల యుత్పత్తియు యెగుమలియు నాగిపోయి, సన్ననూలును, బట్టలును విదేశముల నుండి దిగుమతి చేసికొనవలసిన దశ తటస్థించెను.

ప్రత్తి సాగు విస్తీర్ణమున ప్రపంచముంతటికిని అమెరికాసంయుక్త రాష్ట్రము లగ్రస్థానమును వహించుచున్నది. ఇండియా దీని తరువాతిది. ప్రత్తి సాగు మొద్యుగగల ముఖ్యదేశములందలి విస్తీర్ణము లీక్రింద తెలుపబడెను.

దేశము

విస్తీర్ణము

1935-39 సం॥లకు

(ఎకరములు)

అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములు	2,77,40,000
ఇండియా	2,42,00,000
బ్రజిల్	49,00,000
ఈజిప్టు	18,20,000
ఉగాండా	15,40,000
ఆర్జంటీనా	7,60,000
ఆంగ్లో ఈజిప్షన్ సుడాన్	4,40,000
ఆస్ట్రేలియా	60,000

ప్రపంచ మొత్తముమీద నీ విస్తీర్ణమును సుమారు 7 కోట్ల ఎకరములకు మించి యుండునని యంచనా జేయబడుచున్నది.

ఇండియాలో నా యా రాష్ట్రములందలి ప్రత్తి సాగు విస్తీర్ణము లీక్రింద తెలుపబడెను.

రాష్ట్రము	విస్తీర్ణము 1940-41 లో ఎకరములు	విస్తీర్ణము 1945-46 లో ఎకరములు
బొంబాయి	30,05,000	11,05,000
మధ్యరాష్ట్రములు, బీరారు	85,72,000	29,56,000
హైదరాబాద్	84.58 000	21,56 000
పంజాబు (తూర్పు)	5,93,000	3,80,000
,, పశ్చిమ	20,76,000	19,47,000
కేన్సరాష్ట్రము	24 13,000	16 11,000
బొంబాయి సంస్థానములు	18,65,000	9,04 000
మధ్యయిండియా సంస్థానములు	11,34 000	5,05,000
సింధురాష్ట్రము	9,31,000	8.20,000
బరోడా సంస్థానము	8,11,000	4,52,000
గ్వాలియర్ సంస్థానములు	5,66,000	3,73,000
పంజాబు సంస్థానములు (తూర్పు)	3,43,000	2,14,000
,, (పశ్చిమ భావల్పూరు)	3,76,000	3,90,000
రాజపత్ర సంస్థానములు	4,83,000	2,47,000
సంయుక్తరాష్ట్రములు	3,94,000	1,96,000
ఇండియాలోని ఇతర ప్రాంతములు	1,15 000	1,70,000
పాకిస్తాన్ లోని ఇతర ప్రాంతములు	2,43 000	1,45 000
	<u>2,32,00,000</u>	<u>146,42 000</u>
ఇందు పాకిస్తాన్ లో చేరిన విస్తీర్ణములు	36,28,000	33,00,000
ప్రస్తుతపు ఇండియాలో చేరినవిస్తీర్ణములు	<u>1,96,72,000</u>	<u>1,13,42 000</u>

గత సంగ్రామమునకు మార్వకాలమున నిండియా మొత్తముపై ప్రతిసాగు విస్తీర్ణము సుమారు $2\frac{1}{2}$ కోట్ల యెకరములవరకుండెను కాని యుద్ధరవాతి క్రిమముగ వికల్గి 1945-46 నాటికి $1\frac{1}{2}$ కోటి యెకర

* 1950-51లో ఈ విస్తీర్ణము సుమారు 13 మిలియన్ల యెకరము లుండునని యంచనా వేయబడెను.

ములకు లోపునకు దిగిపోయెను. ఇది గాక యిటీవల యిందు మేలు రకములు (అనగా పొడవు యేచగల ఆమెరికా రకములు) వచ్చుగ ఫలించు విస్తీర్ణము పాకిస్థాన్ లో తేరిపోయెను. అందువలన ఇండియా లోని బట్టల మిల్లలకు తగినంత ప్రతి లభింపక గుడ్డలకు గగళర్పడెను.

చెన్నరాష్ట్రమున 1940-41 లో ప్రతి సాగు విస్తీర్ణము 24, 12,000 యెకరము లుండెని పైని తెలుపబడెను. కాని యిటీవల ఆహార ద్రవ్యముల కేర్పడిన కొంతను దీర్చుటకై ప్రభుత్వముచే తేయబడిన కొన్ని నియమముల మూలమున 1947-48 సంవత్సరమునాటికి విస్తీర్ణము 12, 97, 647 ఎకరములకు తగ్గిపోయెను. ఈవధ్య సగటు (Normal) విస్తీర్ణము 20, 22, 940 యెకరములు. 20, 23, 950 యెకరములు తెలుగు జిల్లాలలోనివి. 1947-48లో తెలుగుజిల్లాలలోని విస్తీర్ణము 67, 102 యెకరములు మాత్రమే యుండెను. జిల్లావారీ విస్తీర్ణ మీ క్రింద తెలుపబడెను.

జిల్లా	సగటు విస్తీర్ణము ఎకరములు	విస్తీర్ణము (1947-48) లో ఎకరములు
బళ్లారి	4,67,700	4,19,715
అనంతపురం	1,25,610	81,000
కర్నూలు	1,63,900	70,881
గుంటూరు	57,400	83,571
తెలూరు	32,510	27,300
పడప	59,770	23,328
విశాఖపట్టణం	7,900	4,722
కూర్చుగోదావరి	5,870	2,984
కృష్ణా	4,650	414
పశ్చిమగోదావరి	400	168
చీకూరు	240	23
	9,28,900	6,67,102

మొత్తముమీద తెలుగుజిల్లాలలోని తగ్గుదల, తక్కిన జిల్లాలలో కంటే తక్కువ.

ప్రతిమొక్క లక్షణములు

ప్రతిమొక్క ఉష్ణప్రదేశములందు సహసస్థితిలో బహు వార్షిక గుల్మముగ పెరుగును. కాని సామాన్యముగ నిది యేక వార్షికముగనే సాగుచేయబడుచుండును. 2-8 అడుగుల యెత్తున కగును కీకములుగలవు. బహు వార్షికములుగ బెంచబడు కొన్ని కీకములు 4-6 గజముల యెత్తుగల చిన్న చెట్లుగ పెరుగుట గలగు.

1 వ పలుము

ప్రతిమొక్క పెక్కు కాళులగల నిడివి నైనా తలివేగు లిగి యుండును ఇది యనుకూల పరిస్థితులలో మూడడుగుల లోతు నకుంచిదిగుట గలగు. కాళులు నేల యందలి పై భాగమున కొన్ని యంగుళముల లోతున అన్ని ప్రక్కలకును వ్యాపించి పెరుగును.


ప్రకాండము ముగిరి నపుడు కొద్ది గొప్ప గట్టి బారి నిలువుగ పెరుగును. అనేక కాళులను బెట్టును. ఈ కాళులు పెరతువ కొమ్మలు, పూతకొమ్మలు అని రెండు విధములు. మొక్క క్రిందినుండియు పుట్టి యది విజృంభిం

ప్రతిమొక్క 2

చుటకు దోడ్పడునవి పెరతువ కొమ్మలు. ఇవి నిడివిగ పెరుగును, యెదిగిన కొలదిని ప్రక్కలనుండి రెమ్మలను బెట్టును. ఇట్టి కొమ్మలు ఏక కాండకము (Monopodial) లనబడును. పూత కొమ్మ లిట్లు కాక

కాని కొనలు కొంచె పెరిగినవిమ్మట పెరకువ మానును. ఇటు పెరకువ మానిన కొమ్మనుండి పుట్టు రెమ్మయొక్కటి తల్లికొమ్మకు బగులుగ కొంత యొగి నదియు పెరకువ మానును. ఇట్లాక రెమ్మవెనుక మరియొక్కటి పుట్టి తల్లి రెమ్మస్థాన మాక్రమముట మూలముననే పూరికొమ్మలు పొడవగును. ఇట్టి కొమ్మలు సంయుక్త కాండము (Sympodial) లనబడును. పెరకువకొమ్మలు పూవు. కాని వానినుండి పూత కొమ్మలు పుట్టవచ్చును. పూరికొమ్మలు మొక్క కొంతకాల పెడిగిన వెనుక గాని పుట్టవారంభింపవు.

2 వ పటము



ప్రత్తిగూకులు 1

ఆకులు కాండము


పై కొంటరి చేరిక నమరియుండు లకు ప్రతము ౩. వీని యాకార పరిమాణ ములంగువలె భేదము లుండును. అందులు కొద్దిగొప్ప లోతుగ జీరి యుండుటచే

దశము 3-9 తప్పెలు

గలిగి 2-12 అంగుళములు పొడవును అంతేగాని అంతకుకొంచెము తక్కువ వెడల్పు గాని యుండవచ్చును. తొడిమ దశపుపైజాతు తగినంత నిడివిగనుండును.

పూరికొమ్మల కణుపులంగు ఆకున క్రిందపైపున ఒంటరిగనుండు పూవు బహుళకరము. దీని యడుగున అంచులు కొద్దిగొప్ప చీలి యుండుటచే 3-4 చేటికల కరకుయుండును. వీనిలోపల పచ్చకొళను 5 దశము లేక మైయేగడిన గిన్నెయాపమున నుండును. ఈ కొళనులోపల క్రింది భాగము యొక మైయుండు 5 అక్షరక ప్రతములుండును. ఒవి చాల రకములలో పసి 10 రంగు గలిగి, దిగువభాగమున గొరుపుమచ్చ గలిగి యుండును. కాని యొర్రని పూలుగల రకములును కొంచె మించు మించు తెల్లని పూవులు గల రకములును గలవు. కాని పచ్చపూవులు, వాదిన

వెనుకగూడ వానికి కొద్ది గొప్ప యెరుపురంగు రావచ్చును. కింజల్కము
3 వ పటము



ప్రతిపూవు

లనేకములు. వీనికాడల దిగువ భాగము
లన్నియు కేరి యొక నిడివియైన
గొట్టముగ నేర్పడును. పుప్పొడి తిత్తి
యేకకోశకము. పువ్వుగర్భము
అందలి యండకోశముల కలయికచే నేర్పడి
యుండును. ఈయండకోశముల సంఖ్యయు,
కోట్రమునందలి తమ్మెల సంఖ్యయు కొక
టియే యై యుండును. సామాన్యముగ నివి
మూడై యుండును. ఒక్కొక్క యండకోశ
మున సుమారు 5-17 బీజాండములవరకుండ
వచ్చును. కాయ కొద్దిగొప్ప గుండ్రదేరిగాని,
కోలదేరి గాని క్రిందిభాగమున వట్టువదేరి

యై యునదేరియుండును. కాయపైనందలి గదులసంఖ్యను నూచించు నిలుపు

4 వ పటము



ప్రతికాయలు - పూర్ణాకృతి

రంగుగలిగి యుండును. కొన్నిరకములందీ విత్తులు పైయేచల (రోమముల)ను
దీసివేసిన వెనుక నున్నగ నుండును. కొన్నిటిలో నివి యొక విధమగు
జొచ్చువంటి కురుచ రోమముల (Fuzz) చే గప్పబడియుండును. కొన్ని

(2 A)

గీటుండును. కాయపైకొన్ని రక
ములలో స్ఫుటమైన చమురు
గ్రంధులు చిన్నచిన్న గుంటలుగ
గనబడుచుండును. కాయ ముదిరి
యెండినపుడు పైకోశ సంఖ్యా
నూచకములగు గీట్ల వెంబడి
పగులును. లోన దూది
రోమములచే గప్పబడిన గింజలుం
డును. ఇవి సామాన్యముగ నలుపు

రకముల కాయలలో ఒక్కొక్క యండకోశమునందలి గింజలన్నియు ఒక దాని కొకటి యంటుకొని జడకట్టును. కాని వీనిని నలిపినచో గింజలు సులభముగనే విడిపోవును.

5 వ పటము

ప్రత్తిగింజలు, వానినంటియుండు దూది యేచలు

గింజలపైనుండు దూదియేచలు ఏగుల సూక్ష్మములగు గొట్టపు ఆకృతిగలిగి యుండును. కాని యెండినవెనుక బలపరుపుగ మెలిదిరిగి పోవును. ఒక్కొక్క యేచ 150-300 సార్లు మెలిదిరిగి యుండవచ్చునని రెక్కవేయ బడెను.

రకములు, వాని వర్గీకరణము

ఇండియాలో నాయా ప్రాంతములం దనేక దేశీయరకములును కొన్ని ఆమెరికా రకములును సాగునందున్నవి. ఆయా రకముల మొక్కలెదుగు యెత్తు, కొమ్మల వైఖరి, ఆకుల యొక్కయు, పూవులక్రింది చేతికల యొక్కయు, కాయలయొక్కయు ఆకారాది పరిమాణాది

లక్షణ భేదములనుబట్టి యవి గుర్తింప బడుచున్నవి. ఆ యా రకముల దూదియందలి యేచల పొడవు, మృదుత్వము రంగు మొదలగు లక్షణము లందును, ప్రత్తినుండి దూది దిగుబడియగు ప్రమాణమునందును గూడ వ్యత్యాసములుండును.

6 వ పటము

ప్రత్తిరకములు శాస్త్రజ్ఞులచే ప్రాగర్థ గోళ జాతులు, పశ్చిమార్థ గోళ జాతులు అనిరెండు తరగతులుగా విభజింప బడుచున్నవి. ఈ దేశమున ప్రాగర్థగోళ జాతులు సామాన్యముగా జీయ జాతులనియు, పశ్చిమార్థగోళజాతులు అమెరికా జాతులనియు వ్యవహరింప బడుచుండును. ప్రాగర్థగోళజాతులు 18 వర్ణితంతు ఖండములు (Chromosomes) గలవి. పశ్చిమార్థగోళజాతుల మొక్కలు 26 వర్ణితంతు ఖండములు* గలవి.

జీవవాణి (ఎర్ర) ప్రత్తి మొక్క 1/12

ఇండియాలోని జీయరకములు చెట్టు ప్రత్తిజాతి (Gossypium arboreum) మొక్క ప్రత్తిజాతి (G. herbaceum) అను రెండు

* వీనిని గురించి వ్యవసాయ శాస్త్రము - మొదటి సంపుటమున దెలుపబడెను.

ప్రాగర్థగోళ జాతులకు జెందినవిగ నున్నవి. ఈ దేశమున సాగునందున్న అమెరికా రకములు చాలవరకు (*G. hirsutum*) అను జాతిలోనివి.

7 వ పటము

చెట్టు ప్రత్తి రకములు చాలభాగము ఏకవార్షిక ములగానే బెంచబడుచు న్నవి. ఈ మొక్కలు పెక్కు కాఖలు గలిగి మొక్క ప్రత్తి రకముల కంటె యెక్కుగ నెగుగను. శీర్షము లోతుగ బోవును. కాయలు కొంచెర చిన్నవిగాని మధ్యమపరిమాణము గలిగి గాని యుండును. వీని పైన నేకములగు చమురు గ్రంథి గుంటలుండును.

చెట్టు ప్రత్తి జాతి (*G. arboreum*)లోని

అమెరికా(కంబోడియా) ప్రత్తి మొక్క^{1/12} రకములు మరల


కొన్ని ఉపజాతులుగ విభజింపబడుచున్నవి. కర్నూలు జిల్లాలో సాగు నందున్న ఎర్రప్రత్తి*(*G. arboreum* var. *neglectum* forma *indica*) అను సుషజాతిలో శేర్పబడుచున్నది. మైదరాబాదు రాష్ట్రముందలి వరంగల్ ప్రత్తియు, దక్షిణదేశపు కరంగాడి ప్రత్తియు గూడ వీయుపజాతిలోనివే. తూర్పు కోస్తా జిల్లాలోని చిన్నప్రత్తియు,

* ఇది ఉత్తరాది యెర్రప్రత్తి (Red northrens) అను వ్యాపార నామముతో వ్యవహరింపబడుచున్నది. సామాన్యముగ నిది (*G. Indicum*) అను సంగ్రహ శాస్త్రీయ నామముతో వ్యవహరింపబడుచుండును.


రాయలసీమలో ముంగారి ప్రత్తియు (G. arboreum var. neglectum forma Bengolensis) అను మరియొక ఉపజాతి లోనివిగ నెంచబడుచున్నవి. మధ్యయిండియా లోని మార్బీ, వీరమ్ మొదలగు రకములును, సైద్రాబాద్, బొంబాయి రాష్ట్రము లందు కొన్ని భాగములందును, మధ్యరాష్ట్రములందును ఉప్రూ ప్రత్తి (Oomras) అని వ్యవహరింపబడు రకములును ఉత్తర

8 వ పటము

దేశవారీ ప్రత్తిరక భేదములు



A. మొక్క ప్రత్తియగు, చేటిక, కాను (పూర్ణాకృతి)



B. చెట్టు ప్రత్తియగు, చేటిక, కాను (పూర్ణాకృతి)

1 ఇది పడమటి ప్రాంతపు ప్రత్తి (Westerns) అని వ్యవహరింపబడు ప్రత్తిలో కేర్పబడుచున్నది.

3)

హిందూస్థానమున వంగదేశపు ప్రత్తి (Bengals) అని వ్యవహరింపబడు రకములను గూడ నీయుపతరగతిలోనివే. దొడ్లలో బహువార్షికములుగ పెంచబడు పైడి (భమిడి) ప్రత్తిచెట్టు (G. arboreum var. typicum) అను మరియొక ఉపజాతిలోనిది*. ఈర్వు కోస్తా తెలుగుజిల్లాలలోని ఎర్రప్రత్తి (G. arboreum var. typicum, forma Indica) అను ఉపజాతిలో శేర్పబడుచున్నది. విశాఖపట్టణపు జిల్లాలో కొన్నిచోట బహువార్షికముగ పెంచబడు కొండ ప్రత్తి కూడ యీ ఉపజాతిలోనిదిగ నే పరిగణింపబడుచున్నది.

మొక్కప్రత్తి (G. herbaceum) రకములు చెట్టు ప్రత్తి రకములంత యెత్తెగులు. వేరును అంతలోతుగబోవు. ఏకవార్షికములుగ నే పెంచబడును. వీని కాయలు గుండ్రదేరి యుండును. చమరు గ్రంధులు గుంటలు లేక గాని స్వల్పముగ గలిగికాని నునుపుగ నుండును. రాయలసీమలో పడమటి ప్రాంతపు ప్రత్తి (Westerns) అను వ్యాపార నామముతో వ్యవహరింపబడు జవారి ప్రత్తియు, ఉత్తరాది తెలప్రత్తి (White northern) అని వ్యవహరింపబడు ప్రత్తిలో శేరు తెలప్రత్తియు నీజాతిలోనివి. బొంబాయి రాష్ట్రములో బ్రోచ్, అత్తి ధోలీరా (Dholleras) బ్రోచ్ (Broach) ప్రత్తియను వ్యాపార నామములతో బరగు రకములను, పద్మ రాష్ట్రములందును హైదరాబాదు నందును పైరు చేయబడు కుంప్తా (Kumpta) ప్రత్తి, జవారి (Javari) ప్రత్తియను వ్యాపారనామములతో వ్యవహరింపబడు రకములను, దక్షిణాది ఉప్పమ్ (Uppam) తిన్నవేలి (Tinnavellies) ప్రత్తులునుగూడ నీతరగతిలో శేరును.



అమెరికా జాతుల మొక్కలు గుబురుగ నుండు చిన్నగుల్మములు మొదలు పెద్దగుల్మములు లేక చిన్నచెట్లుగ నెదుగునవి గలవు. వీని

* ఇది కాకినాడ ప్రత్తి (Cocanadas) అను పేరుతో వ్యవహరింపబడుచున్నది.

ఇది G. obtusifolium అను యే యే కాస్త్రీయనామముతో గూడ వ్యవహరింపబడుట గలదు.

యాకులు సామాన్యముగ పైదేశవారి జాతులలో కంటె పెద్దవిగ నుండును. కాని వీనిచేర్చు మొక్కల పైపెరకువకు తగినంత లోతుగ బోవు. కాకులు పెద్దవి.

9 వ పటము



అమెరికా (కంబోడియా) ప్రత్తియాకు, చేతిక 1


కాయ (పూర్ణాకృతి)

ఈదేశమున హెచ్చుగ సాగునందున్న (*G. hirsutum*) జాతిలోని రకములు చిన్నగుల్మములుగ నెరుగును. వీని కాయలు గుండ్ర దేరి నున్నగ నుండును. చమురు గ్రంథుల గుంటలు స్వల్పము. దూదిపై

జాతులలో కంటే పొడవుయేచలు శరీరి యంత్రములతో సన్నములు వడకుటకు హెచ్చు అనుకూలముగ నుండును. ఆమెరికా ప్రత్తియను వ్యాపార నామముతో వ్యవహరింపబడు నీజాతి ప్రత్తి రకములు పాకిస్తాన్ లో శరీపోయిన పశ్చిమపంజాబు, సింధురాష్ట్రములందే హెచ్చుగ సాగుచేయబడు చున్నవి. బొంబాయి రాష్ట్రమునందు కొంతవరకు సాగు చేయబడు ధార్వార్ - ఆమెరికా ప్రత్తి రకములును, దక్షిణాదిని విరివిగను, రాయలసీమలో స్వల్పముగను సాగునందున్న కంబోడియా ప్రత్తియు నీజాతిలోనివే.


ఆమెరికా దేశపు గకములలో మరియొక జాతి (G. barbadens) లో శేరు సీ యైలండ్ (Sea Island) రకములుగూడ కొంత

10 వ పటము



ఆమెరికా (శుభిప్త) ప్రత్తియాకు

10 న పటము

చేటిక $\frac{1}{4}$, కాయ (పూర్ణాకృతి)

వరకు సింధురాష్ట్రమున సాగునందున్నది. ఈరకముల కాయలు యెర్ర ప్రత్తికాయలవలెనే చురుగుంటలు గలిగి పైనిన్నగిలి నిడివిగ నుండును ఈ సీ మైండు గూడియేచలు పైని పేర్కొనబడిన యితర ఆమెరికా రకముల యేచలకం తెను నిండుక నిడివిగ నుండును.

ఇటీవల పైని పేర్కొనబడిన అమాదోయి, విబాతీయ జాతులం దలి పలురకములనుండి మేలైన క్రొత్త వంగడము లెంచబడి ఆ యా ప్రాంతములందు విరివిగ సాగులోకి రేబడెను.

పైని పేర్కొనబడిన రకములు సామాన్యముగ నేకవార్షికములు గనే సాగు చేయబడుచుండును. బహువార్షికములుగ నచటచట యిండ్ల పెర్లలోను తోటలందును వృక్షముగ బెంచబడు రోయి రకములలో చెట్టుప్రత్తి (*G. arboreum*) గాతెలో జేరు పైడిప్రత్తి యిదివరలో

జేర్క్సనబడెను*. కోయంబత్తూరు నేలం జిల్లాలలో కొంతవరకు సాగు నంగున్న 'నాడన్' ప్రత్తి యీ జాతి కొన్ని మరియొక బహువార్షిక రకము. ఇట్టి విశేషరకములలో *G. Purpurascum* జాతిలోని బోర్బాన్ (Bourbon) ప్రత్తి యొకటి. కొన్నిచోట పెద్దప్రత్తి యనబడునదియు నీదియే. కొన్నిచోట గాననగు జడప్రత్తి మరియొక అమెరికా జాతి (*G. Braziliensis*) లోనిది.

పైని జేర్క్సనబడిన వివిధజాతుల ప్రత్తి రకములలో చెన్న రాష్ట్రమునందలి తెలుగు జిల్లాలలో కొద్ది గొప్ప పెంచబడు లేక పెంచ వీలగు రకములను గురించిన వివరములు కొన్ని యాక్రింద వేర్వేరుగ చెలుపబడెను.

A. ఏక వార్షికములుగ బెంచబడునవి:—

1. జవారిప్రత్తి:- ఇది బళ్లారిజిల్లాలో మిగుల హెచ్చుగ సాగు నంగున్న మొక్క ప్రత్తిరకము. కడపజిల్లాలోను, అనంతపురం జిల్లాలోను, కర్నూలుజిల్లాలోని కొంతభాగముననుకూడ విరివిగ సాగుచేయ బడుచున్నది. ఇదియే పశ్చిమ ప్రాంతపుప్రత్తి (Westerns) అను వ్యాపార నామముతో వ్యవహరింపబడుచుండు ప్రధానరకము. కృష్ణరేవడి నేల(Black cotton soil) లందు పుబ్బ, ఉత్తరకార్తల(పెట్టెంబరు) లో విత్తబడి వర్షాధారముననే సాగుచేయబడు చుండును. ఇటు వెనుక జేసి విత్తబడుటచే నీది హింగారి ప్రత్తి యనబడును. మొక్క 2 అడుగుల లోపుగ నెరుగును. కొంచె మిందుమిందు క్రిందినుండియు నుంయుక్త కాండక శాఖలనే పెట్టి యెరుగును. అకులు కొదిగొప్ప రోమయుతము లగు నుండును. వీనియందు లోతుగ తీలక పోవుటచే తమ్మెలవెడల్పుగ నుండును. పూవులు పసిమివర్ణముగలిగి యుండును. చేటికలు గుండ్రదేరి కాని క్రింద హెచ్చువెడల్పుగలిగి త్రికోణాకృతినిగాని యుం

* పెద్దచెట్టుగ నెరుగనీయబడక పోయినను కొండ ప్రత్తి మొక్కలు కూడ యేటేట మొదటికి నరకీవేయబడి మరుచటి సంవత్సరము చిగుర్చి యెరుగు చుండుటచే బహువార్షికముగ బెంచబడు రకముల లోనే జేరును.

దును. వీనియందులు చీలి పెక్కు త్రికోణాకృతిగల దంతములగ నేర్పడి యుండును. కాలులు చిన్నవి. 1-1 $\frac{1}{4}$ అం. పొడవున గుండ్ర తేరి యుండును. ఇందలి మొక్కొక్కటిలో 11 గింజలు వరుసకుండును. వీని స్వభావమునుబట్టి రెండు ఉపరకములు గుర్తింపబడుచున్నవి. పైని బొచ్చు (Fuzz) నో నుండు గింజలుగల దొకటి. దీనిని తెల్లజవారి యందురు. బొచ్చు లేక నన్నగను, నంగనుండు గింజలు కలది రెండవది. దీనిని నల్లజవారి యందురు. ప్రత్తితానికపై దూది దిగుబడి నూటికి సుమారు 23 వంతులుండును. దీనియేని సుమారు 19 గులిమీటరు (3 $\frac{1}{2}$ అం.) ఉండును. 10వ నెంబరు వరికు నూలునుదీయ వీలగును. సగటున నెకవసునకు 170 పానుల ప్రత్తి దిగుబడినుగచున్నది. దీనినుండి యెంచి తీయబడిన హగరి నెం 1రు (H 1) లేక వెస్టర్న్స్ 1 (W. 1) అను పేలువంగడ 5 ఫుడ్లీరిక పు ప్రత్తి సాగుచేయబడు కస్టీమున నూటికి 75 వంతులపై సాగుచేయబడుచున్నది. ఈ ప్రత్తినుండి 25% దూది దిగుబడి యగను. ఏచిపొడవు 28 మి. మీటరు (9/10") ఉండును. దీనితో 30 వ నెంబరు నూలును దీయవీలగును. సామాన్య రకమునకంటె పెచ్చు పంటనిచ్చును. సగటున ఎ 1 కి 200 పానులప్రత్తియు 60 పానులు దూదియు కావచ్చును. హిందూరి సాగన కుపచరించు హెచ్. యే. 11 (H. A. 11) నెం 2800 రు వంగడములు గూడ కొన్ని ప్రాంతములందనుకూలముగా బెరుగుచున్నవి.

2. ముంగారి ప్రత్తి:—అనగా ముందుగా విత్తబడు ప్రత్తి. ఇది వెస్టర్న్స్ లో జేరిన మరయొక రకము. ఇది బళారి అనంతపురం జిల్లాలలోనూ, కడప కర్నూలు జిల్లాలలోని కొన్ని భాగములందును రోహిణి, మృగశిర కార్తెల (వే-జాన్) లో ముఖ్యముగా యెర్రనేలలందును, తేలికయైన నల్లనేలలందును - సాగు చేయబడుచుండును. ఇది జవారి ప్రత్తివలె మెక్క ప్రత్తి (G. herbaceum) బాతిలో గాక చెట్టు ప్రత్తి (G. arboreum var. neglectum roseum) బాతిలో జేరినది. దీనితో G. neglectum verum ఉపజాతి మెక్కలగూడ కలగలు పుగ నుండుటయుగలదు. మెక్క 2-6 అ. యెత్తున కెదుగును. గబురుగా పెరుగక నిడివిగ నెదుగును. కాళ్ళు చాలవరికు సంయుక్త

కాండకములు. అకులును కాండములును, సామాన్యముగ రోమయు
తములు. అకులు చిన్నవి. తొడిమ కాక సుమారు 2-4 అం. పొడవుం
డును. తమ్మెలు సుమారు $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ లోతువరకు జీలియుండును. చేటికలు
త్రికోణాకృతిని నిడివిలేరియుండును. అంచులు చీబక గాని, 3-4 దంత
ములు కలిగిగాని యుండును. పూవులు తెలుపు. కాయలు కోలడేరి
1-1 $\frac{1}{2}$ అం. పొడవును ఆంగుసము లావును గలిగియుండును. ఒక్కొక్క
యరలో 11 గింజల వరకుండవచ్చును. ఈ రకము హింగారి ప్రత్తి
కంటే హెచ్చు (ఎ 1 కి సగటున సుమారు 350 పౌ) ప్రత్తి దిగుబడి
నిచ్చును. ప్రత్తినుండికూడ మచ్చదూది వచ్చును. కాని యేచపొడవు
తక్కువగ ($\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$) మాత్రమేయుండి బిరుసుగనుండును. దీనితోపడికిలోపు
సెంబరునూలు మాత్రమే తీయవీలగును. కావున తక్కువ ధర గలిగి
యుండును. ఇది తరుచు మేలైన యితర రకముల ప్రత్తితో కలగలవు
చేసి విక్రయింపబడుట గలదు. దీనికి బదులుగ సాగుచేయ వీలగునట్టి
మేలైన వంగడ మొకటి (881 F) యెంచి తీయబడి దాని విత్తులను
కర్షకుల కాండకేయటకు యత్నములు జరుగుచున్నవి. ఈ వంగడపు
ప్రత్తినుండి దూది దిగుబడి సుమారు 34% ఉండును. ఏచ పొడవు
24 మి. మీటరు (రమారు 1 అంగుళము). హింగారి ప్రత్తికంటే
నెక్కువ ప్రత్తినిచ్చినను నిది సామాన్యపు ముంగారి ప్రత్తికంటే
కొంచెము తక్కువ (సగటున ఎకరమునకు సుమారు 300 పౌనులు)
ప్రత్తినిచ్చును. ఇంతకంటే హెచ్చు పంట నిచ్చు వంగడమును
సృష్టించుటకు గూడ యత్నములు జరుగుచున్నవి.

3. కర్నూలు తెల్లప్రత్తి :— ఇది జవారీ ప్రత్తివలెనే మొక్క
ప్రత్తి (G. herbaceum) జాతిలోకేరి దాని లక్షణములనే చాల
వరకు గలిగియుండును. ఇదియే ఉత్తరాది తెల్లప్రత్తి (White North-
erns) అనబడు వ్యాపారనామముతో వ్యవహరింపబడు ముఖ్యరకము.
కర్నూలు జిల్లాలోను, కడపజిల్లాలోను, అనంతపురం జిల్లాలో కొంత
భాగమునను కృష్ణారేడి నేలలందు విరివిగ సాగుచేయబడు చున్నది.
అగట్టు - పెట్టెంబరు నెలలో విత్తబడుచుండును. మొక్క చాలవరకు
జవారిప్రత్తి లక్షణములనే గలిగియుండును. కాని గింజలు నల్లజవారిలోవలె
సున్నగ నుండును. ప్రత్తినుండి దూది దిగుబడి సుమారు 25% ఉండును.

పంటపెద్దమను. గిట్టున నెకంమునకు 275 పా. ప్రతి కావచ్చును. ఒటీవల నీరికము ఒత్తరికములతో కల్లియగుట వలన, చాలచోట్ల దీనిసాగతగ్గి దీనికిబదులు బొంతాయి రాష్ట్రపు గడ్గ (Gadag) ప్రతి సాగులోనిక వచ్చెను. ఇపుడిదియే యీ ప్రాంతము లందు తెల్లప్రత్తినుని వ్యవహరింపబడునది. దీనినుండి 27-30% దూది దిగుబడియగును. యేచ పొడవు 3-1' ఉండును. ఈవిత్తనముతోగుడ కొంత ముంగారి ప్రత్తి (దీనినిచట గొప్పత్తి యంగరు) కూడ కలగను పుగ నుండుట గలదు. కర్నూలు తెల్లప్రత్తి నుండి యెంచి తీయబడిన మేలైన వంగడములలో N. 2 అనునది ప్రధానము. కాని దీనికింట H. 1. ప్రత్తియే బళ్ళారిజిల్లాలో మరి ఈ జిల్లాలో తెల్లప్రత్తివారుచేయబడు ప్రజేశమునకు వచ్చు అనుకూలముగ నుండుటచే నామంగడపు విత్తులే యీప్రాంతము లందును విరివిగ వృద్ధిచేయబడి పండిపెట్టబడుచున్నవి.

4. కర్నూలు యెర్రప్రత్తి : — దీని దూది కొంచెమెరుపు లేక గోధుమపన్నె గలిగియుండును. ఇది ఉత్తరాగ్ని యెర్రప్రత్తి (Red Northerns) అని వ్యవహరింపబడు ననుసూలలో ప్రధానమైనది. కర్నూలు జిల్లాలో వర్షము తక్కువ నుండు కొన్ని బీదయెర్ర(తువ్వ) నేలలందును కంకిర (బరిక) నేలలందును సాగుచున్నది. ఈమొక్క చెట్టు ప్రత్తి (G. arboreum) పాతిలోని యొక యావజాతి (Var. neglectum forma Indica) లోనిది. ఇది కొంచెంపొడవైనది క్రొత్త నుండియు సంయుక్త కాండకి కాఖలనే బెట్టి నిడివిగ 2-8 అడుగు లెగుగును. కాండమును, అకులను దీనిలోడిములను సామాన్యముగ నోయియుతములై యుండును. అకులు తమ్మెలమధ్య గాము మదలు క్లి లోతువరకు జీలియుండును. సామాన్యముగ పసిని పూవులనే బూయును. కాయలు 1—1½ అం. పొడవున కోరే చేరి పైని చెమురు గ్రంధి గుండులతో నుండును. కాయలందలి గుండలో నొక్కొక దానియంగు 11 గింజల వరకుండును. పంట తక్కువ. గిట్టున నెకంమునకు సుమారు 160 పాను లుండును. దూది దిగుబడి 24-25% ఉండును. ఏచ పొడవు 3 - 3½ అం. మాత్రముండును. కర్నూలు యెర్రప్రత్తి నుండి తీయబడిన వంగడములలో N. 14 అనునది చాల ప్రశస్తము. దీని పంట

యు, దూది దిగుబడియు, స్థానికముగ సాగునందున్న యొర్రప్రత్తి చేల నుండి కంటే హెచ్చుగ నుండును. పొటన నెకరమునకు 200 పౌనుల ప్రత్తియు దీనినుండి 25% దూదియు లభింపవచ్చును. ఈదూదితో 40 నెంబరు నూలు వరకు తీయవీలగును. ఏచ పొడవు 7/8-15/16 అంగుళములుండును. ఈ వంగడపు విత్తు లిటీవల విరివిగ వృద్ధిచేయబడి కర్షకుల కందజేయ బడుచున్నవి.

రె. కోస్తా జిల్లాల యొర్రప్రత్తి:— ఇది హెచ్చుగ నుంటూరు, నెల్లూరు, కృష్ణా జిల్లాలలోను కొంతవరకు పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి, విశాఖపట్టణపు జిల్లాలలోను సాగునందున్న మరియొకరకము. ఈ మొక్క కర్నూలు యొర్రప్రత్తి కంటే భిన్నమగు మరియొక యుప జాతి (*G. arboreum* var. *typicum* forma *Indica*) లోని చెట్టు ప్రత్తి. దీనిని *G. Obtusifolium* అని వ్యవహరించుటయు గలదు. ఇది క్రిందినుండియు యొక కాండక శాఖలను బెట్టి పైరకముకంటే గుబురుగను, నెత్తుగను నెగుగును. కాండమును, అకులును పైరకములో కంటే తక్కువ రోమయుతములు లేక రోమహీనములుగ నుండును. అకులుపైరకములోకంటే తక్కువవెడల్పు గలిగి నిడివికరి తమ్మెల మధ్య లోతుగ (శ్చ వంతు వరకు) జీలియుండును. చేటికలు కూడ వెడల్పుకంటే హెచ్చు నిడివిగలిగి త్రికోణాకృతి నుండును. వీనియందులు చీలకయేగాని, 3-4 దంతములు కలిగిగాని యుండును. పూవులు పసిమివర్ణముగఁబడి. కాయలు పైరకములో కంటే నిడివి (1-1½ అం. పొడవు) గలిగియుండును. అందుచే చేటికలను నుంచి పైకి వచ్చి యుండును. ఒక్కొక్కగఁదిలో 11 గింజలవగుతుండును. పంట పైరకము లన్నిటికంటెను హెచ్చు. పొటన ఎ 1 కి 275 పౌనుల ప్రత్తి కావచ్చును. దూది దిగుబడి సుమారు 25%. యేచపొడవు పైరకమునందువలెనే 3½ - 4 అం. పొడవుండును. దీనినుండి 20 వ నెం. నూలువరకు తీయవీలగును. దూదిరంగునందు ఇయ్య ఉపరకములో

లేతముగురు లేటు భేదములుండును*. ఏచ జగ్గయైన దగుటచేతను, దీనికున్న రంగునకు దోడు యితర గంగులను వేయు బట్టలకిది యుపయోగపడుటచేతను, యీ ప్రత్తికి కేశమునను, ఎంగుండు ప్రాంసులలోను కొంతగిరాకిగలదు. తరుచు దీనిని తెల్ల ప్రత్తికంటె హెచ్చుధర పెట్టి కొనుటయు గలదు.

కొస్తాజిలాల యెర్రప్రత్తి నుండి కొన్ని మేలైన వంగడములు తీయబడి వాని విత్తుల కక్షకుల కందశేయబడుచున్నవి. అంగు కాకినాడ లేక గుంటూరు నెం 1 రు (G. 1) అనునది ముఖ్యము. ఇది యొక తణిఖీలో ఎ 1 కి 534 పౌ. ప్రత్తి (సామాన్యపు పలనాడు విత్తనము 499 పౌ.) నిచ్చును. ప్రత్తినుండి దూదిగుబడి 29% ఉండెను. ఎ 1 కి సగటున 275 పానుల ప్రత్తియు 80 పానుల దూదియు కావచ్చెను. యేచపొడవు 22 మిలి మీటరు (సుమారు 7/3 అం.) 32 వ నెంబరు వరకుగల నూలు దీయపీలగును. దూదిరంగు సామాన్యపు యెర్రప్రత్తిలో కంటె తేలికగా, అనగా లేత బూడిదరంగు గలిగి యుండును.

ఇంతకంటెను హెచ్చు పంట నీయగలగు 336 - B అను వంగడ మొకటి గూడ తీయబడి పరీక్షింపబడుచున్నది.

6. వరంగల్ తెల్లప్రత్తి:—ఇది హైదరాబాదు రాష్ట్రమందలి తెలంగాణా ప్రాంతములంగు సాగుచేయబడు చొకరకము. ఈ రకము గూడ పైరకమువలె *G. arboreum* var. *typicum* - *forma indica* (*G. obtusifolium*) అను నుపజాతిలో కేరనకే యైనను దీని

* ఇటీవల రిమ్యలో నిట్టి వివిధాంశములు లేత యెరువు లేక గోధుమవర్ణముతో గూడిన రకములుగాక, స్వతస్సిద్ధమగు కొన్ని యితర రంగులగల ప్రత్తి రకములు కూడ సృష్టింపబడెనని తెలియుచున్నది. హైందవ వాఙ్మయమున ప్రత్తి మొక్కలకు ప్రత్యేక దోహదములను చేయుటవలన తేటైన యెరువు, అకుపచ్చరంగు, నలుపు నీలవర్ణముగల ప్రత్తి యుత్పన్నమగునని తెలుపబడెను. ఇట్టి ప్రక్రియలవలన మొక్కల స్వభావమును మార్చవీలగునేమో కూడ అధునిక శాస్త్రజ్ఞులు పరీక్షింప దగును.

దూది తెల్లని నుండును. ఈ ప్రత్తి వ్యాపారరీత్యా కాకినాడ ప్రత్తిలోనే చేరుచున్నది. దీనియొగుమతి స్థానమునుబట్టి దీనికి గుంటూరు ప్రత్తిగను పేరును గలదు.

7. చిన్నప్రత్తి:—ఇది విశాఖ పట్టణపు జిల్లాలో సాగునగున్న మరియొక రకము. బళ్లారి జిల్లాలోని ముంగారి ప్రత్తివంటి హీనమగు తెల్లప్రత్తిరకము. దానివలెనే యిదియు *G. arboreum* var. *neglectum roseum* ఉపజాతిలో చేరినది. ఇదియు తొలకరిని తేలిక నేలలందు (జాన్-జాలెలో) విత్తి 'సాగుచేయబడుచుండును. ఈ గకపు ముఖ్యనిశేషము చరిచ్ఛకోత ముగిసిన వెనుక మాగాళి భూములలో గూడ విత్తి సాగుచేయు వీలుగుట. మొక్క చాలవరకు ముంగారి ప్రత్తి మొక్కను బోలియే యుండును. పంటయు దానివలెనే సామ్యము నుండి-సకలున ఎ 1 కి 350 పానుల ప్రత్తి కావచ్చును. దూది తెల్లపు. ప్రత్తి తూనికపై గురుతి నూటికి సుమారు 25-27 పెంతుండును. యేచ కురున. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ అం. మాత్రముగడును. 10 వ పెంబరు వరకు మాత్రమే నూలు తీయవీలగును. తరుమగ నీ ప్రత్తి యితర రకముల ప్రత్తితో కలిచేయుట కుపయోగింపబడుచుండును.

దీనికి బగులుగ నీ ప్రాంతమునందు కూడ 881 F పెంబరు ముంగారి ప్రత్తిని సాగుచేయు వీలుగునని కనిపెట్టబడెను. బొంబాయి రాజధానిలో నీ యుపజాతిరకములనుండి యెంచి తీయబడిన 197-3 అను పంకడముకూడ పరీక్షింపబడి యీ ప్రాంతముల కనుకూలమని కనిపెట్టబడెను. ఒక త శిఖిలో నిది యొకరమునకు 692 పానుల ప్రత్తి వాస 7 న. దూది ప్రమాణము 39% ఉండెను ఏచపొడవు 22 మి. మీటర్లు (దాదాపు 9/10'') ఉండెను.

8. కంబోడియా ప్రత్తి:—ఇది దక్షిణ జిల్లాలో విరివిగ సాగు చేయబడుచున్న ప్రశస్తమైన అమెరికా రకము. *G. Hirsutum* అను జాతిలోనిది. సామాన్యముగ నీరుపెట్టి సాగుచేయవలసియుండును. ఆంధ్రకోశమున దీనిసాగు చాల తక్కువ. ఒక యనంతపురం జిల్లాలో మాత్రము స్వల్పముగ సాగుచేయబడుచున్నది. క్రొత్తగా నిర్మింపబడు

చున్న శుంభద్ర అనకట్ల కాలనలక్రింద బళ్లారి జిల్లాలో దీనిని హుచ్చగ సాగుచేసిన వీలుగునని యాశింపబడుచున్నది. ఈ మొక్క సుమారు 3-5 అ. యెత్తున గుబురుగ నెగుగు గుల్మము. శాఖలు సంయుక్త కాండ కములు. ఆకులు పై రకములలో కంటె పెద్దవి. ఆండులు సామాన్యముగ మూడు తమ్మెలు గలిగి యుండును. ఆరుగు 5 తమ్మెలు వగరుండవచ్చును. ఇవి వెడల్పుగ త్రికోణాకృతిని సన్నగిలిన కొనలతో నుండును. చేటికలు హృదయాకారమున 3 కోణములు కేరి యుండును. వీని యందు ముద్గంగ జీలి, పెక్కుదంతములుగ నేర్పడును. ఈ రకపు చేటికలు, మొగ్గను పూవును కాయను ఆవరించి యుండును. కాయలు గుండ్రకేరి తరువు పెద్దవి (1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{3}{4}$ అం. పొడవును 1-1 $\frac{1}{4}$ అం. లావును) నుండును. పైన నున్నగ నుండును. చురుగుండులు గంటుల స్వల్పముగ నుండవచ్చును. నీరుపెట్టి సాగుచేయుచో నెకగునకు సుమారు 800-1000 పానుల ప్రత్తివరకు దిగుబడియగును. దీనినుండి సుమారు మూడవవంతు దూద వచ్చును. దూది తెలుపు. ఏచపొడవు 7/8-1 అం. ఉండును. దీనినుండి 35 వ నెంబరు వరకు చూలును దీనివీలగును.

అయా ప్రాంతముల కనుకూలించు మేలైన కొన్ని కంబోడియా ప్రత్తి వంగడము లుత్పన్నము చేయబడి సాగునగున్నవి. ఇందు అంతపురం జిల్లాలో సాగుచేయబడుచున్నది Co. 2. దీని దూది 7/8-1 $\frac{1}{2}$ /16 అం. పొడవుగల యేచలు గలిగి యుండును. ఇదియు, ఎంతకంటె పొడవు యేచు లిగి, 35-45 నెంబరు చూలు వడిక వీలగు దూదని 35-37% వరకు నిమ్మనీటియు Co 3, Co. 4. B-40 అను వంగడములకూడ తీయబడి విత్తులు కనికర కందజేయబడుచున్నవి. నెం 7682 గు వంగడము 1 $\frac{1}{16}$ అం. పొడవు యేచ గలిగి 54 వ నెం. వరకు చూలుతీయ వీలుగలదియు నెకరమునకు పేయి పానులకు మించు ప్రత్తి నిమ్మనీటియు వై యున్నది. అనుకూల పరిస్థితులలో నీ వంగడములు 1500-2000 పానుల ప్రత్తి నిమ్మనీటిగలగు.

G. hirsutum జాతిలో జేరిన పై కంబోడియా వంగడములుగాక ఏకవార్షికముగ పెంచబడు మరికొన్ని అమెరికా ప్రత్తి వంగడములు కూడ మైసూరు, హైదరాబాదు, బొంబాయి ప్రాంతములనుండి

తేబడి కుంగుద్ర కాలువల క్రింద సాగునకై నిరిగుప్ప సరిశోధనాస్థానము నందు తణిటి చేయబడుచున్నది. కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులలో ఎ 1 కి 1500 పౌ. ప్రత్తివరకు నిచ్చెను. M. A. 2, H. A. 2 అను వంగడములు నీరు పెట్టి సాగుచేయుటకే కాక మెట్టసాగునందు గూడ దేశవారీరకములతో సమముగ అంతకంటె శ్రేష్ఠముగు ప్రత్తి నిచ్చునవిగ నున్నవి.

G. hirsutum జాతిలోని మరికొన్ని ప్రశస్తమగు అమెరికా రకములును వంగడములును, వానికిని దేశీయరకములకును సంకరములును పంజాబు సింధు బొంబాయి రాష్ట్రములందు సాగునగుచున్నవి. ఇవి సామాన్యముగ పంజాబు - అమెరికన్, సింధు - అమెరికన్ ధార్వార్ - అమెరికన్ మొదలగు ప్రాంతీయ నామములతో వ్యవహరింపబడుచున్నవి.

G. Barbadens జాతికి చెందిన సీ విలండు ప్రత్తి (Sea Island cotton) యు దాని నుండి తీయబడిన వంగడములును పైరకముల కంటెను హెచ్చు పొడవు (1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{3}{4}$ అం.) యేచ గలిగి 70-80 వ సెంటరు వరకు నూలు నిచ్చును. ఇవి కంబోడియా మొక్కలను బోలి వానికంటె పెద్దవిగ నెరుగును. కాని వీని శాఖలలో ఏక కాండకములును, యొక్క కాండకములును కూడ నుండును. వీని కాయలు ఎగుల నిడివిగ కొనదేరి పెద్దవిగ నుండును. వీనిపై దేశవారీ చిట్టు ప్రత్తిరకముల కాకుల పైవలెనే చదురు గ్రంధి గుంటలుండును. సీ ఆయిలండు ప్రత్తిరకములు సింధురాష్ట్రమున తక్కిన ప్రాంతములందు కంటె హెచ్చు అనుకూలముగ బెరుగుటచే నచటనే హెచ్చుగ సాగు చేయబడుచున్నవి. ఈ జిప్సులో హెచ్చుగ సాగు చేయబడుచుండుటచే నీ ప్రత్తి ఈజిప్టు ప్రత్తియను పేరుతో కూడ వ్యవహరింపబడుచున్నది.

ఇటీవల ఉగాండానుండి వచ్చిన యొక రకపు ప్రత్తియు దీని కిని కంబోడియా ప్రత్తికిని సంకరము వలన కొయంబస్తూరునందు తీయబడిన వంగడములలో కొన్నియు కూడ ఆ ప్రాంతములందు కంబో

డియా వంగడము కంటే శ్రేష్ఠమగు ప్రత్తిని హెచ్చుగ వాడగునని కనిపెట్టబడినది. దేశీయ కురుచ యేచ రకములకు బదులు ఇట్టి మేలైన రకములను వంగడములను విరివిగ సాగుచేసినగాని ఇండియాలోని బట్టల మిల్లులు పాకిస్తాన్, అమెరికా, ఈజిప్టు వగైరాల నుండి ప్రత్తి దిగుమతులను తగ్గించుకొన వీలులేదు*.

B. బహువార్షికముగ బెంచబడు రకములు:—

1. కొండప్రత్తి:— ఈ రకము కోస్తా యెర్రప్రత్తి వలెనే *G. arboreum* var. *neglectum* (*G. obtusifolium*) అను ఉపజాతిలో చేరినది. మొక్క దానినే బోలియుండును. కాని దీని ప్రత్తి తెల్లగుండును. ఈ రకము విశాఖపట్టణపు జిల్లాలోను శ్రీకాకుళం జిల్లాలోను కొన్నిచోట్ల-ముఖ్యముగ మాడుగుల సోరువకోట యేజన్సీ ప్రాంతపు కొండపోడులందు బహువార్షికముగ బెంచబడుచున్నది. కాని మొక్కలు చెట్లుగా నెగుగునీయబడక ప్రత్తియేరుట ముగిసిన వెనుక నరక వేయబడి మరల తొలకరిని చిగుర్పియ్యదుగును.

ఈ ప్రత్తి పొందూరు, శ్రీకాకుళం మొదలగుచోట్ల వెలమనూలు, పట్టుసాలెనూలు అని వ్యవహరింపబడు నన్న చేతినులును దీయుటకు ప్రత్యేకముగ నుపయోగించబడుచున్నది. యేచ 9/10-1 అం. పొడవుండును. సామాన్యముగ 40-50 నెంబరు చేతినులు దీయుటకు వీలగును. ఈ నూలును దీయువారు ప్రత్తిరాట్నముతో దూదినితీసి యేకి యేకులను జాబ్బి వడకుటకు బదులు ప్రత్తిగింజనుండియు చేతితోనే దూదినిపింజగాదీసి వడుతుదురు. కంబోడియాదూది యేచకూడ పొడవుగనున్నను, అది గింజ నుండి సులభముగ పిడివచ్చుటచే దాని నుండి ఇల్లు పింజతీయుటకు వీలు పడదని చెప్పుదురు. మరియు నీదూదికి తక్కిన రకములదూదికంటే నన్న నూలును దీయుటకు తోడ్పడు మరయొక లక్షణమేమన యిందలి యేచలు

* 1950-51 సంవత్సరమున ఇండియాలో ప్రత్తి సాగునందున 130 లక్షల యెకరములలో సుమారు 47.7% భూమియందు ఇట్టి మేలైన వంగడములు సాగునందుండెనని యంచనా వేయబడినది.

హెచ్చు మెలికరిగి యుండుటచే కాబోలు నూలు తీసినపు డొక దానితో నొకటి బాగుగ పెనవేసికొనుటచే దారము తగినంతపురిగిలిగి సామాన్యపు రకముల నూలుకంటె హెచ్చు గట్టిగనుండును. కావుననే యీ నూలు తోనేసిన బట్టలు చన్నమైనను హెచ్చుకాలము మిన్నును. సామాన్యముగ నీప్రత్తిని యెర్రప్రత్తికంటెను చిన్నప్రత్తికంటెను రెట్టింపుధర పెట్టి కొనుచుందురు.

2. పైడిప్రత్తి:— దీనిని ధృవడిప్రత్తియని కూడ యందురు. *Garboreum var. typicum* అను నాతిలోనిది. 4-6 గజముల యెత్తుచెట్టుగా నెదుగను. ఏకవారికములుగ సాగుచేయబడుచున్న దేశ వాళిచెట్టు ప్రత్తిరకముల కన్నిటికిని గూడ నిడియే మాతృకయని యెంచబడుచున్నది. మొక్క కోస్తానిర్భరప్రత్తి లక్షణములనే గలిగియుండును. పూవులు పసిమతోగూడిన యెరుపురంగు గలిగియుండును. నూలుతెలుపు. కాని తేటుతక్కువ. యేచకురుచ. గింజ ఆకుపసరు రంగుగలిగి బొచ్చు తోనుండును. సామాన్యముగ నీ చెట్టుకాటిరెండు యిండ్లపెరిల్లోను దేవాలయోద్యానములందును పెంచబడి వీనిదూది దీపారాధనకు వత్తులను జేయుట కుపయోగింపబడుచుండును.

3. పెద్ద ప్రత్తి:— ఇది పెద్దగుల్మముగగాని చిన్న చెట్టుగగాని పెరుగు వొక ఆమెరికా ప్రత్తిజాతి (*G. purpurascum*) కి చెందినది. సామాన్యముగ బోర్బోన్ (*Bourbon*) ప్రత్తి యని వ్యవహరింపబడుచున్నది. కంబోడియా వగైరా ఆమెరికా ప్రత్తి రకముల కంటె చాల ముందుగనే యిండియా దేశమున ప్రవేశపెట్టబడి దీని దూది జందెములను వడకుటకును, దీపముల వత్తుకును, దిండ్లు వగైరాలకును ఉపయోగింపబడుచున్నది. పైడి ప్రత్తి చెట్లవలెనే యివియు పెరిల్లోను, తోటలందును ఒకటి రెండు పెంచబడుచుండును. కోయంబత్తూరు నేలం ప్రాంతములందును, విశాఖ పట్టణపు జిల్లాలో మాడుగుల ప్రాంతములందును దీనిని పొలములందు కొద్ది గొప్ప విరివిగ సాగుచేయుటయు గలదు. కాఖిలు హెచ్చుభాగము ఏకకాండకములు. ఆకులు సామాన్యముగ 3 (అరుదుగ 5) తమ్మెలు గలిగి కంబోడియా ఆకుల కంటె

సామాన్యముగ జన్మవిగ నుండును. ముదిచెట్ల యాకులు కొన్ని జీలక, యేకముగ నుండుటయు గలదు. పూవులు లేనివి వర్ణముతో నుండును. కాయలు గుండ్రజీట కొంచె మించుమించు కంఠోడియా ప్రత్తి కాచా లనే బోలియుండును. దూరి తెలుపు. గింజలనుండి సులభముగ నీడి వచ్చును. యేచపాడవు 1-2 అం. వరుకుండును. గింజ నునుపు నలుపువర్ణము కలిగియుండును.

4. జడప్రత్తి:— 2-6 గజముల మొత్తము పెట్టు పెరుగు మరియొక ఆమెరికా ప్రత్తి (G. Barziliensis) కి బేరింగుది. పొడవు పైరకమునకు పోలే కొంతకాలమునకు క్రిందటనే యీ రేశమున ప్రవేశపెట్టబడి దానివలెనే దొడ్లలోను గోటలలోను స్వేచ్ఛముగ బెంచు బడుచున్నది. అకులు తక్కిన రకములన్నిటిలోకంటెను పొగు పెదవి. బాగుగ నెదిగిన యాకుల మొత్తపు పొడవు వెడల్పులు 8-10 అం. వరుకుండ వచ్చును. కాడయు నింతే పొడవుండును. దళము 3-5 తమ్మెలుగ జీలి యుండును. అరుదుగ తమ్మెల్లోడకుండుటయు గలదు. పూవులు పసినిరంగులలిగి వాడినవెనుక నెరుపుగ మారును. కాయలు నీబలెండు కాయలనుబోలి నిడివిగ ను పెద్దవిగ నునుండును. ఒక్కొక్కయొక్క 4-5 గింజలవరకు ఒకదానివొకటి యంటుకొని జడకట్టి యుండుటచే నీ రక మునకు జడప్రత్తి యను పేరుగలిగెను. గింజలు దూరినుండి సులభముగ నీడి వచ్చును. గింజలు పెద్దవిగ ను నున్నగ నుండును. సామాన్యపురకములలో నొక నుండును. పైడితెల్లగింజలవలె అకుపెచ్చునుండు రకమునగలదు. దూరి తేలైన తెలుపుంగులలిగి ప్రత్తి తూనికిపై 100 కి 20-30 వంతుల వరకు దిగుబడియును. ఏచపాడవు తక్కిన ఆమెరికా రకములలోకంటెను తక్కువ. 1/4-1/2 అం. పొడవుండును. కావున నీ దూరిని రేశహాళి నాణ్యతతో ఏక విలుగును. నూలవదుకు కలుంబములు తపా పెరగల్గ లో నీచెట్టును గొన్నిటిని నాటుచో ఏటేట సాగుచేయవలయునని రకయే 11-12 సం॥ వరకు తమకువలయు ప్రత్తిని సులభముగ బడయవచ్చును.

ఈ శతాబ్ద ప్రారంభమున కారివోనికా (Caravonica) ప్రత్తి మొదలగు మరికొన్ని ఆమెరికా చెట్లు ప్రత్తిరకములుగూడ రేశముల నుండి ప్రవేశపెట్టబడి పరిశీలంపబడెను. కాని యేరియు నీ ప్రాంతము లందలి పరిశీలకుల కనుకూలముగ గనబడలేదు.

ఆయా రకముల ప్రత్తి, దూది దిగుబడి వగైరా ప్రమాణములు

రకపు వివరములు	ప్రత్తి. దూ. శా. %	దూది దిగుబడి %	వగైరా ప్రమాణములు	మిశ్రణము
A. కేళియరకములు,				
వంగడములు.				
1. తెలజవారి ప్రత్తి (Westerns)	170	23	20	$\frac{1}{4}$ "
2. H. I. తెల్ల ప్రత్తి (Westerns)	225	28	30	$\frac{1}{10}$ "
3. కర్నూలు తెల్ల ప్రత్తి (White northern)	275	27-28	20-25	$\frac{1}{4}$ -1"
4. కర్నూలు యెర్ర ప్రత్తి (Red northern)	160	24-25	20	$\frac{5}{8}$ - $\frac{3}{4}$ "
5. N. 14 (పై రకపు వంగడము)	200	25	40	$\frac{7}{8}$ -1 $\frac{1}{2}$ "
6. కోస్తాజిల్లాల యెర్ర ప్రత్తి (Coccanadas)	275	75	20	$\frac{5}{8}$ - $\frac{3}{4}$ "
7. G. 1. (పై రకపు వంగడము)	275	29	32	$\frac{7}{8}$ "
8. మంగారి లేక చిన్న ప్రత్తి	350	25-27	10	$\frac{1}{3}$ "- $\frac{3}{4}$ "
9. 881. F.	300	34	80	1"
10. కొండ ప్రత్తి	60-80	25	40-80	$\frac{1}{10}$ "-1"

మిశ్రణములు

(పంజాబీ)

(తరువాతి పేజీ చూడుడు)

రకపు వివరాలు	గిగుబడి ప్రతి 1 సె.	% దూది గిగుబడి సంపూర్ణ	వరకు సంబంధ నూలు	గిగు సం
B. ఆమెరికా రకములు (వంగడములు)				
1. కంబోడియాప్రతి (నీరుపెట్టి సాగు)	500	33-34	25-35	$7\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$
2. Co. 2. (పైరకపు వంగడము)	900	35	25-35	$7\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$
3. Co 4B-40 (")	900	34	35-45	$1'' - 1\frac{1}{4}''$
4. నెం 7182 రు (")	1000	34	54	$1'' - 1\frac{1}{4}''$
5. సీ బలందుప్రతి	?	?	70-80	$1\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$
6. పెద్దప్రతి	?	30-88	?	$1'' - 1\frac{1}{4}''$
7. జడ్ప్రతి	800	30-33	20	$3\frac{1}{4}'' - 7''$

పైని వ్యవక్రతములైన ఆయా రకముల ప్రక్క యొక యొక రమున
లిండు గుటుపరిసరియు, దానినుండి గిగుబడియగు దూది నిష్పత్తియు,
అందలి యేచల పొడవును, దానితో వడుకదగిన నూలుయొక్క గరిష్ఠ
సంబంధమును, ఈ పైన పట్టికరూపమున సంగ్రహించి తెలుపబడిన.

ప్రత్తి కనుకూలమగు పరిస్థితులు

వర్షాధారమున సాగుచేయు ప్రత్తికి వర్షాధిక్యములేని యష్టప్రదేశములును వర్షాకాలము ముగిసిన వెనుక తగినంత కాలము పగును నిలుచినట్టి నేలలను అనుకూలములు. కావున నీ సస్యము రాయల సీమలోని కృష్ణరేవడి నేలలో ముచ్చ సాగుచేయబడుచున్నది. ఆ నేలలందీ. ముచ్చ సాగుచేయబడుచుండుటచే వానికి ప్రత్తి రేవడి నేలలు (Black cotton soils) అనుపేరు కూడ గలిగెను. రాయలసీమ యందే కాక గంటూరు, కృష్ణాజిల్లాలోను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని గొల్లపూలు ప్రాంతములందును దక్షిణాని తిన్నవేలి, తిరుమనాపల్లి వగైరా జిల్లాలోను, హైదరాబాదు, బొంబాయి, మధ్యప్రదేశ్, మధ్యభారత్, బీరారు రాష్ట్రములందును కూడ ప్రత్తి నేలలందే గరివిధ సాగుచేయబడుచున్నది. ఈ ప్రాంతములన్నిటి యందును కూడ వర్షము తక్కువగానే యుండును. ఇంగువలను ఈ ప్రదేశములు చాల వరకు సముద్రమునకు దూరమున ఉండుటచేతను నినికి వాతావరణమున అర్ధిత తక్కువగా ఉండుటచేత నచట యుత్పత్తియగు ప్రత్తి శ్రేష్ఠముగ కూడ నుండును.

వర్షపాతము మధ్యమముగ నుండు కోస్తా ప్రదేశములందును కొన్ని యితర ప్రదేశములందును కూడ శ్రేష్ఠ నేలలందును నీరు సులభముగ వడియొ మెరకవండలి నేలలందును కొన్ని మోటు రకముల ప్రత్తి వర్షాధారమున సాగుచేయబడుచున్నది. కాని యట్టిచోట కృష్ణరేవడి నేలలందు వలె యీ సస్యమున కంతగా ప్రాముఖ్యతలేదు. ఇట్టి ప్రదేశములు శ్రేష్ఠముగ రకముల కనుకూలములుగావు.

వర్షము బాగా తక్కువ గురియు ప్రదేశములందును, పగును నిలువని శ్రేష్ఠ నేలలందును నీ సస్యమును నీరుపెట్టి సాగుచేయవలసి యుండును. దేశవారి కరుచయేచ రకముల నిటు సాగుచేయుట సామాన్యముగ కిట్లుబాటుగ నుండకపోవచ్చును. కావున నీటి వనరులుగల చోట హెచ్చుపంట నిచ్చునట్టియు దూది శ్రేష్ఠముగ నుండునట్టియు అమెరికా రకములనే సాగుచేయదగును. మరియు నిట్టిరకములు వర్షము పెచ్చుగ గురియుచోట్లగాని వాయువు నందార్ద్రత పెచ్చుగ నుండునట్టి కోస్తాప్రదేశములందుగాని, పెచ్చు జగురుగ నుండు రేవడి

నేలలందుగాని అనుకూలముగ చెరుగువు ఇట్టి ప్రదేశములందు సస్య
అవకాశాలన తరుచు చెడు మందులు దురుగాక, అని చీడలకును తెగుళకును
హెచ్చుగా లోనగును. అందువలననే ఆంధ్రప్రదేశ్ పు కోనాజిల్లాలో
కంబోడియా ప్రత్తిని కాగుచేయుటకు శ్రమబడిన యత్నము లింతగా
సాఫల్యత గొందలేదు. ఈ ప్రత్తి వర్షము తక్కువగు గురియు
కోయంబత్తూరు జిల్లాలోను దక్షిణాని మరెక్కని ప్రదేశములందును
మాత్రమే నీరుపెట్టి వేరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది. పంజాబు, సింధు
రాష్ట్రములందును వర్షము మిగుల తక్కువగునుండి నీటివసతులు
హెచ్చుగ నుండుటచేతనే సాదవుచేసుకొని అమెరికా ప్రత్తికములు
తక్కువచోట్లకంటె హెచ్చుగ సాగునందుచున్నవి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ప్రత్తిని బడుము యిట్టి కాలము పుబ్బు, ఉత్త
కార్తెలు. (September) కొంచె మాస్యముగ బూని వేసవి వర్షకు
కాయమండు ఎర్రప్రత్తి, సవరిప్రత్తి, కిర్కూలు తెల్లప్రత్తి మొదలగు
నవే యిట్లువి బడుమందును. వర్షము తక్కువగురిని తక్కువలో ముగియు
చోట వీనినింకను ముంగుగ ముఖకార్తె. (August) లోనేవిత్తుదురు.
గోదావరి డెల్టాభూములలో మెట్టవర్షలతో కలిపి జల్లవపుడు మరెండు
మాడు కార్తెలు ముందుగా జూన్-జూలైలో) జల్లుటయుగలదు. కొండ
ప్రత్తినిగూడ గంటె, కొగ్రవర్తరాలతో కలిపి యిట్లె తొలకిరిని జల్లు
దురు. వర్షము కొంత హెచ్చుగను వెనుకజేసియు గురియుచోట హస్త
చిత్త కార్తెల (October) లో జల్లుటయు దక్షిణాని హస్త వర్షములే
ప్రధానముగచోట్ల స్వాతి విశాఖకార్తెల (November) లో జల్లు
టయుగూడ కలదు. వైకములకంటె నియమ మందుగబూని కాపు
త్యగలోనుగయు ముంగారిప్రత్తియు, చిన్నప్రత్తియు తగినంత తొలకిరి
వర్షము గురియగు నే (జూన్-జూలై నెలలో) జూబడుచుండును. వేసవి
వర్ష హాయమున వీనినింకను ముందు నే (మేనెలలో) జల్లుటయుగలదు.

విశాఖపట్నం జిల్లాలో చిన్నప్రత్తిని చూగాటిభూములలో శీతకాల
మున (డిసెంబరు-జనవరిలో) చిత్తి ఒకటి రెండు తడులు పెట్టుటయు
గలదు.

నీరుపెట్టి సాగుచేయు శీత కాలపు కంబోడియా ప్రత్తిని పండిపు
స్వభావమునుబట్టియు, పరిస్థితులనుబట్టియు పెట్టెంబరు, అక్టోబరు, నవం

బరు నెలలలో జలుచుందురు. వేచి కంబోడియాప్రత్తిని కూర్చుకొస్తా దక్షిణాదిజిల్లాలలో కూర్చుంటు విత్తుదురు. కొన్నిచోట జనవరి, ఫిబ్రవరిలగూడ జల్లుబడుచుండును. పంజాబులోను ఇతర యుత్తర ప్రాంతములందును శీతలము మెండుగనుండి మంచుపేరుకొనుచోట ఆమెరికా ప్రత్తి రకములను ఏప్రిల్-మే నెలలలో విత్తి నీరుకట్టి సాగుచేసి శీతలము మెండుగు లోపలనే పంటను దీయుదురు.

పరివర్తనములు, మిశ్రణములు

వర్షాధారమున సాగుచేయు ప్రత్తిని, కొర్ర, జొన్న మెట్టివరి మొదలగు తృణధాన్యములతోను సెనగ, వేరుసెనగ* నూపు, కుసుంబా, ధనియం మొదలగు నితర సస్యములతోను పరివర్తనము గావింప వచ్చును. పరివర్తనమున మిర్చియు, పొగాకును జేర్చుటయు గలగు. ఉదాహరణకొరకు కొన్ని పరివర్తనము లీక్రింద చూపబడెను.

1. రేనడి నేలలకు (బళ్ళారిజిల్లాలో)

1. వ సంవత్సరం॥ కొర్ర జవారిప్రత్తి (ఆగస్టు నెట్టెంబరులలో విత్తి)
2. వ ,, వేరుసెనగ* (జూన్-జూలైలో విత్తి)

* ప్రత్తితో పరివర్తనమునకు మధ్యరాష్ట్రములందు పని సంవత్సరములపాటు జరిగిన యొక తఃఖిలో వేరుసెనగ తక్కిన వానికంటె శ్రేష్ఠముగ దేలెను. సంవత్సరము విడిచి యొక సంవత్సరమున దీనితో కూర్చి సాగుచేసిన ప్రత్తిచేను సాటున సెకరమునకు 750 పౌనుల పుత్తినీయుగా ప్రత్తి, జొన్న, వేరుసెనగ పైరుల చూడేండ్ల పరివర్తనమువలన సాటున 737 పౌనులు లభించెను. రెండో వరుసగా ప్రత్తినివేసి ఒక సం॥ వేరుసెనగ పరివర్తనమువలన సాటున 580 పౌనులును, రెండేండ్ల ప్రత్తి ఒక సం॥ జొన్న పరివర్తనము వలన 471 పౌనులును, ఒక యేడు ప్రత్తి, ఒకయేడు జొన్న పరివర్తనము వలన 376 పౌనులును ప్రతియేడు ప్రత్తి సాగుచేయుటవలన 321 పౌనులును నయ్యెను.

* వేరుసెనగకు ముందు సంవత్సరమున కాని వెనుక సంవత్సరమున కాని మిర్చిని సాగుచేసి పరివర్తనమును పొడిగింప వచ్చును.

3. వ , పయర జొన్న + కాయధాన్యములు (నెట్టెంబరులోవిత్తి)
 తొలకరి వచము తగినంత గురియ్యచో కొర్రను ముందుగ ప్రత్యేకముగ విత్తి సాగుచేసి దీనిని గోసికొనిన వెనుక ప్రత్తిని విత్తుటయు కలదు. రెంటిని కలిపి సాగుచేయుచో సామాన్యముగ అగస్టులోను, విడిగా సాగు చేయుచో కొర్రను జూన్ లోను ప్రత్తిని నెట్టెంబరులోను విత్తుదురు. ఇట్లు కత్తునో ప్రత్తితో ఉలవ వగైరా కాయధాన్యములను కలిపి చుట్టుటయు గలదు. కాని యులవ కాడలు ప్రత్తి మొక్కలపై కౌగ బ్రాకుటవలన కొంత హాని కలుగును. వేరుసెనగ వేత యాలస్యముగ జరుగుచో దానితో రెండువరుసల కొక వరుస చొప్పున ప్రత్తిని విత్తుట కలదు:-

గోదావరి జిల్లాలోని గొల్లప్రోలు ప్రాంతము లందలి రేవడి నేలలందు జొన్నకు బదులు మెట్టవడిని తొలకరిని విత్తి సాగుచేసి దీనితో ప్రత్తిని కలిపి పెట్టుటయు, ప్రత్తిని ఉత్తగకార్తెలో నాటబడు ఉల్లితో కలిపి సాగుచేయుటయు గలదు. వేరుసెనగకు బదులు మిర్చిని గాని, ఉల్లినిగాని రెంటిని కలిపిగాని సాగుచేసి వీనితో ఎర్రశణముగ విత్తుటయు గలదు.

2. రేవడి నేలలకు (బళ్లారి జిల్లాలో)

1 వ సం॥ ముంగారిప్రత్తి + కందికలిపి

2 వ సం॥ వేరుసెనగ.

3 వ సం॥ పయరజొన్న + కాయధాన్యములు.

మొదటి పరివర్తనమునందు వలెనే దీనియందును తగిన మార్పులను గావించుకొనవచ్చును.

+ జొన్నతో తరుచుకలిపి సాగుచేయబడు కాయధాన్య వాటి పెసర, సెనగను కలిపి సాగుచేయుటయు గలదు. ఒక్కొక్కప్పుడు కుసుంబాను కలుపుదురు. ఈ మూడవ సంవత్సరమున పయరజొన్నకు బదులు పునాస జొన్నను పిలిపెనతో కలిపి సాగుచేసి దానివెనుక సెనగను లేక ధనియమును ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుట కలదు.

3 గరుప నేలలకు (విశాఖపట్నం జిల్లాలో)

1 వ సం॥ తొలకరిచోడి, పిమ్మట ఉలవ *

2 వ సం॥ తొలకరి నూవు, పిమ్మట ఎర్రపత్తి.

3 వ సం॥ వేరుసెనగ + కంది.

ప్రతికీ పరిస్థితు లనుకూలముగ లేనిచోట కుటుంబోపయోగము నకు వేరుసెనగతో ప్రతిని స్వల్పముగ కలిపి సాగుచేసి, కందిని రెండవ సంవత్సరమున నూవుతో కలిపి సాగుచేయుట గలదు.

4. గరుపకూడి యెర్రనేలలకు (విశాఖపట్నం జిల్లాలో)

1 వ సం॥ చిన్నప్రత్తి (ప్రత్యేకముగ)

2 వ సం॥ వేరుసెనగ - పిమ్మట జొన్న + ఉలవ (పశువులమేతకు)

3 వ సం॥ తొలకరినూవు + కంది

4 వ సం॥ గంటె* + సుము

ప్రత్తితో కండిని జనుమును కలుపుటయు, ఇవికాక కొర్రను తొలకరి జొన్నను స్వల్పముగ గలుపుటయు గలదు.

* ఉలవకు బదులు పెసర, నినుము, అనుము వర్తరాలను గూడ పెట్టవచ్చును.

+ వేరు సెనగతో కండికి బదులు జనుమును విత్తులకొరిత చిల్లు టయు, నీకంపనుండి నారను దీయుటయు కూడ గలదు.

* నాల్గవ సం॥న గంటెకు బదులు చాలు చోడిని సాగుచేయవచ్చును. తొలకరిని గంటెను ప్రత్యేకముగ బెట్టి పిమ్మట చాలు చోడితో బొబ్బరను కలిపి సాగుచేయుటయు గలదు. ఈ మూడవ సంవత్సరమే నూవును ప్రత్యేకముగ బెట్టి పిమ్మట చోడిని బొబ్బరను సాగుచేయవచ్చును. అప్పుడు నాల్గవ సంవత్సరమున గంటితో కండిని కలుపవచ్చును.

5. గోదావరి జిల్లాలోని మెరకవండలి నేలలకు

- 1 వ సం॥ మెట్టకరి + కంఠి + ఎర్రప్రత్తి
- 2 వ సం॥ మిర్చి లేక మెట్టవంగ
- 3 వ సం॥ పయరజొన్న + కాయభాస్యములు +

కండియు ప్రత్తియు నేకాక వీనితోపాటు కొర్ర, జనుకు, గోగు, దోస వగైరా విత్తులనుగూడ స్వీయముగ కలుపుటగలదు.

విశాఖపట్టణపు జిల్లాలో మాగాణి భూములందు ఒకటి రెండు తడులుపెట్టి సాగుచేయు చిన్నప్రత్తి (బురద ప్రత్తి) ని వరిచేయ ను కోసిన వెనుక డిసెంబరు జనవరులలో విత్తుగరు. తరుమ దీనిని పయరనూపుతో కలిపి సాగుచేయుదురు. ప్రత్తి మొక్కలు తరువాత పరిపంతుకు నీలంకు తరకుపెరిగి కాయంచుండును. కడపటి సారిప్రత్తి నేరిన వెనుక నిలచి యుండు మొక్కల కొట్టను మరుచటి పరిపైరుకు పచ్చి మొరువుగా దున్ని వేయుదురు.

తోట నేలలందు నీరు పెట్టి సాగుచేయబడు కంబోడియా ప్రత్తియు ఇతర ఆమెరికా రకములను అయోప్రాంతములందు సామాన్యముగ సాగుచేయబడు నిలిరి తోట ప్రియులతో పరివర్తనము గావింపబడును. ఇవి సామాన్యముగ ప్రత్యేకముగ నే సాగు చేయబడుచుండును.

వర్షాధారమున బెంచబడు కేకీయ ప్రత్తిరకములను నుభయముగ ఎర్రప్రత్తి, చిన్నప్రత్తి మొదలగు *Garboreum* జాతిలోని వానిని సామాన్యముగ ప్రత్యేకముగ సాగుచేయుటకంటె తృణభాస్యములు వగైర యితర స్యములతో నిశ్రణముగ సాగుచేయుటయే అనుభవ శ్రావ్యక సాంప్రదాయము. కేకీయ ప్రత్తిరకముల వేళ్లు లోతుగా బోవుటచేతను తృణభాస్య జాతులు చురుకుగ నెదిగి ఫలించి త్వరితముగోసివేయబడిన వెనుక ప్రత్తి మొక్కలు విజృంభించి చాలకాలము పెరుగ గలవగుటచేతను నీరెంటి నిశ్రణమును చాల యనుకూలమైనది. ఇట్టిస్వయము లోకదానితో వొకటి నేలయందలి సాగునున్న పొట్టి

† పయరజొన్నతో తరుమ నీలిగిం జలను గలిపి విత్తుటయుగలదు.

పడక ఒకదానివెనుక మరియొకటి విజృంభించి పెరిగి ఫలించుటవలన రెండుసస్యములను కలిపి సాగుచేయుచో నీరెంటిని సుము సుము విస్తీర్ణమున వేర్వేరుగ సాగుచేసి నప్పటి కంటె హెచ్చుపంటనే యిచ్చును. గోదావరి డెల్టా మెరక వండలి భూములలో మెట్టవరిని కండిని ప్రత్తిని కలిపి పెదజలుచోట వరిపంటలో తగుదల లేకయే యీ రెంటినుండియు కొంచెమిం మిమ్మించి వానిని ప్రత్యేకముగ సాగుచేసినప్పటియంత రాబడియు కలుగును. మరియు నిట్టి మిశ్రసేవ్యము కర్షకుల కూడా గుడ్డ, కువలయు దినుసులతోపాటు పసువులనే తిను వలయు దినుసులను కొంత వంట చేరుకును కూడ లభించుటచే కమతపు స్వయంసమృద్ధికి గూడ కొంత తోడ్పడును.

కంబోడియా ప్రత్తి మెదలగు అమెరికా రకములవేళ్లు లేకయ రకములంత లోతునకు బోవు స్వభావముగలవి కాకపోవుటచే అవి సామాన్యముగ తృణధాన్యజాతులతోగాని వేళ్లు పైపైన వ్యాపించు నిరసస్యములతోగాని మిశ్రమ సాగున కనకూలముకావు.

సాగు విధానము

ఈ దేశమున నాయుప్రాంతములందలి కర్షకుల చిరకాలానుభవము వలన నేర్పడిన అనువంశికవగు ప్రత్తిసాగు విధానములు చాల యుత్కృష్టమైనవి. వారలు ప్రత్తి కనకూలముగ వాతావరణాని పరిస్థితులను బట్టి యే ప్రాంతములం దెకాలమున నెట్టి నేలలందెట్టి రకముల నెట్లు సాగుచేయుట యుక్తమో గ్రహించి యట్లే చేయుచున్నారు. వారి వలంబించుచున్న పరివర్తనములను, శ్రావములను ఉత్కృష్టపై నవి. ముందువివరింపబడనట్లు ప్రత్తిచేల కరవువేసి సత్తుపశేయు విధానమున గూడ వారల యనభవ పూర్వక సాంప్రదాయముల ఆధునిక పరిశోధనలచే ధ్రువపడినవి.

ఈస్టుండియా కంపెనీవా గమెరికా దేశపు ప్రత్తిరకముల నీదేశమునకు దెచ్చి సాగుచేయించు సందర్భమున 1845-46 వ సం॥ అమెరికా దేశపు ప్రత్తి వ్యయసాయదారుడు మెరూర్ (Merur) గారిని పిలిపించగా అయన నీదేశీయ విధానమునగరించి “అమెరికాలో

నవలంబింపబడు విధానములు ఇండియా కనుకూలము గావు ఇండియా దేశ స్థులు స్థానిక శ్రీ శోష్ణ పరిస్థితుల యొక్కయు తమ నేలల మంచి చెడ్డల యొక్కయు పరిజ్ఞానము గలిగి ఏ విశోధనము గాని చేయగలరు దాని కంటే బాగుగను, పొగుపుగను సాధించేయునున్నారు *” అని తనయభిప్రాయమును తెలిపెను. ఫ్రాన్సిస్ బ్రౌను (Francis brown) అను మరియొక ప్రవీణుడు “బ్రిటిష్ కర్షకునికి గోధుమసాగును నేర్పుటకు బెలియమ్ దేశుని పంపుటెంతయుచి నైనా, అమెరికా దేశసుని ఇండియా దేశస్థునికి ప్రతిసాగును నేర్పుటకు గాను పంపుటయు సంతోయుచియుగ నుండును” అని వ్రాసెను *. కావున నిపుడాయా ప్రాంతములం దను లులొనున్న విధానములకంటే శ్రేష్ఠమగు విధానములను గనిపెట్టట చాల కష్టమైనది. వినను ఇటీవల నీ దేశమున జరిగిన పరిశోధనల మూలమున తేలిన కొన్ని కొత్తవిషయములు లేకపోవును, ఇంకను అవకాశముగలదు. కాని మధ్యస్థ విధానములవారిగూ పరిశోధకులు, తమ అన్వేషణకు అనుభవజ్ఞుల కర్షకుల యుత్తమ సాంప్రదాయము లనే పునాదులుగా చేసికొనిన నే వారు కనిపెట్టు విధానములు అచరణ యోగ్యములును, నమ్మకమైన ఫలము గలిగించువియు నగును. ఆయా పరిస్థితులలో నవలంబింపబడుచున్న లేక అవలంబింపదగిన విధానము లనుగూర్చి యీ క్రింద సంప్రదానముగ చెప్పబడును.

* He wrote that the American system was not adapted to India"; and that "the natives of India were, from their knowledge of climate and capability of soilable to cultivate better and much more economically than any European".

* He wrote that....."he would as soon send for American planters to teach Indians in their art (of growing cotton) as he would send for Belgian farmers to teach British farmers in the art of growing Wheat"

(అ) వర్షాధారమున ఆగవు - అక్టోబరులో విత్తబడు ప్రత్తికి.- తొలికిరించిన వెనుకగాని, సాధ్యమైనంత ముంగుసే గాని ప్రాగంభించి నేలను బాగుగ గున్ని తశారుచేయవలసి యుండును. రక్కశేకు నాగటితో ముందు రెండు మూడు సార్లు బాగుగ గున్ని ఓమ్మట విత్తువరకును అపుడపుడు గుంటకితోగాని యితర పనిముట్టుతో గాని యొకనేద్యము చేయుచుండదగును. రాయలసీమలోని జిగుగుపాచ్చుగ నుండు కృష్ణరేవడి నేల నిట్లేటేట లోతుగ గున్నట యనవలసినవియు అననుకూలమనియు కంటే లనుభవమువలన గ్రహించియుండుటచే నేల నేటేట గన్నక, మొదటి నండియు గుంటకితోనే మంటిని రేపుమింగుదు. అధునిక పరిశోధనల గూడ నీయాచారమును బలపరుచుచున్నవి *

వర్షాధారమున ప్రత్తిసాగు చేయునేలకు సామాన్యముగ తృణ ధాన్యములు మొదలుగు నితర సస్యములువలె సాగుచేయు సంవత్సరము పశువుల యెరువును వేయుటకంటె అంతకు ముంగు సంవత్సరము సాగుచేయబడు తృణధాన్య సస్యమునకే అట్టి యెరువును తీసంత వేయుట మంచిదని కర్షకుల యనుభవమును, పరిశోధనా ఫలమును నైయున్నది*. కాని ప్రత్తిని తృణధాన్యములు వైరా యితర

* ఈ పరిశోధనలంగిట్టి నేల నేటేటరున్నటవలన పంట హచ్చకపోవుటచే నింగులకగు నదనపు వ్యయము వృధాయగునని తేలిను. అట్టినేలల నేటేట లోతుగ గున్నటో సేంద్రీయ పదార్థము గూడ కీక్రముగ తగ్గును. ఎప్పుడైన నధికవర్షము గురియుచో నేలయూట చేసి సస్యము చెడును.

* సామాన్యముగ తృణధాన్యపు పంటకైనను సరిపడు పశువుల యెరువు భింమట కష్టమగుటచే గూడ ప్రత్తి నేరుగ వెరువువేయుట సాధ్యపడదు. తృణధాన్యజాతులకంటె ప్రత్తి వేళ్లు లోతుగబోయి సామును తీసికొనగలుగుటచే యెరువువేయకపోయినను నీ సస్యమంతగా నీరసించదు. చిక్కుడు కలుంబములోని దగుటచే వేరు నెగగుకూడ సామాన్యముగ పశువుల యెరువును వేయవలసినందుడు. ఏలగునో

స్వములలో గలిగి సాగుచేయునపుడా మిత్రణమునకు నేరుగ వేయుట తృణధాన్యపు పోతువ కవరము కావచ్చును. ఇట్టి యెరువుల నుప్రత్తికి నేరుగ వేయుచో మొక్కలు పొచ్చుగ రొట్టపోసి కాపు తగ్గవచ్చును. వీనిని వేయుటవలన పైకేళ్లు పొచ్చుగ బయలుదేరి యెద్దడి కాలమున తరపునబ్బును పొచ్చుగ నుండ వచ్చును.

జిడినికి పెంటను, పండలి మంటిని వేయదగను. కావున పై 1,2,3 పరి వర్తనములలో 3 సంవత్సరముల కొకసారి మాత్రమే పసువుల యెరువును వేసిన చాలు. 4 వ పరివర్తనమునకు ప్రత్యేకముగ దాని నిష్క్రమములుగాని విత్తెరువు 8 సంవత్సరములలోను 4 సంవత్సరముల కాయధాన్య గాతులగుటచే నింగు నాలుగేండ్ల కొకసారి పసువుల యెరువువేసిన చాలు. కావున నిట్టి పరివర్తనము లవలంబించుచో పసువుల యెరువు సమస్య అంత తీవ్రముగ నుండదు.

వ్యవసాయ సంస్థానమున జరిగిన తణిఖీ వలన పసువుల యెరువు ప్రత్తిచేనికి వేసిన సంవత్సరము ప్రత్తిగుబడి పొచ్చులేదు. హగరి తేత్రమున గూడ పసువుల యెరువుగాని కంటోట్టుగాని వేసిన సంవత్సరము ఫలితములే యుండెను కాని యీరెండు చోట్లను వెనకటి సంవత్సరపు శృణధాన్య స్వమునకు వేసినయెరువు మూలమున తరువాతి సంవత్సరపు ప్రత్తి పంట నుండు పొచ్చుదల కనిపించెను. సంద్యాల తేత్రమున జరిగిన యొకతణిఖీలో జొన్న చేనికొక సారి ఎ 1 కి 5 బండ్ల చొప్పున పసువు యెరువువేసి మరుచటి సంవత్సరమున ప్రత్తి సాగు చేయగా నట్టివరిలో యెరువువేసి యుండని మళ్ళిలో కంటే నూటికి 12 వంతుల పొచ్చు ప్రత్తినిచ్చుటయే కాక ఆ సత్తున ఫలము తరువాతి సంవత్సరము మిగుల సాగుచేసిన జొన్నచేనికి పంటయందును అమరుచటి సంవత్సరము సాగుచేసిన రెండవ ప్రత్తి పంటయందును గూడ కనబడెను.

మిరుగుగ బనిచేయు వేరువెనుపిండి, అమ్మోనియా గంధకము మొదలగు నుష్కారపు టెరువు వైనను ప్రత్యేకముగ గాని, పసువులయెరువు లో కలిపిగాని ప్రత్తికి నేరుగ వేయుటవలన నమ్మకమైన ఫలితము కనబడలేదు. కొన్ని సంవత్సరములలో కాలానుగుణ్యతచే పంటకొంత

విత్తులను పరిశీతులను బట్టి 15-24 అం. యెడముగల వరులలో గొర్రుతో వేయదగును. * ఇందులకు కొన్నిచోట్ల యుక్తమగు (సామాన్యముగ 18 అం॥) దూరమున పలుగులమగ్గబడిన రెండు లేక మూడు చార్ల గొర్రునుపయోగింతురు. సామాన్యపు (సుమారు 9-10½ అం. దూరమున పలుగులుగల) మూడుచార్ల గొర్రునే అందలి మధ్య గొట్ట

వ్య హెచ్చినను మరికొన్ని సంవత్సరము లందట్టి పెంపులేకపోగా పంట తగ్గుటయు సంభవించెను. కాని యీ యెరువును వెనుకటి జొన్నచేనికి వేయుట వలన ప్రయోజనముండెను. నంద్యాల త్రేత్రము నందలి యొక తణిఖ్లో జొన్నకు ౧ కి 224 పా. అమ్మోనియా గంధకమును, 112 పా. అధిస్ఫురితమును వేయగా తరువాత సాగు చేయబడిన మొదటి ప్రత్తిపంట 2½% ను, నాల్గవ సం॥ సాగుచేసిన రెండవ ప్రత్తిపంట 7% పెరిగెను. పైయుత్సాగపు టెరువును 5 బండ్ల పశువుల యెరువుగోపాట అదనము వేయుటవలన తొలి ప్రత్తిపంట 38% ను, రెండవ ప్రత్తి పంట 20% పెరిగెను. కాని యిట్టి యుత్సాగపు టెరువుల యుపయోగము దినుసులకు ధర హెచ్చునున్న రోజులలో అనుకూల పరిస్థితులందు కీట్టుబాటుగ నున్నను, సామాన్యముగ కీట్టుబాటుగ నుండదు.

* పైని హెచ్చుతో గూడియుండు ప్రతిగింజలను విత్తునపుడు గింజలొకదానికొకటి యంటుకొనకుండుటకు గాను వానిని పేడ తోను తడిమంటితోను గలిపిరాచి యెండబెట్టుచుందురు. ఇంగుకు బగులుగ నీవిత్తును చిక్కని (నీరుకలుపని) గంధకధృతి (Concentrated sulphuric acid) లో 20-30 నిమిషములుంచి మరల పెక్కుసారు నీటితో కడిగి యెండబెట్టి విత్తుతో గింజలు చైతన్యము చెడక పోవుటయేగాక అవి హెచ్చుగను కీఘ్రముగను మెలమనని కని పెట్టబడెను. ఇట్టి సంస్కరణమువలన వానిపై చేవని తెగున బీజము లున్న ననియు నశించును. ప్రత్తిగింజను తామ్రకర్బునిత (Copper carbonate) నీటిలో నానవేసి యెండబెట్టి విత్తుతో నవిబాగుగ మెలమటయేగాక వానినుండి పుట్టు మొక్కలబాగుగ నేడిగి హెచ్చుపంట వొసగునని కూడ పరిశోధనలవలన జేరెను. (వ్యవసాయకాస్త్రము 2 వ సంపుటము చూడుడు)

మును మూసివేసి యపయోగింపవచ్చును. ప్రత్తిగింజను విత్తుగొర్రల జడిగములందలి కన్నములీ గింజలు నిగుటకు తగినంత పెద్దగనండవలెను. కృష్ణరేపడివేలలో కొగ్రో ప్రసముగ సాగుచేయునపుడు మాడుచాళ్ల గొర్రుతో మధ్యగొట్టమును మూసి మంగు కొర్రవత్తును వేసి వెనుక నాచాలో అక్కడి గొట్టముగండగాని, నాగటివెనుకగాని ప్రత్తిపత్తులను వేయుదురు. కొగ్రను 6 చాళ్ల గొర్రుతో వేయచోట నిటు 2,5 గొట్టమును మూసివేసి పిమ్మట వానిలో ప్రత్తి గింజలను వేయుదురు. 6 చాళ్లలోను కొర్ర విస్తువేసి 2-3.4-5, 6-1 వరుసలకు మధ్యగా ప్రత్తిగింజలను నాగటి చాలున వేయుటయు గలదు.

గొర్రు ఉపయోగములోని ప్రజేశములంగు ప్రత్తిని తగినంత యెడమగల నాగటిచాళ్ళలో విత్తుదురు.

గొర్రుతో వేసినను నాగటి చాలులో వేసినను విత్తులను వరుసలో నొత్తుగ (సుమారు 3 అం.ల కొకటి చొప్పున) వేయదగును. ఇంతకంటె యెడమగ వేయచో ఫట్టిన మొక్కలలో కొన్ని మాత్రము ఏపుగ బెరుగును గావున తుదకు పుష్పియైన మొక్కలు తగినన్ని నిలువక పంట తగ్గవని కనిపెట్టబడెను. ప్రత్తిగింజలను సుమారు రెండంగుళములకింటె లోతుగ కప్పివేయగూడదు. లోతుగ గప్పబడిన గింజలనుండి మొలకలు జొన్న మొలకలవలె పైకి పొడచుకొని రాజాలక పోవుటచే చేసు పలచబడి పోవును.

విత్తులను గొర్రుతో వేసినపుడు పైని గుంటకను దోలి వానిని కప్పుదురు. నాగటి చాలున వేసినపుడు వానిని మరియొక నాగటిని ప్రక్కను దోలి కప్పుదురు.

మొక్కపుట్టి యెగుగ నారంభించిన వెనుక చేయదగిన పనులు వరుసలమధ్య అంతరకృషిచేసి యందు తగినంత పదును నిలుపుటయు, కలుపు మొక్కలను జంపుట లేక తీసివేయుటయు వైయున్నవి. విరము గురిసి మరిల వేల బాగుగానారినపుడెల్ల నొకసారి తగిన పనిముట్లతో విట్లాంతరకృషి సలపవలసి యుండును. ఇంగులకు సామాన్యముగ మెట్లగుంటకను దంతులను లేక గుంటకను తోలుదురు. కొర్రతో

నిశ్రణముగ జలినపుడు కొగ్రచేనిని గోయువరకు నిట్లు మెట్టుగుంటకను దంతులను ఉపయోగించి కోసినవెనుక దాని కోతకాలు లేచిపోవునట్లు కర్రనాగటితో గున్ని యటుపిమ్మట ప్రతివరుసల కనుగుణమగు వెడల్పు పలుగుగల గుంటక నుపయోగింతురు. తొలిసారి యంతరకృషిచేయు నపుడు మంటిని సాధ్యమైనంత పైపైననే రేపవలెను. ఓమ్మట క్రమముగ నింతకంటె నించుకలూతుగ రేపవచ్చును. సామాన్యముగ నిట్లు 4-6 సార్లు అంతరకృషి చేయుదురు. ఈసంఖ్య వర్షపాత ప్రకారము ననుసరించి యుండును. వర్షము తక్కువగ గురిసి పసును నిలుపవలసిన యావశ్యకత హెచ్చినకొలదిని యీ సంఖ్య హెచ్చును. హెచ్చుగురియు చోటను, అట్లుగురిసిన సంవత్సరము లందును యీ సంఖ్య తగ్గును. ఒక్కొక్కప్పుడు వర్షము తరుచు గురియుచుండుట వలన ఒకటి రెండు సార్లకంటె నాంతరకృషి కవకాశములేక పోవచ్చును.

అంతరకృషి చేసినపుడెల్ల మొక్కల మరుసలో నేవైన కలుపు మొక్కలున్నచో వానిని లాగివేయుచుండవలెను. వర్షాధ్యత వలన నాంతరకృషికి వీలులేక కలుపు పెరిగిపోవుచో వరుస మధ్యను వరుసల లోను కూడ ప్రత్యేకముగ గలుపు తీయవలసియుండును.

విత్తులను నాగటిచాలున వేయుచోట సామాన్యముగ నా మొక్కలు చిన్నవిగ నున్నపుడొక సారియు ఓమ్మట 5, 6 వారములకు మరియొక సారియు గొప్పత్రవ్వ కలుపు తీయుదురు. కాని చాళీసు తిన్నగ తోలుచో మెడట నొకసారి గొప్పత్రవ్వ పిమ్మట 2, 3 సార్లు కర్రనాగటితో నాంతరకృషి చేయవచ్చును.

ఆగష్టు నెలపైబరులలో విత్తి పైవిధమున సాగుచేయుటకు ప్రత్తిచేల యందు కాయలు సామాన్యముగ ఛెబ్రువరిలో విడువనారంభించి నెలకు రెండుసార్లు చొప్పున సుమారు 3 నెలలు (ఏప్రిలులో కడపటివరకు) ప్రత్తి నేరుచుండవలసి యుండును. పదును నిలుచు నేలలందు, మేలోకూడ యొకసారి ప్రత్తి నేరదగి యుండవచ్చును. కాని యీప్రత్తి యంత నాణెముగ నుండదు.

ప్రత్తి నేరునపుడు సాధ్యమైనంతవరకు యెండుటాకు ముక్క లును కాయలందలి భాగములును ప్రత్తి కంటుకొనకుండ జూడవలెను. గింజలు పుచ్చిడాగుపడిన ప్రత్తిని వేరుగ నుంచదగును.

సామాన్య పరిస్థితులం దీవిభానమున ఎంచిన వంగడములను క్రద్ధగ సాగుచేయుచో, ప్రత్యేకముగ విత్తబడిన 'పశ్చిమ' ప్రాంతపు తెల్లప్రత్తి చేనుండియు, 'ఉత్తరప్రాంతపు' ప్రత్తి చేలునుండి సగుటన నకరమునకు 800-400 సానుల ప్రత్తి గనుబడి కావచ్చును. కాకినాడ ప్రత్తి (W. G. 1) సుమారు 400-500 సానులు కావచ్చును. విశ్రాంతి మూలగ నింగు $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ పాతు 0 వచ్చును.

కృష్ణరేపడి భూములలో పశ్చిమప్రాంతపు ప్రత్తి (W.I) సాగు విభానపు విషయములును ఒక యొకరిమున న సాగునకగు వ్యయమును దాని వలన రాదగు నాదాయమును నీక్రింది పట్టికయందు దించినా వేయబడినను.

ఒక యొకరిము కృష్ణరేపడి భూమిపై పశ్చిమ ప్రాంతపు ప్రత్తి (W. 1) సాగునకగు వ్యయము యొక్కయు అంచులన రాదగు ఆదాయము యొక్కయు అంచినా.

నెల	పని వివరములు	పాటు			వ్యయము	
		స.	జ	మ		అ/పె.
డిసెంబరు-జనవరి	నాలుగేండ్ల కొకసారి పెద్ద గునుపనాగటితో గున్నట్ల కగు వ్యయములో న్నావ వంతు.	2	2			4-0
ఫిబ్రవరి.	రెండుసార్లు గుంటక నదోలి కోతి కాలుము గోపియట్ల.	1	1			2-0
మార్చి.	గుంటకతో ఎడసాగు ...	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			1-0
అప్రిల్.	" "	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			1-0
మే.	" "	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			1-0

(contd)

నెల	పనివివరములు	పాటు			వ్యయము
		ప. జ.	మ.	ఆ/ప. ర.	అ.
	వేసుకటి త్రణ న్యపుపైరు నకు వేయబడిన పసువుల యెరువులో $\frac{1}{2}$ భాగపు (5	—	—	—	5-0
	బండ్ల) విలువ.....				
సెప్టెంబరు.	గుంటకతో ఎడసాగు	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	1-0
,,	వితులు 12 పా.				1-8
,,	గొర్రుతో 18 అం.దూరపు వరుసలలో వేయుట, గుం టకతోలి కప్పట	1	$1\frac{1}{2}$	—	2-4
	అంతరకృషి-4 సార్లు, వరు లలో కలుపు తీత	2	2	8	6-0
అక్టోబరు -	ప్రత్తి నేరుట-6 సార్లు ($4\frac{1}{2}$			18	4-8
డిసెంబరు	రైలు మణుగులు, కంపపీకి తీసివేయుట 20 మణుగులు.		5		2-8
	రాబడి	8	$18\frac{1}{2}$	20	31-12
	ప్రత్తి - $4\frac{1}{2}$ మణుగులు				40-8
	కంప - 20 మణుగులు				8-5
	మొత్తం				43-13
	నికరాదాయము				12-1

గరుపకొడి లేక మిశ్రమ లేకడి నేలందు ఎర్రప్రత్తి (G.I) సాగునకు ముందు రెండ సార్లు దున్నకనియుండను. కిమ్మట 4 సార్లు డపుడెడసాగుచేసి విత్తనంను. ముడ సారాంతరకృషి చేయవలసి యుండును. మొత్తము మొద 8. ప. జ. యొక్కయు 1; రువనుభ్యుల యొక్కయు 20 రు అడవాండ్రయొక్కయు పాటుతో 5 మణు

గుల్ల ప్రత్తియు, 25 ముసుగుల కంపయు లభింపవచ్చును. మొత్తపు రాబడి రు 48 లును, వ్యయము రు 32 లును ఉండవచ్చును.

తెల్లప్రత్తి (W. 1) ని కొర్రతో మిశ్రముగా సాగుచేయుచో రెంటికిని చేరి ఆదాయవ్యయము లీక్రింద జాపినట్లుండ వచ్చును.

వ్యయము - 10 ప. జ., 2) మ 12 3/4. సాగునకు రు	33-0-0
ఎరువు 4 బండు	4-0-0
విత్తులు-కొర్ర 6 పా. ప్రత్తి 10 పా	0-5-0
	37-5-0

రాబడి:-

ప్రత్తి 3 మ. కంప 15 మ. కు -	29-8-0
కొర్రలు 6 మ. దంటు 12 మ. కు -	29-0-0
	58-8-0
నికరాదాయము.	20-9-0

(ఆ) తొలకరిచి (జూన్ జులైలలో) విత్తి సాగుచేయు ప్రత్తికి :- దీనికి కృష్ణరేవడి నేలలందు పైవిధానమునవలె నేలను తొలకరికి ముంగుళ నే తయారుచేసి యుంచి తొలకరించి తగినంత వర్షము గురిసిన వెంటనే కొర్రతో విత్తును వేయవలెను. గరుపకొడి లేక మిశ్రము లేవడి నేలలందు రెండు మూడు పార్లు గున్ని 3-4 సార్లు గుంటక గోలదగును. పిమ్మట కొర్రతోగాని కొర్రలుపయోగములేని చోట్ల నాగటి చాచినగాని విత్తును వేయదగును. ఈ కాలమున విత్తు ముంగారి, ప్రత్తి మొక్కలును, చిన్న ప్రత్తి మొక్కలును పక్కిము, ఉత్తా ప్రాంతముల తెల్లప్రత్తి మొక్కల కంటే పెద్దవిగా నెదుగుటచే వరుససాధ్య యొడయును కొంచెము చిల్లిచి విత్తు నిండుక తగించి వేయవచ్చును. కండిని కలిపి సాగుచేయదలచుచో మూడు ప్రత్తి వరుసల తగువారత కొకకండి వరుస వేయదగును గుత్తివేరునెను. సోవేయుచో నిడివిలో దెలుపబడినట్లు రెండు వేరునెన వరుసల కొక వరుస ప్రత్తి చొప్పున వేయవలెను. సూవుతోగూడ నిట్లే విత్తవచ్చును.

మొక్కలు కొంచెమైన వెనుక నొకసారియు మరి 5-10 వారముల నొకసారియు అంతిమ ప్రసేవలెను. ఈ గొప్పత్రవ్వ కలుపు తీయవలెను. ప్రతివిడుపు అట్టొరులో నానంబించి డిసెంబరు వరకుండును. ఈ కాలమున విత్తబడిన శ్రద్ధగా సాగుచేయుదు ముంగారి ప్రతిచేను కాని చిన్న ప్రతిచేనుకాని యొకరమునకు 400-500 సానుల ప్రతి నీయవచ్చును. గుత్తివేరుచెనగలో మిశ్రణముగ నిండు సుమారు

గరుపకొడి నేలపై తొలకరిని ఒక యొకరము చిన్న ప్రతిని విత్తిసాగు చేయుటకగు వ్యయము, అందువలన రాదగురాబడి

నెల	చేయవలసిన పని.	ప.జ.	మ.	ఆ/పి	వ్యయం ర.ఆ.
మార్చి-మే	గుడ్డి - 2 సార్లు.	3	3	-	6-0
మార్చి-జూన్	ఎడసాగు - 4 సార్లు.	2	2	-	4-0
"	వెనుకటి సంవత్సరమున వేసిన పసు వుల యొరువులో $\frac{1}{2}$ భాగము (5 బండ్లు)	-	-	-	5-0
	విత్తులను నాగటిచాలున (20 అం. దూరమున) వరులలో వేసి మరి యొక నాగటిని నోటికప్పుట	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	3-6
జూలై ఆగష్టు	గొప్పత్రవ్వ కలుపుతీయుట	-	-	24	6-0
అక్టో-డిసెం.	ప్రత్తియేరుట ($5\frac{1}{2}$ మ.)	-	-	22	5-8
	కంపతీసివేయుట (25 మ.)	-	5	-	2-8
		$6\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	$47\frac{1}{4}$	82-6
	రాగడి - ప్రత్తి $5\frac{1}{2}$ మ.				8-8
	కంప 25 మ.				4-3
					<u>42-11</u>
	నికరాదాయము				10-5

శ్రీ వంతును, నూవుగో శ్రీ వంతును కావచ్చును. గరుపకొడి నేలపై తొలకరిని ఒక యొకరములో చిన్న ప్రత్తిని ప్రత్యేకముగ విత్తి సాగు చేయు విధానమును, అందులకగు వ్యయమును దానివలన రాదగు నాదాయము వెనుకపుటలో యంచనా వేయబడెను.

గోదావరి డెల్టా మెట్టభూముంగు తొలకరిని విత్తు యెర్ర ప్రత్తి గింజలను మెట్టవరిగోను కందిగోను (నికరమునకు గి సానులు కందులు 1½ సా. ప్రత్తిగింజలు చొప్పున) కలిపి పెదజల్లుదురు. ఇమ్మట లేలిక నేలలందొకసారి గొప్ప త్రవ్వి కలుపుతీసి మరియొకసారి కలుపు మాత్రము తీయుదురు జరుగు నేలలందొకటి రెండుసార్లు కలుపుమాత్రము తీయుదురు. ఇట్లు సాగుచేసినపుడు ఎ 1 కి సుమారు 120-180 సానుల ప్రత్తి యగును

(ఇ) చిన్న ప్రత్తిని విశాఖపట్టణపు జిల్లా మాగాణి భూములలో సాగుచేయు విధానము :- వరిచేసి గోసినప్పటి నుండియు నేలను పయగ నూవుచేసికి వలెనే జనవరి ప్రారంభముననేగాని, డిసెంబరు కడపటి భాగముననే కాని దగ్గూరుచేసి తడిపి లేక వరము గురియుచో నా పగునున విత్తులను నాగటి చాలున 15 అం. దూరపు వరుసలలో వేయదగును. గున్నటవలన నీపైపాగ మన్నారికను క్రింద లేగినంత పగునుండుచోట్ల తలిపగునుననే విత్తుటయుగలదు. నూవుగో కలిసి విత్తునపుడు గొర్రు శుష్కపయోగించుచోట్ల నూవుగింజలను చలి ప్రత్తి విత్తులను రెండు వరుసలకొక వరుసచొప్పున నాగటి చాలున వేయ వచ్చును. లేనిచోట్ల నూవువిత్తులను పెదజలి కలియదున్ని ప్రత్తి విత్తులను నాగటిచాలున 30 అం. కొక వరుసచొప్పున వేయవచ్చును. నూవుగింజ లగోపాటు ఈ విత్తులను గూడ పెదజల్లుటయు గలగు. ప్రత్యేకముగ విత్తుచో నెకగమునుకు 15 సానుల విత్తులను జొదగును. చిత్రణముగ నిందు సుమారు 2 గముచలవచ్చును. మిత్రణముగ చల్లచో నూవునకు బెట్టు 1, 2 తడులు కాక దీనికి చేయదగినపనులు లేవు. ప్రత్యేకముగ విత్తుచో దీనికి తడిపెట్టుటగును. విత్తినపనుననే మొక్కలెడిగి పరుసారివ కొలదిని వేరులాతుగ బోవును. ఏలేని వరము గురియుచో చురుకుగ బెరుగును. పిలగుచో నొకతడి పెట్టవచ్చును. వరము లేకపోయినచో

గాని తడిపెట్ట నీరు లేకపోవుచో గాని మొక్కలు కురుసగనే యుండి వానికి తగినట్లే కాదును. కావున దీనిని నూవుతో కలిపి సాగుచేయుటె లాభకరము. ఈ కారున విత్తివెంచిన ప్రత్తి మొక్కలు 2 నెలలలోపుననే బూయవారంభించి పే, జూన్, జూలై నెలలలో ప్రత్తి విడుచును. సామాన్యముగ నాగట్టలో నీమళ్ళకు నీగంగును. మొదట తక్కిన మళ్ళను నాటి పిమ్మట అప్పటికున్న ప్రత్తినేరుకొని మొక్కను లాగి వేసి రొట్టను పచ్చియేరువుగా దమ్ముచేయుదురు. కాని యప్పటికిని తగినంతవరకు గురియక వరినాటువీసలేనిచో ప్రత్తి మొక్కల నట్లేయుంచుదురు. అవియుంకను నెరిగి, మరుసటి సంవత్సరము వరి నాటువారు పూర్వము కాదు మనే యుండును. కాని పెరిశువకు తగినంత కాపుండదు. ప్రత్తిగణ్యతయు తగ్గును. వినను ముత్తముమీద వరి నాటుటకు వీలుగలుగని సంవత్సరములలో సాగునకు ప్రత్యేకముగ వ్యయము లేకుండి గనే దీనివలన కొంతరాబడి వచ్చును. కాలము సవ్యముగనున్న సంవత్సరములలో - ముఖ్యముగ జూలై నెలలోనే మళ్ళకు 5 రం ది నాటుబడుచోగాని, జూలైలోనే ముప్పవరము గురిసి మొక్కలు రొట్టపోసి కాపు తగిపోవుటచేగాని తగినంత ప్రత్తినిగుబడి యుండదు. ఇందువలనను ఈ ప్రత్తి గణ్యత చాల తక్కువగుటచేతను నీ కాలమున దీనిని సాగుచేయుట యంతగా లాభకరముగాను. వినను ప్రత్తిసాగున కనుకూమగు మెట్టనే నీ లేనిచోట్ల గ్రామమున నూత్తియుటకును ఇతర యుపయోగమునకు గావలయు ప్రత్తి కొరకు పయరనూవుతో గలిపి స్వల్పముగ సాగుచేయదగును.

(ఈ) వెనుకటి వానకాగున (అక్టోబరు నవంబరులలో) వర్షాధారమున విత్తివెనుక జేసి నూతులనుండి నీరుపెట్టి సాగుచేయు విధానము:—ఆంధ్రదేశమున నీటిప్రత్తి సాగు చాల తక్కువ. దీనికి కారణములు వర్షము తక్కువగ గురిసి పరిస్థితులు ప్రత్తి చేల కనుకూలముగ నుండుచోట్ల నీటివనరులు లేకపోవుటయు, నీటి మొనరులుగలచోట్ల తూర్పు వర్షములు మెండుగ గురిసి నీరు తరుచు చెడుచుండుటయునై యున్నవి. కాని యిపుడు వర్షాధారమున ప్రత్తిసాగు

చేయబడుచుండు రాయలసీమలో తుంగభద్ర యానకట్టను, ఇతర నీటి వనరులను నిర్మింపబడిన వెనుక ప్రతికి సీరుకట్టి సాగుచేయుట కక్కువ యవకాశ మేర్పడును. ఈవిధానమున సాగుచేయుటకు హెచ్చు దిగుబడి హెచ్చుధన గలిగియుండనట్టి కంబోడియా మొదలగు నమెరికా రకములనుకూలములు. కాలువనీరు లభించుచో కేకేయరకముల ప్రత్తి చేతు కూడ కొకటి రెండు సార్లు నీరు కట్టుచో హెచ్చు పంటనీయవచ్చును. కాని యిటు నీరుకట్టి సాగుచేయుటకు - మధ్యయుగ అమెరికా రకముల సాగునకు - మిగుల జిగురుగ నుండునేలకంటె కొంత గరువ కొడినేల లెక్కువయనుకూలము. ఐనను క్లిష్టప్రకృతి నేలలందీటి సాగువిధానము లవలంబించుటవలని మంచిచెడ్డలను గురించి జరిగిన పరిశోధనలు కొంత వరకు జయప్రదమైనట్లు తెలియుచున్నది.

రాయలసీమలో నీ విధానమున కంబోడియా ప్రత్తిని లేక యితర అమెరికా రకములను సాగుచేయుటకు కేకవానీ ప్రత్తి సాగునకు వలెనే చాలచోట అగడ్త - సెట్టింబరు నేలలో విత్తుట యనుకూలముగ నుండవచ్చును. కాని వర్షపాత భేదములను బట్టియు, నేల బరువు లికలను బట్టియు కొన్ని చోట్ల జూలై నెలలో విత్తుటయు, మరికొన్ని చోట్ల ఆక్టోబరులో విత్తుటయుగూడ ననుకూలముగ నుండవచ్చును. ఈవిధాన మున సాగుచేయబడు ప్రత్తిచేల కరువును వరాధారపుచేలకు వలెనే వెనుకటి సంవత్సరమునకుగాక నేరుగ వేయుటయే అనుకూలముగ నుండును. కాని భాగుగ జీకిన దానినే వేయవలెను. విత్తులను నాగటి చాలున అక్కడి గొట్టము గుండ 2½-3 అ. దూరపు వరుసలో 4-5 అంగుళముల కొకటి చొప్పునగాని, 9 అంగుళముల కొకచోట రెండైన గింజల చొప్పునగాని వేయదగను. మరియుక నాగటిని ప్రక్కను దోలికప్పు వచ్చును. లేక అక్కడి గొట్టమునకు వెనుకనొక బలచక్క నమర్చుచో నీయే విత్తులను గప్పను. విత్తులను 1½ అంగుళములకు వించిన లోతున కప్పకూడను. నూలి నీటితడులగచో మొత్తముమీద గరువ కొడి నేలలంగు 12-16 తడులవరము కావచ్చును. లేవడి నేలలంగు 10-12 తడులవరము కావచ్చును. కాలువ నీరుగచో నిందు సగము తడులేచాలను. సెట్టింబరులో కంబోడియా ప్రత్తిని విత్తి సాగుచేయు విధానపు వివరములను ఒక యొకరముపై నిట్టిసాగునకగు వ్యయమును, నందు వలన రాదగు నాదాయమును గ్రీకీద యంచనా వేయబడెను.

ఒక యెకరమైన కంబోడియా ప్రత్తిని నూతిసీరుకట్టి
సాగుచేయుటకగు వ్యయము, అందువలన రాబడి.

నెల	పని వివరములు	పాటు		వ్యయము	
		ప. జ.	మ.	రూ. ఆ.	రూ. ఆ.
జూన్ లోపల	దుక్కి - రెండు సార్లు	3	3		6-0
జూన్ -	ఎడసాగు - 1 సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		1
జూలై	పశువుల యెరువు - 10 బండ్లు				10-0
	తోలుట పనియట	$1\frac{1}{2}$	4		3-8
	కలియదున్నుట - 1 సారి..	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$		3-0
ఆగస్టు -	ఎడసాగు - 2 సార్లు.	1	1		2-0
సెప్టెంబరు	విత్తులు - 12 పానులు				1-8
సెప్టెంబరు	నాగటిచాచన అక్కడి గొట్టముగుండ $2\frac{1}{2}$ ఆ. దూ రపు వరుసలలో వేయుట, కప్పట.	1	1	$\frac{1}{2}$	2-2
అక్టోబరు	గొప్పవ్రవ్వి, కలుపుతీసి మొక్కవరుసలలో మం టిని ద్రోయుట		1	12	3-8
నవంబరు	అంతర కృషి, వరుసలలో కలుపుతీత.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2	1-8
డిసెంబరు	నీరుపెట్టుటకు వరుసలమధ్య చాళ్యను బోదులనుచేయుట.		4		2-0
జూన్	నీరుకట్టుట-15 సార్లు(30'') కలుపుతీత - 3 సార్లు	$22\frac{1}{2}$	45		56-4
				12	1-8

(contd)

కాన్	ప్రత్తియేరుట - 15 రైలు			
	మణుగులు.		30	7-8
	కంపలాగివేయుట.	—	6	3-0
		31½	67½	56½
				104-8
	రాబడి - 15 మ. ప్రత్తి			150-0-0
	40 మ. కంప.			8-0-0
				158-0-0
	నికరాదాయము -			53-10-0
	వరములు లేనిచోడి పెంబరు			
	లోపునకూడ 1, 2 తడులు			
	అవసరము కావచ్చును.			

(ఏ) బహువార్షిక జాతులను బెంచు విధానములు:-

బహువార్షికములుగ బెంచదగురకములలో కొండప్రత్తి యనబడు కీశియ ప్రత్తి రక మొక్కటియే ఆంధ్రదేశమున కొంత విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది. శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్టణపు జిల్లాల ఏజన్సీ ప్రాంతములందీ విత్తులను గంటెలగోను కొర్రలగోను గిలిపి తొలకరిలో నడివరకు అడవి నరక కాల్యబడిన కొండ పోళ్లలో దున్నక లేక త్రవ్వకయే పెదజలుగురు. ముందు కొర్రయ్య, పిమ్మట గంటెయ్య ఫలించును. వీనిని గోసినవెనుక ప్రత్తిచెట్టు విశృంభించును. జనవరిలో మొదలు పెట్టి మే వరకు అప్పుడప్పుడు ప్రత్తినేరుకొని చెట్టును నరక యాకంపను, గంటె, కొర్రమొడును కాల్చివేయుదురు. మరల తొలకరించిన వెనుక గంటెలను, కొర్రలను మాత్రమే జలుగురు. ఈ మొక్కలతోపాటు ప్రత్తి మోళ్ళుకూడ చిగుర్చి మరల పెగుగును. తృణధాన్యములు తగినంత పంట నిచ్చుచుండు నంతవరకెట్లు 6-8 సంవత్సరముల వరకు నీమూడు పంటలను దీసికొనుచు అటుపిమ్మట నాపోడును వదలి మరియొక క్రొత్తి పోడున విత్తుదురు. ఏటేట ఎకరము 1 కి 50 - 100 పానుల ప్రత్తికంటె

(8)

పొచ్చుకాదు. కాని దీనిని జిల్లాల యందలి పట్టణాలిలు చేతితో పింజదీసి సన్నములు వడుతుటకై సామాన్యపు చిన్ని ప్రత్తికంటె తెట్టింపు ధరకు గొందురు.

పైడిప్రత్తిచెట్టు దీపపు కత్తులొకట పెరిళ్ళలోను, పెనాలయ వవములంగను, అవనియోర నెక్కడక్కడ రెండు మూడ మూత్రము పెంచబడుచుండును. చెట్టును పం-దలచిన చోట్ల నేని కడలగొట్టి కాని, చిన్నగోలిని తీసికొని రెండు మూడు గింజును నాటి బాగుగ నెరుగు నొకమెక్కినుంచి తక్కిన వానిని దీసివేయ వచ్చును. చెట్టు నొకవరుసలో బెంచదలచుచో వానిమధ్య ఆధమును 12-15 అ. దూరముండవలెను.

పెద్దప్రత్తి (Bourbon cotton) నేం, కోయంబత్తూరుజిల్లాలలో గంటెలతో కలిపి సామాన్యపు మెట్టనేలంగు విత్తబడి, గంటెను గోసినానిన వెనుక ప్రత్తిని 5, 6 పంత్సరముల వరకుచెలినే పెరుగు నిత్తురు. విశాఖపట్టణ జిల్లాలోని యేజన్సీలో మాడుగు సరిసరిముందలి కొన్ని గ్రామములంగు పెద్దప్రత్తి నుట్టే విత్తబడి యేకవారి కముగ బెంచబడుచున్నది. ఈ ప్రత్తిని పొందూరు పట్టణాలిలు కొండే ప్రత్తి కంటెను పొచ్చుధరయిచ్చి కొంగురు. ఎనామకేరముంటి పెద్దప్రత్తి చెట్టును పెరిళ్ళలోను, తోటలలోను అవనియోర నితర చెట్టుమధ్య నెక్కడక్కడ, పైడిప్రత్తి చెట్లవలెనే నాటి పె చువచ్చును. ఒక కరు, గా బెంచదలచుచో చెట్టునకును చెట్టునకును మధ్యదూరము 6-8 అడుగులన్నచాలును.

జడప్రత్తి చెట్టునకూడ పైడిప్రత్తి చెట్లవలెనే కోయల్ల యోరలను నాటవచ్చును. చెట్టునకు చెట్టునకును 12-15 అ. దూరముండదగును. విరివిగ నూలవడుకవారు - వీనిని పెరిళ్ళలోను - ముఖ్యముగ పాతశాల ఆవరణలందును - తోటలలోను పెంచదగును వీనిని ప్రత్యేకముగ గొంత విస్తీర్ణమున నాటదలచువారు, నేలను వెనుకటి పైరును గోసిన వెనుక రెండు మూడు సార్లు గన్ని తొలకరికముంగ 4-5 బండ్ల పసుపులయెరు

వును నోలి, పరచి, కలియఁగున్ని తొలకరిని తగినంత వరము గురియగునే విత్తును 4 అడుగుల మొదలుగల వరులలో 2 అడుగుల నొకచోట రెండేసి గింజలను నాటదగును. ఇట్లు చేయుచో ఎకరమునకు సుమారు 8 పొనులు విత్తును పట్టును. వానిని పని నోజులలో రెండు గింజలను మోచనిచోట్ల మగల గింజలను నాటవలెను. మొక్కలు సుమారుక నెం మోగిన వెనుక నొకసారి గొప్పత్రవ్వి కలుపుతీసి ఒక్కొక్కచోట నొక యేఘుగ నెగుగున్న మొక్కను వదలి తక్కిన వానిని దీసివేయవలెను పిమ్మట వర్ష కాలము ముగియులోపల రెండుసార్లు అంతరకృషి చేసి వరులలో కలుపుతునలెను. వర్షము ముగిసినవెనుక మొక్కల మధ్యసాకలతో నొకసారి తిరుగొట్టవలెను. మొక్కలు పెద్దెంబరు-అయ్యెరులలో పూయ నాగంభింఁగును. కానులు డిసెంబరు - జనవరు లలో పగుల నాగంభింఁగును. ఆప్పటి నుండి మరుచటి తొలకరి వరకు ప్రత్తి నేరు చుండవలెను. ఎకినమునకే మొదటి సంవత్సరమున సుమారు 6 మణుగుల (500 పాను) ప్రత్తి కావచ్చును.

రెండవ సంవత్సరమున తొలకరిని, వరులందలి మొక్కలలో నొకటి విడిచి మొకటి తీసివేసి తక్కినవాని కొమ్మలందు కానులుండిన భాగము లనుఛేదించి వానిమధ్య నేలను పాగుతో తిరుగొట్టవలెను. మొక్కలు కదలిపోకండ గున్ననను గున్నవచ్చును. వర్ష కాలాంతమున మరిమొక సారి నేను కడుగొట్టవలెను. పిమ్మట వెనుకటి సంవత్సరములో వలెనే ప్రత్తినేరుచు రావలెను. ఈ సంవత్సరము సుమారు 8 మణుగుల ప్రత్తికావచ్చును.

మూడవ సంవత్సరము తొలకరిని మొక వరుల విడిచి మొక వరుల మొక్కను దీసివేసి, ఉంచిన వరులలో 8 అడుగులనొక నెట్టుండునట్లుచేయవలెను. ఇదివరలో కాచిన కొమ్మలను ఛేదించవలెను. మొల 4-5 బండ్ల పగులు మొదలు వేసి కలియఁగున్నవలెను. లేక కలియద్రవ్వవలెను. వర్ష కాలాంతమున మరల నొకసారి కలియద్రవ్వవలెను. పిమ్మట ప్రతిసంవత్సరమును నిజే తొలకరిని కాచినకొమ్మలను ఛేదించుచు, తొలకరిలో నొకసారియు, వర్ష కాలాంతమున నొకసారియు

చెట్లకుమధ్య కలిమిద్రవ్యమండగను. సంవత్సరము విడిచి యొక సంవత్సరము, 8వ సం॥లో వలెనే యెరువును గూడ వేయదగును. ఏటేట నుమారు 8 మణుగుల ప్రత్తి కావచ్చును. పరిస్థితులను బట్టి యిటు 7, 8 సంవత్సరముల వరకు దిగుబడి కావచ్చును. చెట్లు నీరసించి ప్రత్తి దిగుబడియు, గణ్యతయు తగ్గనారంభించిన వెనుక చెట్లను దీని వేయవలెను. 8 సంవత్సరముల వరకుంచులగు తోటనుండి, యీయెనిమిది సంవత్సరములలోను సాగునకగు వ్యయమును, అందువలని రాబడియు నీక్రింద యంచనా వేయబడినది.

	పాటు	మొత్తపు వ్యయము	ఫలసాయము	మొత్తపు రాబడి	సాగు లు			
సంవత్సరము	ప.జ.మ. అ. పి.	రు.	ప్రత్తి మ.	కంప. మ.	రు.	రు.		
1 వ సంవత్సరము	7	22	82	6	—	48	16	
2 వ సం॥	—	32	36	25	8	16	67	42
3 వ సం॥	1	34	36	38	8	16	67	34
4, 6 సం॥లు	—	64	72	50	16	32	134	84
5, 7 సం॥లు	2	68	72	66	16	32	134	68
8 వ సం॥	—	40	34	29	7	40	66	39
	10	240	272	235	61	136	516	283

అనుకూల పరిస్థితులలో నీ యెనిమిది సంవత్సరములలోను 80 మణుగుల ప్రత్తివరకు కావచ్చును.

అరిష్టములు.

ప్రత్తిచేలుపెరుగుచుండగా వర్ష మధికము గురియుటయొక ముఖ్య శిష్టము. భూత కాలమున మబ్బులును వర్షమును ప్రతికూలములు. ప్రత్తిచేలకుబట్టు చీడపురుగులలో నీ క్రిందివి ముఖ్యము.

1. ఆకుమడతపురుగు (Cotton leaf roller) :-

11 ప సటగు ఒకజాతి (Sylepta derogata) పరుగు రెక్కల పురుగు (Moth) డింభములను నిడివి యైన పచ్చపురుగులు ఆకులను మడచుకొని లోనుండి వానిని దినును. ఎట్టియాకులు కనుపడ నారంభింపనే వానినేరే యందలి పురుగులతో సహా మంటిలోపాతి నశింపుచేయుచో నీచీడ వ్యాపింపదు.


2. ప్రత్తి పేగు (Cotton Aphis-gossypii) :-

ప్రత్తియాకు మడత పురుగుచేచుట్టబడినది మొక్కల పరిభ్రామముల కీ పేగు నేకముగబట్టి యందలి రసమును చీల్చుకొని వానిని నీరిసింప జేయును. ఈ చీడపట్టినచేలపై మడ్డికూన, మిశ్రణపు (Crude oil emulsion) నీటినిగాని, చేప నూనె నబ్బునీటినిగాని, గమ్మక్కేను D. 025 పొడినిగాని చల్లవలెను.

3. ప్రత్తికాడ దొలుపుపురుగు (Cotton stem-borer) :- ఒకజాతి (Sphenoptera gossypii) బరిజె పురుగు (Beetle) మొక్క డింభము కాండమును దొంచును. రాయల సీమ యందలి ప్రత్తిచేలకు దీని వలన గొంతనష్టము గలుగుచుండును. పురుగుపట్టిన మొక్కలను గనిపెట్టి చీడవ్యాపింపకుండనే నాశము గావింపవలెను.

4. కాండపు నుసిపురుగు (Cotton stem weevil) :- ఒకజాతి చిన్నబరిజెపురుగు (Pempheris affinis) కాండపు మొగువభాగమున కన్నముచేసి లోనికిబోయి క్రిందికి దిగుటచే మొక్క

12 వ పటము



ప్రత్తి కాండపు నుసి
పురుగు (పూర్ణాకృతి)

చచ్చును. ఇది దొలమనోట్ల తరుచు కంతులు (Galls) ను కలుపుకొని ఉంటుంది. కంబోడియా ప్రత్తి చేలకు - ముఖ్యముగా దక్షిణాన - ఈ చీక వనచాని నష్టములగుచున్నది. పురుగు కష్టిన మొక్కలను ప్రాంతముననే కనిపెట్టి పికి నానము గావింపవలెను.

5. ప్రత్తికాయ దొలపు పురుగులు (Cotton boll worms) పినిమచ్చుల రెండుజాతులు (*Earias fabia* and *E. insulana*) పచ్చపురుగులు, మరొకటి (*platyedra gossypiella*) కేతకబిచ్చపురుగులు శతకాయలను దొచి యందలి

13 వ పటము

కాయదొలపు పురుగు $\times$ 4. మచ్చుల గలది. (*Earias fabia*)

గింజలను కినుటచే నా కాయలు నిలచి మురిసినను నవిగ్రుడ్డికాయలగును. ఇవిత్క్రియ నానినె బాగుగ విడువవు. దూది డాగుచు గుంజునుండును. మొదటి రెండు జాతుల పచ్చపురుగులను శతకాయలను దొచుచుండు గలదు. పురుగు పట్టిన కాయలను, రెమ్మలను గోసే నకింపు చేయవలెను,

6. ప్రత్తి నల్లులు (cotton bugs);—నల్లకుటుంబము లోని యొక జాతి (Dysderus cingulatus)

14 వ పటము

యిది ఫరుగును, ఎరియొక జాతి (Oxycaremus-loetus) మునుంగు

రుగును కనుగొను బడిచి

మందలి సాగును హరించి

వర్ణపుకాయ దొలుప చేత గుల్బానీ ప్రత్తి రంగును చెరచును.

పురుగు X 2

మొదటిజాతి పురుగులు

గ్రుడ్లు పెట్టిన కనిపెట్టి యాగ్రుడ్ల రుసునుగాని, ఆకాపాగిన వెనుక వాని డింభములనుగాని యేరి నాశనము చేయవలయును. పూర్ణదశలో

నీకీ కములను కొంచెము

కొరిసి నూనె పోసిన

నీటిపొట్లలోనికి గులిపి

చంపవచ్చును. రెండవ

జాతి పురుగుపట్టిన కాయ

లను విడచిన వెనుక నేరి

వానికి కొన్ని డింభ

కెతము (C₂) వర్ణరాల

మూలమున విషవాయు

ప్రసారము గావించి

యందలి కీటకములను

నశింపు గావింపవలెను.

ఈ విషయమును గురించి

వ్యవసాయ శాస్త్రపు

నిద్ర ప్రత్తి నల్లులు (పూర్ణదశలో)

రెండవ పురుగుమున 7 ప్రకరమున వివరింపబడినది. ప్రత్తిచేలను

బాధించు తెగల్లో నీక్రిందివిముఖ్యములు :-

1. వడలు తెగలు (Wilt disease) :- ఒక జాతి

(Fusarium vasinfectum) శీండ్రము పట్టట వలన మొక్క



యంతయుగాని ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్నికొన్ని కొమ్మలు మాత్రమే కాని వడలి పోవుట గలదు. ఈ తెగులు కృష్ణరేవడి నేల లందరిచే లో తరుచు

16 వ పటము

గాననగును. ఈ తెగులు నకు గారణ

మగు శీలీంధ్రము ఈ తెగులుపట్టిన

మొక్కల క్షేత్రమును జూపుట వలన

గాని, నేలలోదాగి యుండి గాని

మరుచుటి స్వచ్ఛమునకు సంక్ర

మించును. తెగులులేని చేలనుండి

సంగ్రహించిన విత్తులనే చల్ల

వలెను. అయితే ప్రాంతములందు

తెగులుపట్టని వంటకములను

గూడ మెంచి తీయుటకు యత్న

ములు జరుగుచున్నవి. నేలద్వారా

యా తెగులు వ్యాపింప కుండ

వడలు తెగులు పట్టిన ప్రత్తి

జేయుటకు సాధ్యమైనంత దీర్ఘ

మొక్క

పరివర్తనమవలంబింప దగును.

2. నల్లకొమ్మ తెగులు (Black arm disease)

ఇందోళ జాతి నూత్నదండికలు (Bacteria) కాడలంగును,

అకులందును, కాయలందును జేరి వృద్ధిచేసి వానినిక్షీణింప జేయును.

తెగులు పట్టని చేలనుండి సంపాదించిన విత్తులను 20 పానుల కొక

యాన్స్ సెరిసాన్ (Ceresan) లేక అగ్రోసాన్ G. (Agrosan G) లో

బాగుగ కలిపి విత్తవలెను. విత్తులను తామ్రకర్పనితపు పొడినో

కలిపి యందలి తెగులు బీజములను నశింపుచేసి చల్లుటవలనను తెగులు

కాథను నివృత్తి చేసికొనవచ్చును.

3. వెర్రితల తెగులు (Sterosis):- ఇది ఘోక ఆకుశ్య విష జీవి (Virus) వలన గలుగుచున్నది. దీనికిల్లోపైన మొక్కల తలలందలి యాకులు మిగుల జిన్నవై, పాలిపోయి క్రిస్కిరిసి యుండును. పూవులు వికృతమై పండు రంగుతో గూడి అకులవంటి యంగములు గలిగి యుండును. ప్రారంభదశలోనే తెగులు తెగిలిన మొక్కలను పీకి నకింపు చేయుచో నిది యంతగా వ్యాపింపదు.

దూది ప్రతిగింజలు వగైరాల యుపయోగములు

దూది మొక్క ముఖ్యోపయోగము పక్షిపరిశ్రమ యందేయని వేరుగ చెలపనవసరములేదు. అనాగరక దశలో మానరక్షణకు జంతు చర్మములు, చెట్లపట్టమెదలగునవి యుపయోగింప బడుచుండెను. క్రమముగ పట్టునుండి దీయబడు నారనుండియు ఉన్ని నుండియు ఒక విధమగు గుడ్డలు తయారుచేసి కొనుచు యారంభమయ్యెను. ఇండియాలో ప్రస్తుత మొక్కనుండి దారిమును తీసి గుడ్డలను తయారుచేసి యుపయోగించుట ఇతర ప్రాంతములందు కంటె చిగుల ప్రాసన కాలమున ప్రారంభమయ్యెను

ఈ దేశమునందును, వెరుకగ నీపనులను జేసికొన నేర్చిన యితర దేశములందును గూడ ప్రస్తుతముండి గింజలను వేరుపరచుట మొదలు నూలు తీసి గుడ్డలను నేయుట వరకు గూడ 18 వ శతాబ్దపు కడపటిభాగమువరకు చేతిపనిముట్లపైననే జరుగుచుండెను. 1785 సం॥ మొదలుకొని పాశ్చాత్యదేశములందు ఆవిరి యంత్రములచే నడుపబడు వివిధములగు పనిముట్లు కనిపెట్టబడి క్రమముగ నభివృద్ధి గావింపబడెను.

† సుమారు లెండువేల సంవత్సరముల క్రిందటి నుండియు నీ దేశమునుండి ప్రాచ్య పశ్చిమ దేశములకు నూలుబట్ట లెగుమతి చేయబడుచుండెను.

ఇప్పుడు ప్రపంచమున నుత్పత్తియగు వస్తువులు చాలవగ కట్టి శక్తియంత్ర పరిశ్రమ మూలమున నే దయారగుచున్నవి.

ఇంగ్లండులో 18 వ శతాబ్దంతమున నూలుగిల్లలను నెల కొల్ప నారంభించినను 19 వ శతాబ్దప్రారంభమున కూడ యిండియా నుండి యాదేశమునకు నూలువస్తువు లెగుమతియగుచు నే యుండెను.* కాని క్రమముగ నీ మాత్రపు బట్టలైనను యెగుమతి కాకుండు పరిస్థితులు కల్పింపబడెను. ఇంగ్లండునందును వస్తుపరిశ్రమ కుపయోగింపబడు యంత్రము లభివృద్ధి గావించబడి మరింత పాకగ బట్టలను తయారు చేయుగలిగిరి. క్రమముగ నాచాకబట్ట లీశపు బీచ్ప్రజలకు హెచ్చుగా నందుబాటులోనికి చేబడుటచే వాని దిగుమతి క్రమముగ పెరిగి దేశీయ పరిశ్రమ మరింత క్షీణించిపోయెను. ఇందువలన చాలమంది ప్రజలకు నిర్వాహపాత్రవేర్పడెను. ముడి ప్రక్రియే యాదేశమునకును యంత్ర పరిశ్రమ ప్రబలిన కొన్ని యితర దేశములకును యెగుమతి కానొడగెను.

ఇట్లుకొంత కాలముగడచి, యీ దేశపునూలు పరిశ్రమయు నేత పరిశ్రమయు చాలవరకు తగ్గిపోయిన వెనుక, అంగ్ల వ్యాపారస్థులు, ఇండియానుండి ముడిప్రక్రియ దిగుమతిచేసికొని దానినుండి తయారు చేసిన బట్టలను మరిల నిచటి కెగుమతిచేయుటకు బదులు, ఈ దేశముననే విల్లలను నెలకొల్పి, యిందలి ప్రజల కవత్రమగు బట్టల నిచటనే యుత్పత్తి చేయుట హెచ్చులాభకరముగ నుండునని కనిపెట్టి యిట్లుచేయ మొదలిడిరి. 1853 వ సంవత్సరమున బొంబాయిలో మొదటి విల్ల స్థాపింప బడెను. క్రమముగ నీదేశపు ధనిక వర్గముకూడ నిట్టివిల్లలను స్థాపింప నొడగిరి. వాని

* 1815 వ సం॥న నాదేశమున దేశమునుండి 18 లక్షల పానుల విలువగల వస్తువు లెగుమతి యయ్యెను.

సంఖ్య, పరిమలములందలి మిల్లలసంఖ్య యిప్పుడు 70కి మించెను†. ఇండియా యంతటను యిప్పుడు 400 లకు పైగానుండును. వీనిమూలమున చేనేత పరిశ్రమ మరింత తగ్గెను. కానియిప్పటికిని చేనేతబట్టలు మిల్లబట్టల కంటె హెచ్చుకాలము మున్నుటచే వానికింకను కొంతగిరాజీ గలదు. ఇంగువలన చాలమంది సారీలు వేరు వృత్తి లేక యీమిల్లులంగు తయారు చేసి విక్రయింపబడు మూలతో బట్టలను చేసి విక్రయించుకొని, ఇంగువలనిలాభముతో జీవనమును గడుపు కొనుచున్నారు.

వ్యవసాయమునకు తరువాత వస్త్ర పరిశ్రమయే చాలమందికి ప్రధానముగు లేక యదనపు జీవకోపాధియగుటచే, నితీవల గాంధీ మహాత్ముడు పూర్వకాలమునంగువలెనే ప్రత్తినుండి గింజలను దీయుట మొదలు బట్టల నేతవరకు గూడ గృహపరిశ్రమల మూలముననే జరుగుచుండునట్లేర్పాటు గావించుట, యీ దేశపు ప్రజల యార్థికస్థితి కనుకూలమని నిర్ధాంతముచేసి, ప్రచారము గావింప దొడగెను. రాజకీయముగ గూడ నీయుద్యమమునకు చాల స్రామఖ్యత గలిగెను. అంగువలన ప్రజలలో కొంత నూతకోత్సాహము గలిగి, వడుకునూలు పరిశ్రమయు, ఆ నూలుతో చేనేత పరిశ్రమయు గొంతవరకు పునరుద్ధారణమయ్యెను. ఈ ఖాదీ లేక ఖద్దరు పరిశ్రమాభివృద్ధికొరకుగాను మహాత్ముని యాజ్ఞానుసార మొక యభిలభారత చర కాసంఘమును, దేశమందన్ని

† ఇట్టిమిల్లులు బొంబాయి రాష్ట్రమునందలి అహమ్మదాబాదు ప్రాంతములందు మరి 80 వకుగలవు. మొత్తముమీద వీ బొంబాయి రాష్ట్రమునందంతటను కేరి సుమారు 220 మిల్లులు నెలకొల్ప బడెను. బొంబాయిరాష్ట్రము తరువాత మిల్లులు హెచ్చుగ గలరాష్ట్రము చెన్నపురి. చెన్నరాష్ట్రమున నిపుడు 41 మిల్లుగలవు. ఇందు 8744 మగ్గములును, 10 లక్షలకు పైబడిన కడుగును పనిచేయుచున్నవి.

ప్రాంతములందు దాని శాఖలును*, ఉపశాఖలును అనేకము నెలకొల్పబడెను. ఈ యదృశమునందభిమానముగల కొందరు వ్యాపారస్తులును, దీనిని ప్రోత్సహించును వచ్చిరి. ఒకటివల కొన్ని రాష్ట్రప్రభుత్వములును దీనికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహ మొసగుచున్నారు.

గాంధీమహాత్ముని ప్రోత్సాహమువలన నిట్లు కొంత యభివృద్ధి గాంచిన యీ 'ఖాదీ' వస్త్రపరిశ్రమయందు జగుగు ఆధునకులను గురించి యీ క్రింద సంగ్రహముగ చెలుపబడును.

1. ప్రత్తియండి గింజలను, దూదిని వేరుపరచుట:—

ఇది ప్రత్తిరాటము అనబడు చిన్నపనిముట్టుతో జేయబడును. ముందు నలకలు వస్త్రాలు లేకుండ నేరి, యెండబెట్టిన గింజలతోనుండు ప్రత్తిని దగ్గరక నమగ్నబడి తిరుగు నట్లేర్పాటుచేయబడిన రెండు కర్రతోలలమధ్య కరపించి త్రిప్పుటచే వాని సంగనుండి దూదియేచలు మాత్రము లాగుకొనబడి ప్రత్తిగింజలు విడిపోవును. ఇవి యొక వైపునకును దూది రెండవ వైపునకును పడిపోవును.

2. దూదిని శుభ్రపరచి యేకి యేకులుగ చుట్టుట:—

ఈపని సామాన్యముగ వైయండి శ్రేణి వడీయకు కొక కమాను లేక విల్లు అను పనిముట్టుతో జేయబడుచుండును. ముందుగ దూదినెండ బెట్టి దిస్తా అను పనిముట్టుతో మీటబడుచుండు నారికి దూదియించుక తగులునట్లు చేయబడుటచే నందలియేచలు విడిపోయి అంతటను సమముగ గలియును. ఇట్లేకుటలో దూదియం జేసేని నలకలు విగిలియుండుచో

* 1948—49వ సం॥న ఆంధ్రశాఖద్వారా 2,07,866 చ.గ.ల నూలు తయారయ్యెను. దీనివిలువ రు 3,73,253 అండెను. ఇదికాక ప్రభుత్వ ఖాదీ కేంద్రములో 62,803 గజములత్వన్న మయ్యెను. ఇండియా మొత్తముమీద నీ పరిశ్రమములమున 40 లక్షలమందికి పనిగలుగుచున్న దని లెక్క చేయబడెను.

17 వ పటము

న వియు గగుల

చి న్నయే చలు ను

తొంగి పోవును.

అట్లేకి న* దూని

కొంచెము కొంచె

ముక బలచెక్కినై

పంచి ముకి బొన్న

పుల్ల లేక గంటము

వంటియిరుప గూచ

చూలమున సుమారు

(1) అంగుళముల

సాడవుగ నుండు

యేకులుగ మట్టగురు.

దూయేకి మట్టకు

దూది యేకుట

లను చుట్టుట

సామాన్యముగ దూడగల వాండ్రనబడు ప్రశ్నకి కుటుంబముచే జేయబడుచుండును. కాని వీలుపయోగించునంతటి పెద్దవిల్లనకు బల చిన్నవిల్లు సుపయోగించి నూలును దీయువారెవరికి వారె దూనినేకుకొని యేకులు గొట్టుకొనుచో నవి నూలుదీయుట కెక్కువ యనుకూలముగ నుండును.

విశాఖ ప్రిణపు జిల్లాలోను, శ్రీకాకుళము జిల్లాలోను నున్ననూలు తీయువారు ప్రశ్నింపనంతయుండు దూది యేచలు నాగ్రతిగ 'చేడ' డా'హో' సువ్వ యందలి పాడవగు యేచలు నూత్రము దీసి సింజగా బెట్టి యేకులు గొట్టకుండగనే నూలును దీయుదురు.

* కంబోడియా, బోర్నోను మొదలగు అమెరికా దేశముల పొదుగు యేచల దూనినక్షేక నింపడకపోవుటచే నవి చేతనాలు పరిశ్రమ కుపయోగింపబడుటలేదు. ఇట్టిదూది యేకునపుడు వారికి మట్టుకొని పోవుచుండును.

3. నూలుతీయుట :—ఈపని చరఖా లేక రాటముతో పైని తెలుపబడినట్లు తయారు చేయుదు యేగుండుండి చేయబడుచుం
18 వ పటము

నూలు తీయుట

దును. ఇందలి చక్రమెంత పెద్దదై కగురెంత వడిగా గిరుగునో అంత త్వరితముగ నూలు పురియొక్కి పని చురుకుగ నగును. సన్ననూలు*

* బ్రిటిషు పరిపాలనకు ముందిండియాలో చాలసన్నిని నూలుతీయ బడుచుండెను. 350 వ నెంబరుకుమించిన సన్ననూలుతో నేయబడి, శవతా వస్త్రమున బకునంత నాజూకుగను, పొందర్కకముగ నుండెడు థాకా మజిలిను ప్రపంచమున కార్చర్యకరములుగనుండెడివి. కాని యిట్టి పరి శ్రమ మిల్లనూలుపోటీచే క్రమముగ తీరించుచుపోయెను. ఐననుయిప్పటికిని కొన్ని ప్రదేశములందు ముఖ్యముగ నాంధ్రప్రదేశమునందలి విశాఖపట్టణం, కృష్ణాకుళం జిల్లాలలో 100-150 నెం. గాలువరకు దీయుచున్నారు.

దీయుటకు రాటము పెద్దదిగ నుండవలెను. గాంధీమహాత్ముని ప్రోత్సాహముచే సామాన్యపు రాటమునందువలె నొకే చక్రముగాక, దానికిని కగురునకును మధ్య మరియొక చిన్న చక్రము నమర్చి పెద్ద చక్రము త్రిప్పునపుడీ చిన్న చక్రము తిరిగి, యది తిరుగుటవలన కదురు పెద్ద యొంటిచక్రపు రాట్నమునందు కంటెను మెచ్చు వడిగా జరుగు నట్లు చేయబడుచున్నది. ఈ యుపాయమువలన రాట్నపు పరిమాణమును చాల తగ్గించుకొనుచున్నది. తరుగు ప్యూటనము చేయుమండువాంతులు తమతో సులభముగ గొనిపోవుటకు పొగునట్లు రాట్నము నంతటిని నొక చిన్న పెట్టెయందే యిసుకబడు రాట్నములు గూడ తయారు చేయబడి విక్రయింపబడుచున్నవి. కాలితో ద్రోహుటకును, రెండుచేతులతో రెండుకదుర్లనిద చూపియుటకు పొగురాట్నములు కూడ నిర్మింప బడుచున్నవి.

4. గుడ్డనేత. — ఇంగుట పైని తెలుపబడినట్లు తీయ బడిన నూలును తడిపి పురి విడిపోకుండటకును కొంత జగి యెక్కుట కును గంజిలో తడిపి, యాచెట్టి పడుగును తయారు చేయుదురు. దీనిని మగమునకు దగిలించి యడ్డగ నేయుదురు.

ఇటీవల ప్రభుత్వ పాఠశాలక కాళివారి ప్రచార ప్రోత్సాహము వలన నింగండునందు రెండువందలయేండ్ల క్రిందట (1750 వ సం॥న) కనిపెట్టబడియు చేనేత కుపయోగము నందుండిన మగములు

* ఇంతకంటెను సుగుచ్చును చురుకుగను నూలుతీయబడుటకును, యానూలు తనంతటనది కండగా జుట్టుకొనుటకును పొగు శ్రేష్ఠముగు చేతి రాట్నముల నిర్మించుట కనేకయత్నములు జరిగెను. ఇంకను జరుగుచున్నవి. కాని సామాన్యపు రాట్నమువలె నందరికును నందు బాటలో నుండు నిట్టి రాట్న మెవ్వరును కనిపెట్టజాలక పోయిరి.

* ఇంగ్లండునుండి మిల్లనూలు దిగుమతి యారంభమైనప్పటి నుండియు చేనూలు తీత తగ్గి యీ దేశమున పనిచేయుచున్న చేనేత మగములలో చాల భాగము మిల్లనూలుతోనే బట్టలు నేయబడుచుండుటచే, చాలమంది సాలీలకు చేతినూలు బట్టలననేయు సామగ్ధ్యత లేక పోవుచున్నది.

(Fly shuttle looms) ఈవే మునకూడ గాలవలకు వాడుకలోనికి వచ్చెను. వీనిమూలమున వనకేశపు మగ్గముతోవలె పడగు బయట పరచి గుండగ నేయనక్కరలేకుండ దానిని బయట తయారుచేసికొని యొక లావుపాటికోల (Roller) కు బొట్టి మగ్గమునకు దగిల్చి యొక వైపునుండి నేయును నేనిన గుడ్డను వెనుక మరయొక కోలకు చుట్టు కొనుచు మరికొంతపడుగును లాగకొని నేయ వీలగును. మరియునిగు నూలుగండెయ్యండు నాడి (Shuttle) ని యటునుండి యటును, అటు నుండి యిటును చేతితో విచి నవసరములేకుండ మొక గ్రాటిని లాగు తుచే నది యిటునటు నడుచుచుండును. ఒక మీటను కాళ్లతో ద్రోర్చుటచే నొకసారి సగము దారములునా, మరియొక సారి తక్కినవియు పైకిపోయి నాడి (Shuttle) నడచుటకు పురిగిలగుచుండును. ఒట్టిమగ్గముపై నీడనే పనిచేసికొనవచ్చును. పనియు కొంత చురుకుగ నగును†.

పడగును సుభయుగ నేయుటకు సాధనముకూడ కనిపెట్ట బడెను దీనిని కొందరు నేతపనివాండ్రిక సంఘముగ నేర్పడి ఉమ్మడిగ గొని యుక్తయోగించుచో నీపడుగుచేత పనికూడ చురుకుగ నై మొత్తముమీద నేతపనివాండ్రికు నాయ్చుకూలి కిట్టుబాటుగును.

పైని తెలుపబడినట్లు ప్రస్థిరాటముపై గింజును పట్టి చూచిని తీసికొని దానినేకి యేకులుచేసికొని నూలుతీసి సాలెవానిచే గుడ్డను నేయించుకొనుచో గజమెంతకు కిట్టుబాటుగునో ఈ క్రింద తెల్ప బడెను.

తొమ్మిదవేల (28 హను) ప్రస్థిని పట్టి, గింజలుతీసి, దూది నేకి, ఏకులుచేసికొని సామాన్యపురాటము పై 20 నెంబరు నూలు

† గతసంగ్రహప్రాంతంభము నాటికిన్నివిధముల చేతిమగ్గములును చేరి చెన్నరాష్ట్రమున 3 లక్షలుండెను. అందు సుమారు సగము తెలుగు జిల్లాలోనున్నవే. ఇవి హచ్చుగిల జిల్లా గంటూరు (26000) విశాఖపట్టణం (16000) పశ్చిమగోదావరి, బళ్లారి (ఒక్కొక్కదానిలో 13000) కర్నూలు (12000) కడప, ఆనంతపురం ఒక్కొక్కదానిలో (11000) నెల్లూరు (10000) తక్కినచోట్ల పదివేలకు తక్కువ. మొత్తము 1,40,000.

గంటకు 300 గజములు చొప్పున తీయగలుగుచో నన్నిపనులకును శేరి 51 తోటలు పట్టును. ఇంగు నూలువడుకుటకు ప్రత్యేకముగ 42 దినములు. 2 వీసెల నూలు దిగుబడియగును. గత సంగ్రామమునకు బూర్వము ప్రతి ఖరీదు మణుగునకు రు 1-8-0 లుండినపు డీనూలు ఖరీదు రు 8-8-0 ఉండెను. 28 పా. ప్రతి ఖరీదు రు 1-8-0 లు పోగా రు 7-0-0 లు మిగులెను. దినమునకు (8 గంటల పనికి) కూలి రెండవార కించుక పేగానుండును. అభివృద్ధి చేయబడిన రాటము పైరా పనిముట్లతో ఆ తోటలలోనే ఏకులను దయారు చేసికొని గంటకు 420 గజముల చొప్పున 30 దినములలోనే 2 వీసెలనూలు తీయగలుగుచో దినమునకు 3 అణాలు కిట్టింపగును. 20 వ నెంబరుగల రెండు వీసెల నూలును కొని 48 అం. వడల్పుగల గడ్డగా నేయించుచో 24 గజముల గుడ్డ తయారగును. గజమునకు 4 అణాలు కూలియున్న కాలమున గజమునకు రు 0-9-9 లగును†.

20వ నెంబరు ఖద్దరుగుడ్డ పైధరకు విక్రయింపబడుచుండిన కాలమందు అదే నెంబరు మిల్లుగుడ్డ గజమునకు 5-6 అణాలకే విక్రయింపబడుచుండెను. అయినను తీరిక కాలము నందు స్వోపయోగమునకు నూలును తీసికొని గుడ్డలను నేయించుకొనుచో ప్రతి ఖరీదును, నేరకూలియు శేరి గజము 1 1/2 అణాల చొప్పుననే కిట్టును. తీరిక కాలమును వృథా చేయుటకు బగులు దానినిట్లు వినియోగించుకొనవలెననే గాంధీ మహాత్ముని యాదేశము.

† 1948-49 వ సం॥ ఆంధ్రరాష్ట్ర చరఖాసంఘము వారు దూది రేటు పాను 1 1/2 అణాలు చొ॥ లెక్కెట్టగా (ప్రతిధర మణుగునకు సుమారు రు 4-11-0 లు అగును.) గుడ్డలను గజము 1 1/2 రు 1-14-0 ల ధర చొప్పున అమ్మగలిగిరి. ఏకులు తయారు చేయుటకు పాను 1 1/2 అణాల చొప్పునను, వడకుటకు దినమునకు 6 అణాల చొప్పునను, నేతకు గ 1 1/2 సుమారు 8 అణాల చొప్పునను నీయబడినను.

అధునిక వస్త్ర పరిశ్రమయందు ప్రత్తి నుండి గింజలను వేరు పరచుట మొదలు నేతవేసిన గుడ్డలను మడత పట్టి బేర్లు కట్టుటవరకు శక్తియంత్రముల మూలముననే జరుపబడుచున్నవి. ఈ దేశమున నూలు మిల్లులును, బట్టలమిల్లులును నిర్మింపబడక భార్యమే ప్రత్తిసాగు విస్తారముగ గల ప్రాంతములందు గింజలను పట్టితీయు ప్రత్తిరాటపు శక్తియంత్రములు * (Power gins) నెల కొల్పబడి యట్లుతీయబడిన దూది యింగ్లండు వస్త్రాదేశముల కనుమతి చేయబడుచుండెను. ఎరుమతికి పిలుగానుండునట్లు చూచినదిమి బేర్లుగ గట్టు యంత్రములుగ కూడ నంతకు ముందే ప్రవేశపెట్టబడి చేతి ప్రత్తి రాటములపై దీయబడిన దూదిని గూడ యిట్లు బేర్లుగ గట్టుట కుపయోగింపబడు చుండెను.

నూలు మిల్లలందు ఆయాపనులకు నిర్మింపబడిన యంత్రముల మున దూదిబేర్లు కట్టు విడగొట్టు బడుటయు, యందలి దూది యడలు విప్పబడుటయు, వానియందలి నలకలు వస్త్రా విశ్రద్ధవ్యములు వాయు ప్రవాహముచే తొలగింపబడుటయు, అందలి యేనులు గువ్వ సాఫుచేయబడి నిరవచ్చేదమగు నేకులుగ దయారగుటయు యేకులనుండి ఒక్కొక్క మిల్లనందు తిరుగుచుండు వేలకొలది కదుర్లపై నూలుబచ్చి కండెలగ జాట్టుకొనుచుండుటయు కొంచె మిందుమిందు తమంతట తామే

* తొలత రంపపు ప్రత్తిరాటము (Saw gin) ఆనబడు నట్టి యంత్ర మొక యమెరికా దేశస్థునిచే 1792 వ సం॥ న కనిపెట్టబడెను. పిమ్మట నిడివి యేచలుగల ప్రత్తిని పట్టి గింజలను దీయుటకింత కంటే హెచ్చు అనుకూలముగ నుండు మరియొక చూడి (Mc. Carthy) ప్రత్తిరాటము మరియొక అమెరికాదేశస్థుని చేతనే కనిపెట్టబడెను. ఇప్పుడు మిల్లులందు శక్తియంత్రములచే నడుపబడుచున్న ప్రత్తిరాటము లన్నియు ఏరెంటి పరిజానుములే.



జరిగిపోవుచుండును. ఆయా యంత్రముల పనిని కనిపెట్టి వడపుచుండుట కవటచట వొక మనిషియు, తెగిపోయిన దారముల నతికించుటకు పెక్కు కగుళ్ళ కొకమనిషియు నున్న పని నదచిపోవును. ఈ నూలును పిడులుగా చుట్టి కట్టలుగను, శీట్లును శీయు యంత్రము లా పనులను శీయును.

బట్టలునేయు మిలులలోకూడ యిట్లే నూలునుండి పడుగు తయార చేయుటయు, నేతయు, తయారయిన గొడ్డలను మడతపెట్టి శీట్లుగ గట్టుటయు స్వల్పపాటుతో తమంతట నవి జరిగిపోవును.

కొన్ని మిలులలో కూలతీతయు, గుడ్డలనేతయు మాత్రముగాక నూలుకు ఒక తయారయిన గుడ్డలకు మెరుగు పెట్టుట (Mercerisation) మొదలగు ప్రత్యేకపు రాసాయనిక సంబంధములయిన పనులు కూడ నందులకు తగిన యంత్రములద్వారా జరుగుచుండును.

గత సంగ్రామమునకు బూర్వ మీదేశపు ప్రజలకేటేట వలయు గొడ్డ 625 కోట్ల గజములలో 400 కోట్ల గజము లీదేశపు మిలులలో దయారగుచుండెను. 150 కోట్ల గజములు చేతి మగ్గుములపై దయారగు చుండెను. 75 కోట్ల గజములు ఇంగ్లండునుండియు, జపాన్ నుండియు దిగుమతియగుచుండెను.

ఫైకులను శీయు తొలియంత్రము (Carding engine) ఇంగ్లండునందు 1762 వ సంవత్సరమున నెలకొల్పబడెను. 1770 వ సంవత్సరము నూలతీయు యంత్రము (Spinning Jenny) కనిపెట్టుచి శీటెంటు చేయబడెను. 1780 వ సం॥ న నీ రెండు యంత్రములు ఆవిరియంత్రములచే నడుపబడ నారంభమయ్యెను. పిమ్మట వీనియందు తగిన మార్పులుగావింపబడి చాలయభివృద్ధి జేయబడెను.

1) ఆవిరికత్తిచే నడుపుదు తొలినేత యంత్రము ఇంగ్లండునందు 1787 లో నెలకొల్పబడి, క్రమముగ నిట్టి యంత్రముల నిర్మాణమును చాల యభివృద్ధిగావింపబడెను.

ఇండియా ప్రజలకు వలయు గుడ్డయంతయు విలులలోనే దయారుచేయుచో నీ పరిశ్రమ, సుమారు 3 కే. లక్షల జనులకు మాత్రమే పని కల్పించుననియు, అంతయు గృహపరిశ్రమమూలముననే జరుప వలగుచో, నీ పరిశ్రమ 800 లక్షల జనులకు పనికల్పించుననియు అంచనా వేయబడెను. కావున వలసిన గుడ్డలో నెంత సామర్థ్యము గ్రామ పరిశ్రమ మూలమున నుత్పత్తి చేయగలిగిన, గ్రామముల యర్థికస్థితి కంత హెచ్చుగ దోడ్పడునని చెప్పవచ్చును.

దూక సంబంధించిన యితర పరిశ్రమలలో నీ క్రింది విమర్శనలు:—

(1) దారపు పరిశ్రమ:—బట్టలను గుట్టుట కుపయోగించు పన్నదారమును, పుస్తకబంధము (Book binding) న కుపయోగింప బడు ముడుగుదారము (Twine) తయారుచేయు పరిశ్రమ కొన్ని విల్లలందు ప్రత్యేకముగ నడుపబడుచున్నది.

(2) త్రాళ్లపరిశ్రమ:—హులలో నారత్రాళ్లకంటె బిరుసు తనము తక్కువగ నుండతగు పంకాత్రాళ్లు, చేరాత్రాళ్లు మొదలగు వానిని పేనుట మరియొక పరిశ్రమ. కుటీర పరిశ్రమగ్గ జరుగదగిన వానిలోనిది యొకటి.

(3) కుట్టుపరిశ్రమ:—కుట్టు యంత్రములలో గుడ్డలను, చొక్కాలు, లాగులు వగైరాలను గుట్టుట దాదాపు ప్రతిగ్రామమునందును నడచుచున్న మరియొక గృహపరిశ్రమ. కొన్ని కుటుంబములందలి స్త్రీ లిట్టి యంత్రము నొకదానినిగొని తమకు నేయు గుడ్డులను తామే తయారు చేసికొనుటగూడ కలదు.

(4) రంగుల పరిశ్రమ; అద్దకపు పరిశ్రమ:—హులనకు గాని, నేసిన గుడ్డకుగాని వివిధముగ రంగులను వేయుటయు, గుడ్డ కంతటికిని రంగువేయుటకు బదులు దానిపై రమ్యముగ చుక్కలు, పూవులు, వగైరా లేర్పడునట్లు రంగుల నద్దకయు గూడ నీ కళమున ప్రాచీనకాలమునుండియు జరుగుచుండిన కుటీరపరిశ్రమల. వీని మూల

మున చాలమంది కుపాధి గలుగుచుండెను. కాని గుటివల నిలులందే యీ పనుల యంత్ర హేతుముననుక్రమరంగులతోను నడుపబడుచుండుటచే నీ పరిశ్రమయు తీవ్రదశకు వచ్చెను. సామాన్యపు రంగువేత చాల వలకు బట్టు నుతుకు చాచివాడచేతనే కేయబడుచుండును. కొన్ని చోట్ల నీపని - ముఖ్యముగ అద్దకపుపని - ప్రత్యేక రంగరుల చేతులలో నున్నది.

(5) జరిపరిశ్రమ:— మూసకు వెండి, బంగారు పూతపెట్టు యీ పరిశ్రమకూడ యీ దేశమున చి. కాలము నుండి మిగుల ప్రవృత్తితో నడుపబడుచుండెను. దీనికిని గుప్పడు విదేశయంత్రముల పోటీ కలిగెను. అయినను నిది కొన్ని చోట్ల నిగకను కొంతసానుభ్యతను వడిసియున్నది. తెలుగు జిల్లాలలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని నర్సాపురమునం దీ జరి చేయు కార్ఖానాలు కొన్ని వున్నవి.

(6) నవారు పరిశ్రమ:— ముగగు (10 వ సంబరసకు లోపు) మూలతో నవారునేత యువైన పరికరములతో సాధ్యమగు మరియొక కుటీర పరిశ్రమ. జంబుఖానాలనేత, పడక కుప్పి గడ్డ, నేత వగైరాలు గూడ యిట్టివే.

(7) అల్లికపనులు:— అల్లిక నూదులతో మేజాబల్లలపై గుడ్డలు, తెగుడ్డలు, బనియనులు, నేజోళ్లు, డబ్బుల సంచలు మొదలగు వానిని దగూరు చేయుట మరియొక ముఖ్యమైన కుటీర పరిశ్రమ. కొందరు సహకరించి గ్రామమంత్రముగ దీనిని నడపుటకు తగిన యువైన యంత్రములు కూడ కనిపెట్టిరి. చెన్నరావుగారు నీటి అల్లిక పనుల కార్ఖానాలు 381 వున్నవి. ఇట్టి యంత్రములతో దోమతెరలను గూడ దగూరుచేయవచ్చును. పేనబడిన ముదుగుదాగముతోను నన్నని త్రాళ్లతోను డబ్బులసంచలు, చేపలవలలు, వలచొక్కాలు (చెరుకు తోటలందు, అనాసతోటలందు బనిచేయువారికి) వగైరాలు కూడ తమరు చేయబడుచుండును.

(8) గుడ్డస చులు, డేరాగుడ్డలు వగైరా పరిశ్రమలు:— చిక్కగ నేయబడిన ముసుగు గుడ్డతో పిండివంటి మృదువైన ద్రవ్యముల

పట్టుబడికిని, రవాణాకును నుపయోగించు సంచులు తయారుచేయుట మరియు పరిశ్రమ. డేరాగుడ్డలను తెగచాపగుడ్డలను దయారుచేయుటయు నిట్టివే.

(9) పరుపులు, దిండ్లు, బొంతలు, సోఫామెత్తలు వగైరా పరిశ్రమ:—దేశవ్యాప్తమున కుటీరపరిశ్రమలలో నిర్మియొకటి. సామాన్యముగ నిది దూడకులవాండ్రచే చేయబడుచుండును. కట్టుపని వారును, కుర్చీలు, సోఫాలు మొదలగు వానిని జేయువారును గూడ యీ పనులను జేయుటకలరు.

(10) కాగితపు పరిశ్రమ:—చింకిగుడ్డ ప్రేలికలనుండి కాగితములను దయారుచేయు స్పృహపరిశ్రమ చాల కాలమునుండి యీదేశమునను, ఇతరదేశములందునుగూడ జరుగుచుండెను. నలుబడేండ్ల క్రిందటి వరకు కొండపల్లి కాగితము అనబడు దళమైన కాగితము లొండ్రదేశమున వాడబడుచుండెను. పిమ్మట విదేశములనుండి మేలైన విలుకాగితము లను, ఈదేశపు విలుకాగితములు వచ్చుటచే నీ పరిశ్రమ యంతరించెను. కాని యిటీవల కాంధిమహాత్ముని ప్రోత్సాహము వలన స్పృహ పరిశ్రమ మరల కొంతవరకు దలయెత్తినది.

పై పరిశ్రమలకు గాక కురుచయేచదూదిని పెటార్డులైకు అనరు (Lining) గాను, కొన్నిచోట తారుకోడు వేయుటలోను గూడ నుపయోగింపబడుచున్నది. దూగి నుండి నత్రికామ, గంధకీ కాషాయలతో సంస్కారమువలన నేర్చుకు నైట్రోసెల్యూలోస్ (Nitro cellulose) అనుద్రవ్యము సెల్యూలాయిడ్ (Celluloid) పరిశ్రమయందును, ఒక విధమున ప్రేలిడు ద్రవ్యమును (Gun - cotton) తయారు చేయుటలోను గూడ నుపయోగింపబడుచుండును.

ప్రత్తినింజలు పసుపులమేత కుపయోగించును. అమెరికాలో వీని నుండి చమురు విరివిగ దీయబడి యనేక విధములుగ నుపయోగింపబడుచున్నది. చమురు తీయగా మిగులు పిణ్యాకము పసుపులకు దాణాగాను, యెరువుగాను నుపయోగించును. ఈ విషయములను గురించి చమురు దినుసులకు సంబంధించిన సంపుటమున విపులముగ చెలుపబడెను.

ప్రతి సాగుగల ప్రదేశములందు దీనికంప వంటనరుకుగ నుపయోగింపబడుచుండును. కంది కంపకంటె యీ కంప నిలచి మండును. హెచ్చువేడిమి నిచ్చును. కమలేమును వంటనరుకు విషయముగ స్వయం సమృద్ధముగ జేయుటకు దోడ్పడు సస్యములలో నిదియు, అమదపు పంటయు, కందిచేలను ప్రధానములని చెప్పవచ్చును.

ప్రతి మొక్కల కాండముల పైపట్టనుండి నారను తీయవచ్చును. కాని నారతగినంత పొడవుగ నుండక పోవుటచే జనుము, గోగునారల వలె సంచులనేతకు బనికీరాక పోవుటయేగాక దానిని దీయుటయు సులభముగాదు. వినను దీనిని యంత్రసహాయమున దీసి కాగితముల పరిశ్రమకును, కృతకపు పట్టు పరిశ్రమకును నుపయోగింప వీలగునని కనిపెట్టబడెను.

ప్రతిపంట, వ్యాపారము

ప్రపంచమందు ప్రతి సాగుచేయబడు ముఖ్యదేశములును, అందీ సాగుగల విస్తీర్ణములును ఇదివరలో చెబుపబడెను. ఆయా ముఖ్యదేశములందుత్పత్తియగు దూది పరిమితులు తెలుపబడినవి.

దూది పరిమితి - 400 పౌనుల బేళ్ళుగా 1938 సం॥లో*

అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములు	14,930,000
ఇండియా	5,737,000
ఈజిప్టు	3,065,000
బ్రజిల్	2,231,000
ఆర్జంటీనా	391,000
ఇంగ్లీషు ఈస్టియన్ సుడాన్	314,000
అస్ట్రేలియా	16,000
తక్కినదేశములు	2,000
	<u>25,056,000</u>

* 1950-51 లో ప్రపంచపు మొత్తపు దూది ఉత్పత్తి సుమారు 27,500,000 బేళ్ళు ఉండెనని యంచనా చేయబడెను.

ఇండియాలో నాయా రాష్ట్రములందలి యుత్పత్తి
యీ క్రింద తెలుపబడెను.

రాష్ట్రము	1940—41 సం.	1945—46 సం.
పంజాబు (తూర్పు)	283,000	148,000
,, (పశ్చిమ)	932,000	805,000
బొంబాయి	781,000	180,000
మధ్యరాష్ట్రములు, బీరారు	901,000	535,000
హైదరాబాద్	547,000	261,000
చెన్నపురి	530,000	361,000
సింధు	499,000	382,000
బొంబాయి సంస్థానములు	805,000	159,000
గ్వాలియర్	109,000	64,000
తూర్పుపంజాబు సంస్థానములు	198,000	73,000
పశ్చిమపంజాబు సంస్థానములు	252,000	194,000
బహోడా	175,000	90,000
సమీప రాష్ట్రములు	146,000	53,000
రాజపుత్ర సంస్థానములు	104,000	61,000
మధ్యిండియా సంస్థానములు	231,000	85,000
ఇతరప్రదేశములు (ఇండియాలోనివి)	59,000	44,000
,, (పాకిస్తాన్లోనివి)	284,000	219,000
మొత్తము ఇండియా		
పాకిస్తాన్లుచేరి	4,364,000	3,530,000
ఇండియాలో ప్రత్యేకముగ	4,118,000	1,930,000*

* 1950—51 లో ఇండియాలోని మాది యుత్పత్తి 2,600,000 చేరుండెనని లెక్కవేయబడెను.

విస్తీర్ణమున సంయుక్త పంజాబు (తూర్పు, పశ్చిమభాగములుచేరి) నాల్గవదైనను, ఉత్పత్తియందీ రాష్ట్రము యగ్రస్థానమును వహించుచుండెను. విస్తీర్ణమున చెన్నరాష్ట్రము పంజాబునకు దాదాపు సమానమైనను ఉత్పత్తి పంజాబు నందలి యుత్పత్తిలో సగమునకు తక్కువగనే యుండెను. ఒక యొకరమున నగు ఉత్పత్తినిబట్టి మామచో సంయుక్త యిండియాలోని తెల సంయుక్త పంజాబు సంస్థానములు అగ్రస్థానమును, సంయుక్త పంజాబు రెండవస్థానమును, సింధుదేశము మూడవస్థానమును అక్రమించుకొనుచుండెను.

చెన్నరాష్ట్రపు దూది ఉత్పత్తి యిటీవల సాగు విస్తీర్ణముతోపాటు మరింత తగ్గిపోయెను. సగటు ఉత్పత్తి 446,200 బేళ్లుండ 1947-48 వ సంవత్సరమున నిది 266,093 బేళ్లుమాత్రమే యుండెను. కాని యీ తగ్గుదల దక్షిణజిల్లాలలోకంటె తెలుగు జిల్లాలలో తక్కువ. తెలుగు జిల్లాల సగటుఉత్పత్తి 98,300 బేళ్లుండ 1947-48 సం॥న 81,487 బేళ్ళదూది యుత్పత్తియయ్యెను. జిల్లావారి వివరములీక్రింద తెలుపబడెను.

జిల్లా	సగటు ఉత్పత్తిబేళ్లు	1947-48 లో ఉత్పత్తిబేళ్లు
బళ్లారి	46,700	52,465
కర్నూలు	17,400	8,417
అనంతపురం	11,500	8,606
గుంటూరు	9,010	6,171
కడప	6,010	2,624
నెల్లూరు	4,880	4,863
విశాఖపట్టణం	1,010	649
తూర్పుగోదావరి	990	822
కృష్ణా	640	74

జిల్లా	సగటు ఉత్పత్తిచేర్పు	1947-48 లో ఉత్పత్తి చేర్పు
పశ్చిమగోదావరి	70	30
చిత్తూరు	90	6
	98,300	84,437

వ్యాపార తరగతులవారీ యుత్పత్తియీక్రింది విధమున
నుండెను.

	సగటుచేర్పు	1947-48 లో చేర్పు
పడమటి ప్రాంతపు ప్రత్తి (Westerns)	67,730	65,760
ఉత్తరప్రాంతపు ప్రత్తి, ఎర్రప్రత్తిచేరి (White and red Northerns)	15,830	6,352
కాకినాడ ప్రత్తి (వరంగల్ ప్రత్తిచేరి) (Cocanadas & Warangals)	15,970	11,394
చిన్న ప్రత్తి	630	884
	100,160	83,890

గత సంగ్రామమునకు బూర్జుమిండియా మొత్తముపై సుత్పన్నముగు
చుండిన దూదిలో సుమారు 350,000 చేర్పు ఈ దేశమునంత వినియోగ
పడుచుండెను. ఇందు ఖద్దరు పరిశ్రమయందును, పరుపులు దిండు వస్త్రాల
కును సుపయోగింప బడుచుండినది సుమారు 450,000 చేర్పుండునని
యంచనా వేయబడెను. తక్కినది విల్లనూలు, బట్టల పరిశ్రమలందుప
యోగింపబడెను. వెనుకటి సంవత్సరపు పంటలోను, నిల్వసరితులోను
నిటే దేశమున సుపయోగపడు దూదికాక మిగిలినది విదేశముల కగుమతి
చేయబడుచుండెను.

చెన్నరాష్ట్రమునకు 1947-48 వ సంవత్సరమున విదేశములనుండి,
(చాలవరకు ఈజిప్టునుండి) 10,116 టన్నుల దూది దిగుమతియయ్యెను.

ఎగుమతి లేదు. ఇదికాక 1,669,058 గజముల గుడ్డయు, 1,148,430 పౌనుల నూలు లేక దారమును కూడ (చాలవరకు బ్రిటనునుండి) దిగుమతియయ్యెను. ఈ దిగుమతుల మింజూచులె 41,086,685 గజముల గుడ్డ రితర దేశముల కగుమతియయ్యెను. నూలుకూడ స్వల్పముగ (17,980 పౌనులు) సెగుమతియయ్యెను.

ఈ రాష్ట్రముందలి 41 నూలు నేతమిలులలో చాలవరకు కోయం బగ్గారు ప్రాంతములందేయున్నవి. కొన్ని చెన్నపురి యందును, మధుర ప్రాంతములందును గలవు. తెలుగు జిల్లాలలో నివి మిగుల స్వల్పముగను, వున్నవైనను మిగుల జిన్నవిగను నున్నవి. కావున నీ జిల్లాలలో నుత్పన్నమగు దూది చాలవర కితరచోట్లకు బంపబడి బట్టలును, చేనేత మగ్గములకు వలయు నూలును దిగుమతి చేసికొనబడుచున్నవి.


2. దూదినొసగు నితర జాతులు

(౧) తెల్లబూరుగ (The silk cotton tree or the white cotton tree - *Eriodendron pentandrum* (హిం-కపోక్, సఫేద్ సీమక్, క-బరిబూరుగ, సం-శ్వేతకాల్మరీ):— ఇదివరలో నీ చెట్టు ప్రత్తి కుటుంబములోనిదిగ నెంచబడుచుండెను. ఇటీవలన నిది బూరుగ కుటుంబముని వ్యవహరింపబడు ప్రత్యేక కుటుంబమున జేర్చబడెను. దీనికాదిమ స్థానము పశ్చిమ యిండియాదీవులు. ఈదేశ పరిస్థితుల కలవాటుపడి కొన్నిచోట్ల వన్యముగ బెరుగుచున్నవి. కొందరి చెట్లను తొల కట్టవలలో నాటి పెంచుటయు గలదు. ఈ చెట్టుకాయలంగు (ఎండిన వెనుక) గింజల నావరించి పట్టువలె మృగువుగను, నున్నగను నుండు యేచలుగల దూదియుండును.

బూరుగ లావగు ప్రకాండముగలిగి యెత్తుగ నెగుగు పెద్దచెట్టు. ప్రకాండముపై కాళి లొక్కొక చోట కొన్ని గుమిగూడి ప్రక్కలకు భూమికి సమానాంతరముగ బెరుగుటచే చెట్టందముగ నుండును. ఈచెట్టు

సామాన్య జాతులకంటే చురుకుగ నెరుగును. ప్రకాండమున లేతగనన్న పుడు ముండ్లుండును. ఆకులు 3-4 అం. పొడవున నుండు, 5-8 ఉపదళ

19 వ పటము



తెల్లబూరుగ యాకు

ములు గలిగి హస్తాకారమున నమరియుండు నిశ్రమ పత్రములు. తొడిమ మిగుల కురుచ. పూవులు ఆకు పంగలలో గుత్తులుగ బయలు చేరును. ఒక్కొక్కప్పుడు కణుపునందు ఆకుకంటే పూవులే ముంగు పుట్టును. ప్రత్తి పూవులవలెనే తెల్లగాని యిందుక పసిమి వర్ణముతోగాని విడిచినపుడు $1\frac{1}{2}$ -2 అంగుళముల వెడల్పుగ నుండును. పువ్వుకోశము 5 దంతములు గలిగి

గంట యాకృతి నుండును. ఆకర్షక పత్రము లైనువిడిగానుండును. కింజల్కము లమరియుండు గొట్టము కురుచగ నుండి పైని 5 శాఖలుగ జీలియుండును. ఇందొక్కొక్క దానియందు 2-3 సలక్షణముగు పుప్పొడి లిక్తులుండును. అండాశయము 5 కోశములు గలిగియుండును. ఒక్కొక్క దానిలో పెక్కు బీజాండములుండును. కీలము 5 తమ్మెలు గల యగ్రము గలిగియుండును. కాయవిదాళన ఫలము. 5 అరలు గలిగి వర్తులముగ కోలలేరి 4-5 అం. పొడవుండును. గింజలనేకము. గుండ్రజేరి నల్ల

20 వ పటము ప్రత్తిగింజ లంతేసి యుండును. పైన నునుపు.



తెల్లబూరుగ కాయల

గుత్తి $\frac{1}{5}$

బూరుగ చెట్టు పదును నిలచు బలమైన నేల లందు చురుకుగను పెద్దవిగను పెరుగును. వండలి నేలలు ప్రకృష్టము. చెట్టును కట్టవలలోను, కాలువ గట్టు మొదలైన చోట్లను పరులగు బెంచడలచుచో విత్తులను మొదట వైడిప్రత్తి గింజువలెనే 10-12 అడుగుల దూరమున వేసి పెంచదగును

3-4 సంవత్సరములలోనే కాపుపట్టును. కొంతవరకెదిగి నేలకు గ్రుచ్చ వపుడు ఒక చెట్టువిడచి యొక చెట్టును దీసివేయవలెను. ఉంచిన వింకను పెద్దవైన వెనుక, నంగుమరల సగము చెట్టును దీసివేయవలెను. బాగుగ నెదగు నప్పటికి యిలియుండు వానిలో మరిల సగము చెట్టును దీసివేయదగును.

కాయలు వేసవిలో పగులను. అప్పుడే దూది యెగిరిపోకముంగు జానినిగోసి బాగుగ నెండబెట్టి దూదితీయవలెను. దూదినుండి గింజలు సులభముగనే విడిపోవును.

ఈ దూదితగినంత జిగిలేక ఏకుచో తెగిపోవును. కావున నూలు తీయుటకు బనికిరాదు. కాని పరుపులు, దిండ్లు, మెత్తలు వస్త్రాల కుపకరించుటచేతను, ప్రత్తివలె నిది యణగిన కొలదిని యడకట్టి గట్టిపడక పోవుటచేత దీనికి గిరాకీగలదు. ఇది సముద్రయానము చేయువారి కొనగ బడు ఈత పటకాల (Life belts) కు ప్రకృష్టముగ నెంచబడు చున్నది.

గింజలనుండి ఆహారయోగ్యమగు చమురును తీయుటయగులదు. ఇది నుబ్బును శేయుటకును నుపయోగించును. గింజలలో నీ చమురు నూటికి నుమారు 30 వంతులుండును. పిణ్యాకము పసువులకు దాణాగా నుపయోగించును.

(౨) ముండ్లబూరుగ లేక ఎర్రబూరుగ - The red silk cotton tree - *Bombax malbaricum* N. O. Bombaceae (హిం - సీమక్, ఆ - ఇలావు, మ - ముల్ఖిావు, క - కంపుబూరుగ, సం - శాల్మలి, పూరణి):- ఇది పైజాతికంటే పెద్దదిగ నెదుగు బూరుగ కుటుంబములోని మరియొకజాతి. దక్షిణ యిండియాలో ముఖ్యముగ పడమటి కనుమలపై చాలచోట్ల పెరుగుచున్నది.

అనుకూలపరిస్థితులలో నీ చెట్టు 130 అడుగుల యెత్తున పెరుగుట గలదు. ప్రకాండము కొంత యెత్తువరకు శాఖచేర్చడక నిలువు నెగు గును. నీచిపై కొణాకృతిగల గట్టిముండుండును. శాఖల పైజాతిలో వలెనే ప్రకాండము చుట్టును ఒక్కొక్కచోట కొన్ని గుమికూడి బయలుదేగును. ఆకులును చాలవరకు పైజాతి యాకులనే బోలి ఉపవర్ణములు గలిగియుండును. పూవులు కొమ్మల చివర గుమికూడి బయలుదేరును. పైజాతిలోకంటే పెద్దవి, ఎరుపు. పువ్వుకొక్కేగానీ ఎరుదూ దిగుడు తమ్మెముక లిగి గిన్నెగాకారమున నుండును. అక్కడ క్రమములు విడిచి పెద్దవి. నీచిమధ్య యెనుండి కింజల్కము ముగియుచును. ఇందరువది ఆకర్షక పత్రముల క్రిందికిని నెనుదు పన్నెండు పన్నెండు చొప్పున నెను కుమ్ములుగను, తక్కినవానిలో పది నన్నలి వీని వెనుకను, తక్కిన పదియు మీదగా నెగుజతలుగను నుండును. అండాశయము ఏ గదులు గలిగియుండును. కాయ విదారణ ఫలము. గింజలనేకము పైజాతిలోవలెనే యిందుక గౌరవప్రథముతోకూడిన నలుపురంగు గలిగియుండును. దూది కొంచెమించుమించు తెలుపు. తెల్ల బూరుగ దూదివలెనే దిండ్లు మెత్తలు వగైరాల కుపయోగించును.

ఎర్రబూరుగకర్ర గట్టితనములేక త్వరలో చెడిపోవును. కాని నీటిలో నిది యెక్కువ కాలమునున్నును. ఇందుచేతను సామాన్య జాతుల కంటే నీకర్ర లేలికగుటచేతను ఈ బలలు, కమ్మలు, ప్రాకులు సముద్రమునందు చేపలను పట్టువాండ్రచే నావలను చేసికొనుటకు హెచ్చుగ నుపయోగింపబడుచుండును. లావుపాటి ప్రాకులను దోచి అరుకులు లేని దోనలుగా జెక్కవీలగును. ఈ ప్రాని పట్టనుండి మొక్కొకప్పుడు స్రవించు జిగురు వైద్యమున నుపయోగింపబడుట కలగు. యెండు బూరుగ మొగ్గలు మరాటి మొగ్గలని విక్రయింపబడెట గలదు.

ఈ చెట్లనుగూడ తెల్లలూరుగ చెట్లవలెనే విత్తులను నాటి పెంచవచ్చును.

3. జల్లేడు - *Calotropis gigantea*-N. O. Asclepiadaceae (హిం-అకోరుయీ, అ-నిరుక్కమ్, సం-అర్కః) :— ఇది బంజరు నేలలందు తరుచుగా నగు గుల్మము. 5-8 అడుగుల వరకగును. అన్ని భాగములను పాలతోగూడి యుండును. ఆకులును కాండమును బూడిదబారి యుండును. ఆకులు లఘుపత్రములు. నిడివిచేత ప్రాకారముగలిగి ఒక్కొక్క కణుపున రెండేసి యొకదానికొకటి యెరుకుగ నుండును. పూవులు కొమ్మలచివర మధ్యారంభ మంజరులుగ బయలు చేరును. సామాన్యపు రకములో నిండుక యెరుపురంగు గలిగి యుండును. తెల్లని పూవులుగల రకముగూడ గలదు. పువ్వుకోశము 5 తమ్మెలు గలిగి యుండును. దళవలయమును 5 తమ్మెలు గలిగి పైని చాలభాగము చీలియుండును. కింజల్కము వైదును వికృతి నొంది ఏకమై పువ్వుగర్భము నావరించి పైని కిరీటము వంటి 5 పలకలుగల చిన్నదిమ్మ గలిగియుండును. పుష్పాడితిత్తులు దీనిపైననే యుండును. పువ్వుగర్భమున రెండు విడి కోశములుండును. కాని కీలక మొకటియే. ఒక్కొక్క పూవునుండి రెండేసి కాయలు పుట్టును. ఇవి విదారణఫలములు. గింజలనేకము. బల్లపరువుగను, తేలికగను నుండును. వీనికిచుట్టును తెల్లని రోమములుండును. వీని మూలమున వీగింజలు కాయపగిలినప్పుడు గాలికెగిరి విత్తనము చాలదూరము వ్యాపించును. ఇట్లేగిరి పోకమునుపే అనగా కాయలించుక పగులు చూపగనే కోసి యెగిరి పోకుండ గప్పి యెండించి దూదని తీయవచ్చును. ఈ దూదియు పట్టువలె మృదువుగ నుండును. కాని నూలుతీయుటకు బనికిరాదు.

పనికిమాలిన భూములందు జల్లేడు విత్తులను జల్లి మొక్కలు మొలిపించి తగినంత యెత్తుగ బెరుగునట్లు చేయుచో నీభూములనుండి కొంత రాబడి దీయవలగును.

మూడిన జీలేడుకాడల పట్టనుండి నారను దీయవచ్చును. ఈ కాడలను గోసిన వెనుక గొంచెమారనిచ్చి నీటిలో నానవేసి తగిన పదును కనిపెట్టి పట్టను దీసి నీటిలో నునిమినచో నారకాక తక్కిన భాగమంతయు పోవును. ఈ నార చాల మృదువుగ నుండును.

జీలేడు రొట్ట వరిచేలకు పచ్చి యెరువుగ నుపయోగించును. కాని యిది వేసినపుడు తక్కిన రొట్టలకంటె 2,3 రోజులదనముగ జీకనిచ్చి మారుగునీటిని దీసివేసి క్రొత్త నీటిని బెట్టి నాటదగును.

జీలేడుపాలు, అకులు వగైరాలు గ్రామీణవైద్యమున తరుమగ నుపయోగింపబడుచుండును. ఇందులకు తెల్లజీలేడు హెచ్చు ఉపయోగము. ఈ విషయమై సంబారములు, ఇతర యోషధులు అను సంపుటమున చెలుపబడెను.

3. జనుము

Sannhemp - Sunnhemp* - *Crotolaria juncia* - N. O. Leguminosae.

హిందీ - శనై; ఓ- సోయిన్; ఆ - సనప్ప, శానల్; క-సానబు; సం - శనిపుష్టి.

ఆంధ్రదేశమునందలి నారపంటలలో జనుమే ప్రధానమైనది. ఇది నారకొరకే గాక వశువుల మేతకును, పచ్చి యెరువునకును గూడ విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది.

2. చరిత్ర, వ్యాపకము:— జనపమొక్క కాదిమస్థానమిండియాలో యని యెంచబడుచున్నది. ఇండియా చిర కాలమునుండి సాగు చేయబడుచున్నది. ఊర్షియుల జంబెము లీనారతో జేయబడుట ఉత్తర హిందూస్థానపు పూర్వాచారము.

* అంగమున hemp అనుమాట యిప్పుడు నారయను సామాన్యమున నితర ప్రత్యేకలక్షణ సూచక పదములతో జేర్చి యుపయోగము

ఇప్పుడు జనుము హెచ్చుగ సాగుచేయబడు రాష్ట్రములలో సంయుక్తరాష్ట్రములు (ఉత్తరప్రదేశ్) ను, మధ్యరాష్ట్రములను (మధ్య ప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్) ను, ఇండియాలోని సాగుచేయబడుచుండిన మొత్తపు విస్తీర్ణము గతి సంగ్రామమునకు బూర్వము సుమారు 5 లక్షల యెకరములందునని యంచినా జేయబడెను. 1947-48 లో చెన్న రాష్ట్రమున వారొరకు పెంచబడిన జనుపసాగు విస్తీర్ణము 69,384 యెకరములుండెను. ఇంకా 63,308 యెకరములు తెలంగాణలోనివే. ఒకప్పుడీ విస్తీర్ణ మంతకు యాధుర్యముండెను, 1917-18 లో రాష్ట్రము మొత్తముమీద 224,100 యెకరములును తెలంగాణలో 217,735 యెకరములును నుండెను. జిల్లాలవారీ వివరము లీక్రింద తెలుపబడెను.

జిల్లా	1947—48	1917—18
	విస్తీర్ణము.	విస్తీర్ణము.
గుంటూరు	28,006	146,825
కృష్ణా	14,980	40,005
తూర్పు గోదావరి	10,454	15,970
పశ్చిమగోదావరి	1,592	
విశాఖపట్టణము	4,196	14,508
కర్నూలు	2,488	65
నెల్లూరు	1,592	792
బళ్లారి	—	506
అనంతపురం	—	25
చిత్తూరు	—	38
	63,308	217,735

చెన్న రాష్ట్రపు మొత్తము

69,384

224,100

గింపబడుచున్నది. కాని యిది మొదట గంజాయి మొక్కనుండి తీయబడు నారకే యుపయోగింపబడుచుండెను. Sann ప్లమును, శస్త్ర మొదలగు కఠిన వస్తువులను 'కాన్' యను సంస్కృత శబ్దభవములు. జనుమును Indian hemp అని వాడుటయు గలను.

21 వ పటము.

వారికొరకు పెంచబడిన జనపచేతు

3. జనపమొక్క లక్షణములు, రకభేదములు:—

జనపమొక్క సుమారు 4 అ. మొదలు 8 అ. వరకుదుగు నేకవార్షిక యొవధి. కాండము దోరియాలు గలిగి చాచుకలై యుండును. పైభాగమున సన్నని కొమ్మలనేకము బయలుకేరును. ఆకులు బల్లెపాకారమున 3-5 అం. పొడవును, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ అం. వెడల్పును గలిగి నిడివిగనుండును.

లేతకొమ్మలును అకులును వెనుకవైపున మృగువగు రోమములతోగూడినది

22 వ పటము



తగుతుగలిగి యుండును. భూవులు చిక్కుడు భూవుల యాకారమును నిర్మాణమును గలిగి రెమ్మల చివర నిడివియైన గెలుగు బయలు కేరును. లేతైన పసిమిరంగుతోనుండును. సామాన్యముగ పరసంపర్కము వలననే గర్భవతులగుచుండును. కాయ 1-1½ అం. పొడవు గల్గి రోమయుతముగ నుండును. గింజలు బల్ల బరువుగ నిగ నిగ లాడుచు కొంచెమించుమించు నల్లగ నుండును. రకమును బట్టి తులమునకు సుమారు 200-300 గింజలు సూగును. నేరుగింజలను 25-26 బ్రాస్సులు తూగును.

సస్యము కోతకు వచ్చుటకు పట్టు కాల పరిమితియంగును, మొక్క లేదగు యెత్తు

భూచిన జనప మొక్కతల ½ నంగును, కొమ్మల హ్యాప్టియంగును, గింజల పరిమాణము, రంగు వర్ణరాలంగును భేదములు గల పెక్కు జనుపరకము లాయాప్రాంతములందు సాగునందున్నవి.

కొమ్మనంతగా పెట్టని పెద్దగింజల రకములే సామాన్యముగ నార కొరకు బెంచబడుచుండును. వీనిని నారజనుప రకములని యెంచ వచ్చును. చిన్నగింజల రకములు చాలవరకు పశువుల మేతకొరకును, పచ్చి యెరువు నకును పెంచబడుచుండుటచే వీనిని మేతజనుపరకములని వ్యవహరింప వచ్చును.

ఇప్పుడు సాగునందున్న నారజనుప రకములకంటె శ్రేష్ఠమగు నారను హెచ్చుగనిచ్చు వంగడముల నెంచి తీయుటకు చేయబడిన యత్నము లగుతగా ఫలించలేదు; జనప భూవులు సామాన్యముగ ఫలసం

పారిశ్రామిక సస్యములు

గ్నము వలన గర్భవతులగుటచే నెంచిన వంగడములు వాని శ్రేష్ఠత నిరూపింపబడు లోపలనే అనగా కొద్ది సరివత్సరములలోనే వాని స్వచ్ఛతను గోల్పోవును. వివను సంయుక్త రాష్ట్రములందు వడలు తెగులన

23 వ పటము కంతగా కొంగిని కాన్పురు నెం 12 రు అను వంగడ మొకటి యెంచి తీయబడి విత్తులు కర్తకుల కందశీయ బడుచున్నవి.

వ్యాపారమునందు జనుపనార బెంగాల్, బెనారస్, ఢిల్లీ, బొంబాయి, కేవఘర్, వరంగల్. కాకి నాడ, గోపాలపురిం మొదలగు ప్రాంతీయ నామము లతో వ్యవహరింపబడు చున్నది. అయా ప్రాంతము లందలి జనుపనార గణ్యాతయందలి భేదములు కొంతవరకు రకభేదము వలన గలుగుచున్నను, అవి చాలవరకు సాగు చేయబడు పరిస్థితులు, విధానములు, నానితీయుటలో గల శ్రద్ధ మొదలగు వానిని బట్టియే కలుగుచున్నదిని యెంచదగును.

జనుపకాయ కోస్తా తెలుగు జిల్లాలలో నుత్పత్తియగునార యంతయు పూర్ణాకృతి కేరుచున్నది. ఇందు చాల భాగము గుంటూరు జిల్లాలో వినుకొండ ప్రాంతము నుండి దిగుమతియగు పెద్ద

గింజల రకపు నాన్ మైయున్నది. ఎగువ గోదావరి తీరపు గుమ్మగూడెం ప్రాంతము లందలి నార మరియొక ప్రత్యేకరకపు నారగ గాన్పించును. దీనివిత్తులను, వినుకొండ విత్తులను, నెలూరు, విజయవాడ, బరారి ప్రాంతములందలి నారజనుప విత్తులను చామరకొట్ట వ్యవసాయ శ్రేత్రమున బరీక్షింపగా నచటి పరిస్థితులం దీ గుమ్మగూడెపు రక మొకటియే గణ్యాతయందు తక్కిన వానికంటె విశిష్టముగ గనబడెను.

ఒక తడిభీలో తక్కిన రకముల నారతో నేసిన త్రాళ్లు (సుమారు 1 5/16 అం. చుట్టుకొల్ల గలిగినవి) ఏవియు 250 పౌనులకంటె హెచ్చు బరువును భరింపలేకపోగా, నీగుమ్మగూడెపు రకపు నారతో చేసిన త్రాడు 388 పౌనుల వరకు అపగలిగెను. ఈరకపు నార దిగుబడియు తక్కిన వానికంటె హెచ్చుగ నుండెను.

4. నారజనుమునకుదగిన పరిస్థితులు, పరివర్తనములు:-

నారజనుము తరుమాత్రము వర్షముగురియు ఉష్ణప్రదేశములందును, ఇవక జేయని గరుప కొడి నేలలందును, బంక కొడి గరుప నేలలందును బాగు నగును. వండలి నేలలు ప్రశస్తము. కాని యింతకంటె తేలిక నేల లందును, జిగురు నేలలందును గూడ నిడికొన్నిచోట సాగు చేయబడుచున్నది. దీని సాగునకు మెచ్చు అనుకూలముగ నుండు మెరక ప్రదేశములందు గోసిన వెనుక నీ మొక్కల గూరజేసి నారను దీయుటకు దగినవసతు లుండక పోవుట యీ వస్యపు సాగున కవరోధకముగ నుండును. ఇట్టి వసతులుండు పల్లపు ప్రదేశము లందీచేసి బాగుగ బెరుగవు నీని నారయు బహిసముగ నుండును.

నారజనుము అంద్రకేశమున మెట్టభూములందు తొలకరి పంటగ సాగు చేయదగి యున్నది. జూన్ నెలలో విత్తిన నీ వస్యము సామాన్యముగ నెప్టెంబరులో గోతవపచ్చును. అప్పటి కీ మొక్కల నూరబెట్టు గుంటలు, కోనేర్లు, కొట్ల వనైరాలలో తగినంత నీరుండును.

జేనవిలో తగినంత వర్షము గురియు కొన్నిచోట నారజనుమును ఏప్రిల్, మే నెలలో గూడ విత్తుటయుగలగు. వంగరాష్ట్రమున నెప్టెంబరు, అక్టోబరులలో గూడ విత్తుదురు. తెలుగు జిల్లాలలో గూడ మెట్టభూము లందీ కాలమునను, తొలకరిని మాగాణిభూములందు అక్టోబరు, నవంబరు లలోను, ఇతర వస్యములతో వ్వల్యముగ గలిపి విత్తు కొరకు సాగు చేయ గడు జనప మొక్కలనుండి కూడ, గింజలను తీసికొనిన వెనుక నార తీయుటగలగు. ఇట్లు తీయబడునార పలెనాగ యనబడును. ఇట్టి నార చాలవరకు చేపబట్టు వారిచే తమ వలె కొరకు దీయబడుచుండుటచే దీనికి పేరుగలిగెను. దీని గవ్యతయు, ధుయు కూడ తక్కువ. ఈపలె నార నారజనుము రకముల మొక్కలనుండియు, మేతజనుము మొక్కల నుండియు గూడ తీయబడుచుండును.

నారజనుము కొమ్మలను బెట్టక నిలువుగ నెరుగుటకుగాను చాల యొక్క జలవఃసియుండును. కావున నీ వస్యమును ప్రశ్నోకముగ నే సాగు చేయదగినను. పలెనార మిశ్రణముగ సాగు చేయబడు మొక్కలనుండి తీయబడుటచేతనే కరుగని ముడుపు దీరియుండును.

నారజనుము నది సాగుచేయబడదగు తృణ, కాయధాన్యాది సస్యములతో బరివర్తనము గావింపదగును. మాదిరి కొర కీక్రింద మూడు పరివర్తనములు చూపబడెను.

1. డెల్టాలోని మెరక నండలి నేలలందు

- 1 వ సం॥ నారజనుము తరువాత జొన్న + ఉలవ
- 2 వ సం॥ నూపు - తరువాత ఆనుసు
- 3 వ సం॥ విర్చి, వంగ, కంద, పెండలం లేక పసుపు
- 4 వ సం॥ మెట్టవరి + కండి; లేక మొక్కజొన్న + కండి; లేక కొర్ర; తరువాత పెసర.

2. గరుపకొడి యెర్ర నేలలందు (తగినంత వర్ష పాతము గలచోట్ల)

- 1 వ సం॥ నారజనుము; + తరువాత చోడి + ఆనుసు
- 2 వ సం॥ కరుపెసర; పిమ్మట జొన్న + ఉలవ (పసుపులమేతకు)
- 3 వ సం॥ గంటె లేక మొక్కజొన్న తరువాత పెసర.
- 4 వ సం॥ నూపు + కండి లేక ప్రత్తి.

తోట భూములంగు నీరుపెట్టి సాగుచేయు సస్యములతో మార్చి 3-4 సంవత్సరముల కొకసారి నారజనుమును తొలకరిని సాగు చేయవచ్చును. తేలికగను తగినంత మెరకగను నుండు మాగాణి మళ్ళీ తోడినిని తొలకరిని సాగుజేసి పిమ్మట వరిని నాటుటయు గలను.

3. రేవడినేలలందు (తగిన వర్షము గురిసి ఊరవేయుటకు నీరు లభించుచోట్ల)

- 1 వ సం॥ జనుము - తరువాత వరిగ లేక మొక్కజొన్న
- 2 వ సం॥ విర్చి
- 3 వ సం॥ కొర్ర + ప్రత్తి
- 4 వ సం॥ కరుపెసర.

5. సేవ్యవిధానము, అరిష్టములు:— నారజనుము అంధ్రదేశమునందంతటను వరాధారముననే సాగుచేయబడుచున్నది. దక్షిణాదిని (తిరునల్వేలి జిల్లాలో) దీనిని నీరుపెట్టి సాగుచేయుటయు గలదు. అచట నిది సాగుచేయు మే - జూన్ నెలలలో వర్షము గురియకపోవుటయే యిందులకు గారణము.

నేలను వేవివరముల సహాయమునగాని, అంతకుముందేగాని బాగుగగన్ని సాగుచేయదగను, ఒది చిక్కుడు కుటుంబములోని దళితులే దీనికి ప్రత్యేకముగ కరువువేగు నవసరములేదు. కామగోటలో జరిగిన పరిశోధనలలో ఎరువువేసిన మళ్ళ గిరిబడికిని వేయని మళ్ళ గిరిబడికిని భేదమంతగా గానరాలేదు. కాని గంజాం జిల్లాలో కొందరు దీనిని తేలిక పరిమళ్ళలో సాగుచేయునపు డెకరమున 5-10 బండ్లు పశువుల యెరువును దోలుటగలదు.

నార జనుములను సామాన్యముగ నెకరమునకు 40-60 పౌనుల చొప్పున బిడ్డగను. బీద నేలలందు మరి కొంత యుత్తుగ జలవచ్చును. తిరునల్వేలి జిల్లాలో 120 పౌనుల వరకు జలము కలగు పిమ్మట తరుణము కనిపెట్టి కోయుట తప్ప మరేనియు నవసరముండదు.

నార జనపచేల యరిష్టములలో నీక్రింది రెండు చీడలును ముఖ్యములు.

1. గొంగళి పురుగులు:- తెలుగు జిల్లాలలోని జనపచేలకు ఎరువు నారింక వర్ణముల మచ్చలుగల గొంగళి పురుగులు హెచ్చుగపట్టి వానియాకులను నీ కాయలను దొలచును. ఇవియొక జాతి (*Utetheisa pulchella*) పరుపురెక్కల పురుగు డింధములు. మనుతొలకరిని లేక యింకను ముందుగ జలబడుచేల నీ పురుగుల బాధమెందు. ఎగిరెడు రెక్కల పురుగులను వలెతో బట్టి చంపవచ్చును. పురుగులే మూలకైన కన్పడగనే కనిపెట్టి వానిని కరోసిన్ చుమరుపోసిన నీటి తొట్లలోనికి దులపవచ్చును. హెచ్చుగ బట్టిన వెనుక ఉలిపాషణపు (*Lead arsenate*) నీటినిజల్ల వచ్చును. కాని సామాన్యముగ నీపని క్రిట్టుబాటుగ నుండదు.

2. గుమ్మడి పురుగు:— ఈ పేరుతో వ్యవహరింపబడు కొకజాతి (*Longitarius belgaumensis*) చిరుబరిణె పురుగులు (flea beetles) అనేకముగ బట్టి యాకులంగు కన్నములను జేసి మొక్కలెగిరికుండ జేయును. వీనిని వెలలతో బట్టవచ్చును. లేక బోర్డో మిశ్రణమువంటి నిరోధకద్రవ్యముల జల్లవచ్చును. కాని యీ పనియు సామాన్యముగ గిట్టుచుండును.

ఇరము హెచ్చుగ గురిసినపు డింకవలన వేళ్ళచెడి మొక్కలు చావవచ్చును. కాని యొక్కొకప్పుడు - ముఖ్యముగ ఉత్తర హిందూ స్థానమున - ఒక శీలీంధ్రము (*Fusarium vasinfectum*) మొక్కల మొదళ్ళకును, వేళ్ళకును బట్టుటకు న నవి వడలి చచ్చుట గలదు. ఈ వడలు తెకులుపట్టని కాన్పూరు నం 12 వంటి వంగడ ములను సాగుచేయుటే తెగలనకు నివారణ సాధనము.

6. కోత, నారను దీయుట:— నారి జనుమును మొక్కలు బాగుగ పూచిన వెనుకను, పించె లంతగా నెరుగక మునుపును గోయుట మంచిది పూతప్రారంభించు వనగా గోయుచో నా రేటుగను మృదువు గను నుండును*. కాని జిగితక్కువగను, పించెకట్టి న వెనుక గోసినచో నారిలేటు కొంతతగ్గను. గింజ మురిసిన వెనుక గోయుచో నిది మరింత తగ్గును†. సాఫుగను నుండదు.

* మిగుల త్వరలో పూయుంకము లిప్పటికింకను పూర్తియైతున కనుగవు. కావున నారయు తక్కువగును. పూతపూర్తియగు సరికి పెరుకు వయు పూర్తియగును. గావున నపుడు గోసిన గుబడియు బాగుగ నుండును. నారిలేటును జెడదు. జిగియు హెచ్చును.

† కొన్నిచోట్ల గింజలనుండి వచ్చు రాబడికానిచి నారి కొంత చెడి దానికి తక్కువ ధర వచ్చినను చేనిని బాగుగ ముద్రనిచ్చి పైభాగములను గోసికొని గింజలను దీసికొని, తక్కిన భాగములనుండి నారను దీయుదురు. కొన్నిచోట్ల చేను పూతమొద నుండగనే నారరాని పైలేత కొమ్మలను గోసి పశువులకు మేపుకొని క్రింది భాగమునుండియే నారను దీయుదురు.

పైని తెలుపబడినట్లు యుక్తమగు తరుణమున గోసిన మొక్కలను పనమీద 2-3 రోజులెండనిచ్చి ఆకులను రాల్చి కట్టలుగగట్టి తీరిక వైనపుడెల్ల కొన్ని కట్టలను స్వచ్ఛమగు నీటిలో మోదటలువుగ 1½-2 అ. లోతు నీటిలో నిలబెట్టి 1-2 రోజులుంచి పిమ్మట వానిని పూర్తిగ నీటిలో మునుగునట్లు అడ్డుగపేర్చి పైననేదేని కర్రదుంగును లేక రాళ్ళు పెట్టు పెట్టవలెను. తరుచు పొడిమంటి గడ్డలను లేక పడిమంటి చెక్కులను నీటెత్తు పెట్టుదురు; కాని యివి కరుగుట వలన నీట పరిగి నార లేటుతగ్గును. బురదనీటిలో నూగవేయుచో నార లేటు మరింత తగ్గును. ప్రవాహపునీటిలో కంటే నిలువనీటిలోనే మొక్కలపై పట్టస్వరలో చీకును. మొక్కల మొదళ్ళనుండి పట్టసులభముగ విడివచ్చినంత తరకు చీకగనే, కట్టలను దీని నారను దీయవచ్చును. ఇట్లు చీకుటకు నీటి యుష్ణత, మొక్కలరావు, ముదురు లేతలు, మొదలగు పరిస్థితులను బట్టి 1-7 రోజులు పట్టును.

నారను దీయుటకు గుప్పెడేసి మొక్కలను తీసికొని మొదట నీటిలో బాగుగ ర్పూడించి శుభ్రముచేసి మొదటినుండి, సుమారుకటి రెండడుగుల దూరమున విరిచినచో* యాక్రింభాగమునందలి నారనుండి లోని కర్రలు విడివడును. వీనిని తీసివేసి యాభాగపు నారను తప్పకుండుకొని తక్కిన భాగమును ర్పూడించుచో నందలి కర్రలు నూడ చాలవరకు విడిపోవును†. శేషించిన వానినిగూడ తీసివేసి అప్పుడు నారనంతటిని పలుమారులు నీటిలో ర్పూడించి శుభ్రపరచి దండెముల మాత్ర లేక పచ్చికచే కప్పబడిన నేలమీద పరచి యెండనిచ్చి బాగుగ నెండిన వెనుక కట్టలుగ గట్టి జాగ్రత్త పెట్టవలెను.

* కొన్నిచోట్ల నిట్లు చేయుటకు ముందు శుభ్రముగ ర్పూడించి తీసిన కర్రలను 1-2 గంట లారనిమ్మట గలదు.

† కొన్నిచోట్ల పైని సూచింపబడినట్లు మొదటి భాగములను విరిచి క్రింది భాగములందలి కర్రలను మాత్రము తీసివేసి తక్కిన భాగముల నట్లే గూఱుగ బెట్టి యెండనిచ్చి వీలైనపుడెల్ల వానినుండి నారను ప్రవిధముననే తీయుట గలదు.

జనపశుసామాన్యముగ నెకరమునకు 6-10 రైలములుగల వరకు గావచ్చును. పసమీద బాగుగ నెండి చాలవరకాకులను రాల్చిన కర్రల తూనికపై నూటికి 8 వంతుల వార దిగుబడియగును.

నారలేటును హచ్చించుటకు నానిని చాకళ్లు బట్టలను తెలుపు చేయుట కుపయోగించు పొడి (4 టిక హరిదము CaCl_2) మపయోగింపవచ్చునని చామర్లకోట పరిశోధనా స్థానమున గనిపెట్టబడెను. ఎకరము 1 కి 5 పౌనులు సరిపోయెను. కాని యీ పరిమితి యెకరమున కగు నారపరిమితిని బట్టి యుండును. పలచని యమ్మదా)వలములలో నుండుట వలన గూడ నిట్లు లేటువచ్చును. కాని యిట్టి సంస్కరణల వలన నారజిగి కొంత తగ్గును. నూటికి $\frac{1}{2}$ వంతు చొప్పున పొటాసియ పరిమాంగనితము (Potassium permanganate) కలిపిన నీటి మపయోగించుచో నారజిగి యంతగా తగ్గకయే నారలేటుగ నుండునని చామర్లకోటలో పరిశోధనవలన తేలెను.

7. ఆదాయవ్యయములు:—ఒక యెకరముపై జనుమును సాగుచేసి నారను దీయుటకగు వ్యయమును, అంశవలన రాదగు ఆదాయమును నీ క్రింద యంచనా వేయబడెను.

నెల	పనివివరములు	పాటు			వ్యయము రూ. అ.
		ప. జ. మ.	అ/పి.		
ఏప్రిల్ లోపల గుక్కి	- 2 సార్లు	3	3	—	6-0
ఏప్రిల్ - మే	ఎడనేద్యము - 2 సార్లు	1	1	—	2-0
జూన్	ఎడనేద్యము - 1 సారి	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	1-0
	విత్తులు 10 పౌనులు	-	-	—	5-0
	వెడజలుట 2 సార్లు కలియ			—	
	దున్నుట-కంప తోడు				
	గు తోలుట	3	3	—	6-0

నెల	పనివివరములు	పాటు		వ్యయము	
		ప.జ.మ.	ల/పి.	రు. ల.	
సెప్టెంబరు	కోత, కట్టలు కట్టట, నీటి వసతి యున్నచోటికి తోటట, ఊర వేత, నారతీయట, ఎండ వేసి కట్టలు కట్టట	1½	10	35	15-0
		9	17½	35	35-0
	రాబడి - నార 8 మణుగులకు				64-0
	కర్రలకు - 15 మణుగులకు				1-8
	నికరాదానము				65-8
					30-8

8. జనపనార యుపయోగము:- ఈ జీతమున జనపనార తరువు త్రాళ్ళను పేరుకొనుటకు, బండియిరుసులకు జాట్టుటకును నుపయోగింప బడుచుండును. దీనిపరితో చేనేత గోనెగుడ్డలను, సంచులను, గృహోపయోగమునకు బనికీవయ్య పంచులను జేయబడుచుండును. చేపల వాండీనారతో వలలను, త్రాళ్ళను దయారుచేసి కొనుచుందురు.

ఈ నారతో పేనినతాళ్లు, నేసిన సంచులు వగైరాలు గోగు కిత్తనార వగైరాల నారతో తయారు చేసిన వానికంటె బలయగనుండి కాగుగ నున్నను.

విరోపాఖండమునను, అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములందును జనపనార ముడుగు దాంము (Twine) పురి, త్రాళ్లు, మోకులు (Cables) మొదలైన వాని తుపయోగింపబడు చుండును.

కారణ దుర్విచారచేయునపుడు లాగి నేరుచేయబడు రద్దు నార లేక ఓరు (Tow) పనులవైద్యమున గాయములను సుభ్రముచేయుటకు, కాపటము పెట్టుటకు, కట్టుకట్టుట వనరాపనుల కుపయోగింపబడుచుండును.

9. జనవనార యుత్పత్తి, వ్యాపారము:- ఇండియా మొత్తముమీదగాని, యీ రాష్ట్రమున గాని యిప్పుడుగాని, సాగు హెచ్చుగ నుండిన వెనుకటి కాలమున గాని యుత్పత్తియగుచుండిన జనవనార పరిమితిని తెలుపు అంకెలు లభింపలేదు. కాని సాగుహెచ్చుగ నుండిన కాలముగు 1918-14 వ సం॥ చెన్నరాష్ట్రము నుండి విశేషముల కగుమతియైన నాగు 57,000 హం. (హండ్లెనియు, దీని విలువ 9,48,000 రూపాయలు అండ్లెనియు తెలియుచున్నది. ఎగుమతియైన నారలో సుమారు 60% కాకినాడరేవు నుండి పంపబడిన ఆంధ్రదేశపు నారయే. 1930 సం॥ నాటికి ఇండియా మొత్తముపై నేటేట సుమారు 6,50,000 హండ్లెనుల (సుమారు 9,75,000 కోట్ల రూపాయల) విలువగల నారయెగుమతి యగుచుండెనని యొక లెక్క తెలుపుచున్నది. కాని పిమ్మట రష్యాలో విరివిగ నుత్పత్తి చేయబడుచుండిన గంజా నార (Hemp) పోటీవలనను, ఇతరనారల పోటీవలనను దీని యెగుమతియు, కానినోపాటు ఉత్పత్తియు గూడ క్రమముగ తగ్గిపోయెను. 1947-48 సం॥ నీరాష్ట్రము నుండి విశేషముల నీనార యెగుమతియైనట్లు లెక్కలు తెలుపుటలేదు. రష్యా గంజా నారనో నీనార పోటీ కాకలేక పోవుటకు గారణము ఆ నారకంటె యిది స్వతస్సిద్ధముగ హీనముగుటకాదనియు, దీనిని తయారు చేయుటలో గల లోపములచే నెగుమతిచేయబడు దినుసు గణ్యత నానాటికి చెడుటయే యందులకు గారణమనియు నెంచబడుచున్నది. ఎగుమతియగు నార యంగు కనిపెట్టబడిన ముఖ్యవోషము లేవన. —

(౧) వివిధ పరిస్థితుల్లో పెరుగుటవలనను, నారదీయు జాగ్రత భేదముల వలనను నేర్పడిన భేదములు గల దినుసుల కలగలుపు చేర్పు కట్టబడి యొగుమలిచేయబడుట

(౨) బురదనీటిలో నూరవేసి తయారు చేయుటవలన నార దుమ్ము, దూగర వగైరాలతోగూడి రంగుమాసి యుండుట

(౩) తగిన యనుభవము లేమిచే మొక్కలూరుట హెచ్చుతగ్గుల వలన నారియేచలు పూర్తిగా విడిపోకుండుట, హెచ్చుగ చీకి జిగి తగ్గుట, పుల్ల హెచ్చుగ నుండుట, నార చిక్కపడి పోవుట వగైరా లోషములు

∴ (౪) చేర్పు కట్టుటలో తడుపుట వగైరా మోసపుపనులు

ఈలోపములన్నియు సుంభముగ నివారింప దగినవే. అనుకుల పరిస్థితులందు సాగుచేయబడిన సవ్యమునుండి తీయబడు నార జిగిలో రమ్యలో నుత్పత్తియగు గంజా నారకు దీసిపోదు. దీనిని జాగ్రత్తగ దీసి గణ్యతగల నారను తరగతి వారిగ జేర్చుకట్టి యొగుమలిచేయుచో స్వేచ్ఛి నై దీనికి గిరాకీ మరల కలుగక పోదని నిపుణుల యభిప్రాయము.

ఈ దోషమునందలి ఆయాప్రాంతముల నుండి విరివిగ నెగుమలి యగుచుండిన జనపనారలో బొంబాయి రాష్ట్రమందలి రత్నగిరిజిల్లాలో నుత్పత్తియగు రేవఘట్ నార సామాన్యముగ హెచ్చు పరిశుభ్రముగ నుండును. వంగరాష్ట్రపు నారకూడ కొంతగణ్యముగ నుండును. సంయుక్తరాష్ట్రములందలి బనారిసు నార దీనికంటె హీనము. సంయుక్త రాష్ట్రములందలి ఫిలిబిట్ దినుసును, బొంబాయిప్రాంతములందలి నారలో రేవఘట్ దినుసు కాక తక్కినదియు కడుహీనముగ నెంచబడుచున్నది. కాకినాడ వరంగల్ దినుసులను నంతగా శ్రేష్ఠములుగావు.

చెన్నరాష్ట్రమునుండి జనపనార హెచ్చుగ నెగుమలియగుచుండిన కాలమున పైని సూచింపబడినట్లు నూటి కరువని వంతులు కాకినాడ నుండియే యొగుమలి యగుచుండెను. కొంతకాల మిపుడు బరిస్సాలో చేర్చబడిన గోపాలపురపు రేవునుండికూడ కొంత (22%) యొగుమలి యగుచుండెను. ఇటీవల నీ గోపాలపుర ప్రాంతములందలి జనపనారకూడ కాకినాడ రేవునకే పంపబడుచుండెను.

ఎగుమతి రేవుస్థలములందే కాక గుంటూరు, విజయనగరం మొదలగు స్థలములందు కూడ నీ నారను బేళ్లుగట్టు యంత్రములుండెను. వీని సహాయమున నీ నార సామాన్యముగ 400 పానులు బేళ్లుగట్టబడి రేవుస్థలములకు పంపబడి యచటనుండి యెగుమతియగు చుండెను. 500 పానుల బేళ్లుగట్టబడు చుండుటయు గలగు.

ఇతర రాష్ట్రములంగట్టి యగుచుండు నార సామాన్యముగ బొంబాయి కలకత్తా రేవులనుండి యెగుమతి యగు చుండును.

4. గోగు

Deccan hemp, Bombay hemp or Bhimilipatam Jute
Hibiscus cannabinus - N. O. Malvaceae

హిం - మెస్తా, అబాషీ; అ - ఫులిచై; క - లూండి

గోగు ప్రత్తి కుటుంబములోని మరియొక యేకవార్షిక జాతి. బెండ గణములోనిది. ఇగు బహు వార్షిక రకములును గలవు. ఇందలి రకములు చాలవరకు నారకొరకే ప్రత్యేకముగ బెంచబడుటచే నీ జాతిని “నారగోగు” అని వ్యవహరించుదురు. సామాన్యముగ పుల్లగోగు అనుపేరుతో కూరకొరకు బెంచబడు రకములు మరియొక జాతి (H. sabdariffa) లోనివి. కాని యిటీవల నీజాతిలో నొకరకము (H. sabdariffavar. altissima) కూడ కాశీ లేక పూసా గోగు అనుపేరుతో నారకొరకు విరివిగ బెంచబడు చున్నది. చెన్నరాష్ట్రపు లెక్కలలో నీ కాశీగోగు “జూట్” (Jute) అనుపేరుతోను, సామాన్యపు నారగోగు బొంబాయి హెంపు (Bombay hemp) అనుపేరుతోను వ్యవహరింపబడు

1. వీనిని గురించి ‘కూరదీనుము’ అను సంపుటమున దెలుపబడెను

చున్నది. కాని వంగరాష్ట్రము నందును, పరిసర ప్రదేశములందును మిగుల విరివిఁ బెంచబ ఁ జూట్కరకములు (Corchorus oolitorius C. Capsularis) పలాష్రి టుంబము (Tiliaceae) నకు జెందినవి.

చరిత్ర, వ్యాపకము:—గోగున కాదిమస్థానమేదియో సరిగా తెలియదు. కాని యిది చాలకాలము క్రిందటనే అఫ్రికాఖండమునుండి యీ దేశమునకు వచ్చెనని యెంచబడుచున్నది. మొగలు చక్రవర్తులనాటి 'విసి అప్పరీ' అను గ్రంథమున దీని ప్రశంస గలదు.

ఇండియాలో నారగోగులు దక్షిణభాగమున ముఖ్యముగ బొంబాయి, చెన్నపురి, మధ్యప్రదేశ్, (Central Provinces) హైదరాబాద్ రాష్ట్రములందు విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది.


చెన్నరాష్ట్రమున 1947-48 లో నారగోగు విస్తీర్ణము 39,619 యెకరములండెను. ఇందు 35,117 యెకరములు తెలుగు జిల్లాలలోనివే. జిల్లావారీ వివరము లీక్రింది పట్టికలో దెలుపబడెను.

జిల్లా	కాకిగోగు	సామాన్యపు నారగోగు	లి
విశాఖపట్టణము	11,928	7,878	న్నలు)
గుంటూరు	9,602	1,038	పయ్యోని, 000
కృష్ణా	1,649		ముర మిల్లలలో నుప
కర్నూలు	—		పశ్చిమవంగరాష్ట్ర
తూ. గోదావరి	1,237		చీకిన
తెలంగాణ	—		ప్రభుత్వముచేత నీయనగరము. ఇచట
			ప్రభుత్వ మంచున్నారు. ఇచటనే నారగు
ఎడమచైపున దా. క్షేయంత్రములను, చేయంత్రములును గూడ			
(14) క్షేయంత్రముల సహాయమున గట్టబడు చేళ్లు			

నారగోగు ఆంధ్రదేశమున చిరకాలమునుండి కర్షకులచే స్వంత యుపయోగము కొరకు స్వల్పముగ బెంచబడుచున్నది*, తొలుత నిది విశాఖపట్టణము జిల్లాలో గొంతవిరివిగ సాగుచేయ నారంభింపబడెను. ఆజిల్లాలో గతకర్తాబ్దాంతమునను, నీ శతాబ్దప్రాంతమునను హెచ్చుగ సాగుచేయబడు చుండిన నీలిపైరు కృతకపు (Artificial) నీలిమందు కనిపెట్టబడిన వెనుక కిట్టుబాటుగ లేకపోవుటచే, దాని బడులు దీనిని హెచ్చుగ సాగుచేయ నారంభించిరి. ఆకాలముననే ఆజిల్లాలో నిపుడున్న చిట్టివలస నారమిల్లు నెలకొల్పబడుటచే* నీ నారగోగు సాగునకు మరింత ప్రోత్సాహము గలిగెను. పిమ్మట గుంటూరులోను, ఏలూరులోను గూడ నిట్టిమిల్లులు నెలకొల్ప బడుటచే దీనిసాగు ఆరెండు జిల్లాలకు వ్యాపించు టయే కాక విశాఖపట్టణము జిల్లాలోగూడ నీపరిశ్రమ విస్తీర్ణము పెరిగెను. 1917-18 లో దీనిసాగు 66,200 యెకరము లుండెను.

కాని గోగునార పంకరాష్ట్రపు బాల్ నారయంత క్రేషము కాక పోవుటచే నానారచాకగ కొరకునప్పుడు విల్లయజమానులు దీనిధరను మిగుల తగ్గించుటచే దీనిసాగు ఒక్కొక్కప్పుడు తగ్గుచు, మరియొక్కొక్కప్పుడు హెచ్చుచు వచ్చెను. 1947-48లో నీ సాగు పైని తెలుపబడినట్లు వ్యవహారమున 39,619 యెకరములకు తగ్గిపోయెను. కాని మరల కూరకొరకు బాల్ విసారముగ పైరుచేయబడు ప్రదేశములు చాల వరకు dariffa) లోను, లోని జీరిపోవుటచే నిండియాలో నీ నారకు కర (H. sabdariffa) నారగోగు సాగునకు మరికొంత ప్రోత్సాహముగలిగెను. గోగు అనుపేరుతో నారకొరకు ----- చెన్నరాష్ట్రపు తెక్కలలో నీ కా నారకొరకు బెంచు గోగు పుట్టి అనుపేరుతోను, సాచానస్యపు హెంపు(Bombay hemp) అనుపేరుతో

* దీనిని గురించి 'హరదినుసులు' అను సంపుటమున దెలుపబడెను



ను నందు వలన
ను.

స్థలు)
యందుల సుపయోగిని, 000
కుంట్ల కొనిమర మిలులలో నుప
పశ్చిమవంగరాష్ట్ర

చీకెన

నారకొరకు శ్రీహరిస్థానమునందు నగరము. ఇచట
నారకొరకు శ్రీహరి మందున్నార. ఇచటనే నారకు
ఎడమవైపున దేశనాశక్తియంత్రములును, చేయంత్రములును గూడ
(14) శక్తియంత్రముల సహాయమున గట్టబడు చేళ్లు

ఇంతకుముందే వ్యవసాయ శాఖవారిచే ప్రవేశపెట్టబడి యుండిన కాశీగోగు రకపునార, మిల్లులందు గోనెగుడ్డలను, సంచులను దయారు చేయుటకు సామాన్యపు గోనెనార కంటే హెచ్చు అనుకూలమగుటచేఁ దీనిని హెచ్చుధరకూడ వచ్చుచుండెను. కావున నీ క్రొత్తరకపు సాగు మిగుల చురుకుగ హెచ్చి సామాన్యపు రకముల సాగు చాల తక్కువ.

ఒక విశాఖపట్నం జిల్లాలోనే యీ కాశీగోగు సాగు 1947-48 లో సుమారు 11926 యెకరములుండ 1950 వ సం॥న 45939 యెకరము లయ్యెను. ఈ కాలముననే సామాన్యపు రకముల సాగు 7078 యెకర ములనుండి 1550 యెకరములకు తగ్గిపోయెను. కాశీగోగు హెచ్చుగ నున్న తాలూకాలలో పాలకొండ, చీపురుపల్లి, బచ్చిలి, పాతపట్నం తాలూకాలు వరుసగా ముఖ్యములు. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, సాయూరు, పావనశ్రీపురం యివి వాని తరువాతివి. లెక్కలి తాలూకాలో గూడ స్వల్పముగ గలదు.

3. నారగోగు మొక్క లక్షణములు, రకములు:—

నారగోగు మొక్క లాత్తుగ జల్లి పెంచుదుతో కొమ్మలనంతగా పెట్టక సామాన్యముగ 2½-3 గజముల యెత్తెగుగును. అనుకూలపరిస్థితులలో నింతకు రెట్టింపు యెక్కువర కెగురుటగలదు. ఆకులు కొద్దిగొప్ప లోతుగ జల్లి కొన్నమున 39,619 రెల్లిగ యుండును. క్రిందిభాగమున తమ్మె కూరక 500-550 విసారముగ కలుగుగూడ యుండవచ్చును. ఈతమ్మెల dariffa) లో 15 లో శేరిపాలిగియుండును. పూవుల నిర్మాణము ప్రత్తి (H. sabdariffa) వలెగానూ పువ్వుకొరము 5 దంతములు గలిగి తుడి గోగు అనుపేరుతో నారిళ్ళొత్తములు యిండుక పసిమిరంగుతో గూడిన చెన్నరాష్ట్రపు లెక్కలయ్యెను. క్రిందభాగమున కలసి యుండి యచట అనుపేరుతోను, సామాన్యపు గోగునాదికంటే మృదువుగనుండి హెంపు(Bombay hemp) అనుపేరుతోనూ వగైరా వ్యవసాయోపకరణ సుండదని కర్షకుల యను

కింజల్కముల గొట్టమున కంటియుండును. గర్భకోశము 5 అరలుగలది. ఒక్కొక్క యరలో మూడేసి గాని పొచ్చుగ గాని బీజాండములుండును. కీలకములైనది. క్రింది భాగమున గలసి యుండును. కాయ యందును 5 గదులుండును. గింజలు గుండ్రజేరి యిందుక గోధుమవర్ణముతో గూడి నలుపురంగులో నుండును. తులమునకు సుమారు 450-480 గింజలు తూగును. సేరు (గోదావరిజిల్లా) గింజలు 21-22 బౌన్సులు తూగును.

గోగునందలి జాతి భేదములు వైవిధ్యము తెలుపబడెను. సామాన్యపు నారగోగు జాతి (H. Cannabinus) లోని రకములలో కాండము, ఆకులు యీనెలు వగైరాలు యెర్రగనుండు రక మొకటియు ఆకుపచ్చ గనే యుండు రక మొకటియు సామాన్యముగ కరకులచే గురింపబడుచున్నవి. కాని సామాన్యముగ యెరుపురకపు గోగుచేలలో కొన్ని ఆకు పచ్చ మొక్కలును ఆకుపచ్చని రకపు చేలలో కొన్ని యెరుపురకపు మొక్కలును గాననగును. మరియు నీ రెంటి సంకరమువలన నేర్పడి యెరుపురంగుండు భాగములోను, అరంగుయొక్క సాంద్రతలోను భేదములగల అవాంతర లక్షణములతో గూడిన మొక్కలును నుండవచ్చును.

ఎరుపురకము, ఆకుపచ్చరకముకంటె మోటయిన శరటచే నిదియే కొన్ని ప్రాంతములందు సాగున కాక్కువ యనుటా...

25 వ పటము
స్వపు నారగోగును సా
ను నందు వలన లభించు గ
డెను.



ములు:-
యందుల సుపయోగము, 000
కంటుకొనిమర మిలులలో నుప
పశ్చిమవంగరాష్ట్ర)

చీకెన


హృదయగరము. ఇచట
గృహార మందున్నాడు. ఇచటనే నారను

దేశవారీ నాగోశక్తియంత్రములును, చేయంత్రములును గూడ
శక్తియంత్రముల సహాయమున గట్టబడు లేళ్లు

బడియన్సుడి. కాని కొన్నిచోట్ల అకుపచ్చరకమే విరివిగ సాగుచేయబడుచున్నది.

కూరగోగు (H. sabdariffa) జాతిలోనిదగు కాశీగోగు మొక్క కొంచెమించుమించు పసరుగంగు కాండముగల నారగోగు రకపు మొక్కనే బోలియుండును. కాని కాండము మొదట అకుపచ్చ

26 వ పటము



కూరగోగు మొ
సామాన్యముగ $2\frac{1}{2}$ -
10 తకు రెట్టింపు యెగువ.
జీర్ణ కొమ్మలను 39,619



కూరగోగు మొట్టా విస్తారముగ కట్టు, పూవు, కామ $\frac{1}{2}$
dariffa) లో నేలలో జేరిపోలి

(H. sabdariffa) గోగు సామాన్యముగ నింపుక యెర్రబాగును. కాండము గోగు అనుపేరుతో నారిక్కుల తొడిమలు దళముకంటె కురుచగ మొనడరి యుండును.

చెన్నరాష్ట్రపు లెక్కలభివృద్ధి

అనుపేరుతోను, సామాన్యముగ సుకూలముగ పరిస్థితులు :-
హెంపు (Bombay hemp) అనుపేరుతో ఇంచైనను నిది వడిమి తగి
గను నెడిగి నార పొడవుగ

వినిసి నుండి 'హూరదినములు' అను పర్వలిగినను తగినంత వర్షము

గురియ్యచోటనే వలసినంతయెత్తుగ నెరుగగలదు. మరియు నీవారను దీయటకుగాను మొక్కలను గొంతకాల మూరవేయుటకు తగినంతసేరు లభించు చోటనే గాని యీ చేలను బెంచ వీలుపడదు.

గోగుచేలను పైని తెలుపబడిన పరిస్థితు లమరుచో సామాన్యముగ నన్ని విధముల నేలలందును బెంచవీలగును. కాని పదును బొత్తిగా నిలు వని యెర్రనేలలకంటెను, యిసుకకొడి నేలలకంటెను, పెంకకొడి గరుపనేలలును, గరుపనేలలును వీనికి హెచ్చు అనుకూలములు. విశాఖ పట్టణపు జిల్లాలో గోగును మాగాణిభూములలో గూడ సాగు చేయుచున్నారు.

5. సేవ్య విధానములు, పరివర్తనములు ; మిశ్రణములు :- సామాన్యపు నారగోగు రకములను మెట్టభూములందును కొంచెము మెరకగనుండు మాగాణిభూములలోను తొలకరినిగాని, తగినంత వర్షముగురియ్యచో నింకను ముందుగనే కాని విత్తి వర్షాధారమున సాగుచేయవచ్చును. మెట్టభూములలో జొన్న, కొర్ర, చోడి, నూపు వేరుసెనగ మొదలగు సస్యములతో మార్పి పెట్టవచ్చును. వలకలము ముగిసిన వెనుక నేలలో పదును నిలుచుచోట గోగును గోళిచేట నా సంవత్సరముననే చోడిని గాని, ఉలవను గాని, ములులు :- పిల్ల.

సస్యపు నారగోగును సాగు గరుపనేలలకీ క్రింది పరివర్తన మనుజు నందు వలసి లభించును.

- 1 వ సం॥ గోగు; పిమ్మట చోడెను.
- 2 వ సం॥ నూపు; పిమ్మట ఉళి యందుల నుపయోగింప, 000
- 3 వ సం॥ కొర్ర; పిమ్మట పెకంటుకొనిమర విలులలో నుప
పశ్చిమవంగరాష్ట్ర

నారగోగును ఒత్తుగ జల్లవలసి యొక చీకెను.

ప్రత్యేకముగనే సాగుచేయ బడుచున్నవర్షాధారస్థులయొక్క యియనగరము. ఇచట నకు మెట్టభూములలో మెట్టస్థాన మందున్నారు. ఇచటనే నారను లతో కొంచెము గింజలను శక్తియంత్రములను, చేయంత్రములును గూడ నుండి తడవలను దీనికొక శక్తియంత్రముల సహాయమున గట్టబడు చేట్లు

(Orange banded blister beetle. *Mylabris pustulata*) గోగు పూవులనుగూడ దినివేయుటగలదు. కాని యిందు వలనను నచ్చమంతగా నుండదు.

8. గోగుచేలతీత, నాగను దీయుట:- గోగుచేను పూచి,

కాయలేర్పడిన వెనుక నీ కాయలు బాగుగ ముదకమునుపు * మొక్కలను మొదటికి గోయదగును. కాని సామాన్యముగ వీనిని నేల తగినంత లేనుగ నుండు సమయము చూచి వేళ్ళతో పీకుదురు. పరిమళ్ళలోని చేనికి నీరుపెట్టి లాగుటయుగలదు. కాని యిట్లు పీకుచో నార దిగుబడి కొంత హెచ్చినను గణ్యత కొంత తగ్గును. మొక్కలను కోసిన లేక వేనుక వానిని కట్టలుగగట్టి యీ కట్టలను నిలువుగ చిన్న చిన్న సాయ గ బెట్టి 3-4 రోజులుంచ దగును. మొక్క లీలోపున వడలి వెనుక విక్రమము. కొందరు కోసినవెనుక పసమీదనే 2-3 రోజులొకరి కిదియడురాదు. కట్టలుగ గట్టుటకలదు. ఈ కట్టలను పిమ్మట 2-2½

6. నాగు లుంచదగును. ఇటుంచుటవలన బాగుగ ముడిరి పట్ట నప్పటినుండియు క్రింది భాగము ముందు కొంతవరకు చీకును. పిమ్మట పునురగోగు మెళ్ళవే పూర్తిగ గప్పబడునట్లునాల్చి నీరు తగినంత లోతుగ తగ్గిమాన్యముగ కట్టల గుట్టులగ వేసి పైననేవైన బరువైన దుంగలను 2మీంతకు రెటింగు మెకుమ గ్గి.

జరి కొనమున 39, 619 లుగిటు చేల వొక్కొకప్పుడు పరినాటునకు కూలకలను - దో విసారముగ వేసిన మళ్ళ నాటు పూర్తియైనపుడు dariffa) లో వేసలో జేరిపట్టి పీసి వేయుచుండరు. ఇట్లు పీయుచో (H. sabdariffa) నగగోగు పీనిని న్నను జిగి తక్కువగ నుండును.

గోగు అనుపేరుతో నారిళ్ళొక్కమట కష్టపిటి వాసగు చెరువులలోగాని చెన్నరాష్ట్రపు తెక్కలల్లు. జరి మంటడు మరుగు కోళ్ళు, బంటాలు అనుపేరుతోను, సామాన్యపు పొంపు (Bombay hemp) అనుపేరుతోను నీటికంటె చలనములేక పొంపు (Bombay hemp) అనుపేరుతోను నీటికంటె చలనములేక పొంపు

వీనిని గురించి 'హొరదినుసులు' అను పుగ

తేక రాళ్ళ నెత్తు పెట్టవలెను 1. పరిస్థితులనుబట్టి సుమారు 15-25 డిసెములలో మొక్కల పైపట్ట అంతటను చీకును. అపుడపుడు కొన్ని కర్రలను దీసి సరిగా చీకినదియు, లేనిదియు, హెచ్చు చీకినదియు కనిపెట్టుచు రావలెను. మొక్కల యడుగు భాగపు పట్టలోని కాడనుండి సులభముగ విడదీయ * వీలగుట యిందులకు ముఖ్యమైనది. ఇట్లు తగినంతగా చీకిన వెనుక నాకట్టలను విప్పి యందలి కర్రల పై పట్టను విడదీసి నారనుండి చీకిన యంతర భాగములు పూర్వ వోవునట్లు నీటిలో రుూడించి, నారును మరల స్వచ్ఛముగు నీటిలో నునిచి పరిశుభ్రము చేసి యుండ చెట్టవలెను.

సామాన్యముగ నెకరమునకు 10 కైలు ముఖగుల నార కావచ్చును. అనుకూల పరిస్థితులలో 15 ముఖగులకు పంచియుండుట గలగు. కర్రల పచ్చిత్రానికపై నారప్రమాణము నూటికి 3½-4 వంతులుండును.

నారగోగును స్వల్పవీర్ణమున స్వోపయోగమునకై బెంచు కర్రకు లూరవేసిన నారను దీయుచురుదు. వారు సామాన్యముగ నీ మొక్కల నెండబెట్టి యటకపై నిల్వచేసికొని అవసరమైనపుడెల్ల పైపట్టను తడవలుగ దీసి, వీనిని కట్టు కుపయోగింతురు. వీనిలో నులకను, త్రాళ్ళను గూడ పేనుటయు గలదు.

8. గోగు సాగువలని ఆదాయ వ్యయములు:- ఒక యెకరమున తొలకరిని వర్షాధారమున సామాన్యపు నారగోగును సాగు చేయదగు విధానమును దానికగు వ్యయమును నందు వలన లభించు గుప్త నాదాయము నీక్రింద యంచినా వేయబడెను.

1 సామాన్యముగ మంటిగడ్డల నే యిందులకు పయోగింప, 000 కాని యివి కరెగి యాయురద మొక్కల కంటుకొనిమర మిలులలో నువ నార తేటుచెడును. పశ్చిమవంగరాష్ట్రములు)

* నారను దీయుటకు సామాన్యముగ చీకిన దీని తీసి క్రిందినుండి 1, 2 అడుగుల దూరముననుచి యెవనగరము. ఇచట కాండభాగములను యేజంటివ్యాపార మంచున్నారు. ఇచటనే నారను నందలి కాడ్లకట్టు శక్తియంత్రములను, చేయంత్రములును గూడ (15) సామాన్యముగ శక్తియంత్రముల సహాయమున గట్టబడు చేళ్లు

ఒక్కొక్కటి 400 పానులందును. 330 పానుల బేళ్ళను గట్టుటయు గలదు. చేయంత్రములతో గట్టు బేళ్ళు 125 పానులే యుండును.

నాంగోగు చేలనుండి యాకులను కోసికొని కూరకుపయోగించుట గలదు.

నారతీయగా మిగులుకర్రలు బీదలచే వంటకరుకు నుపయోగింపబడుచుండును. కన్నని కర్రలను తమలపాకు తోటలను పంచెల్లనీడను బెంచుచోట వానిపై నీడ కొరకు తడకలుగట్టి వరుచుట కుపయోగించుట గలదు.

5. జూటు

Jute-Corchorus capsularis and *C. olitorius*- N. O. Tiliaceae

(ఓడ్రము- కఫోట్, డఫాట్; బెంగాలీ- పట్, పట్టా; సం. - ఘాటః)

దీనికి సరియైన తెలుగుపేరు వ్యవహారమున లేదు. బంగాళాగోగు అని వ్యవహరించుటగలదు. కాని యిదిగోగు వలె ప్రత్తి కుటుంబములోనిది కాక పలాప్రత్తి కుటుంబమునకు చెందిన మరియొక జాతిమొక్క. కావున దీనిని 'జూటు' అని వ్యవహరించుటయే మంచిది. దీనివార యిప్పుడు ప్రపంచపు నారదినుసులలో చాల ప్రాముఖ్యతను వడసియున్నది.

2. చరిత్ర, వ్యాపకము:—జూటుమొక్క కాదమస్థానము ఇండియాలోని ఈశాన్యభాగములని యెంచబడుచున్నది. కొన్నిజాతులు యిప్పటికిని సా ప్రాంతములగు వన్యస్థితిలో గానవచ్చును. వంగ రాష్ట్రమున నీ సస్యము ప్రాచీన కాలమునుండియు సాగుచేయబడు చుండెను. నారమతీసి యుపయోగించుటయే కాక దీనియాకులుగూడ కూరకుపయోగింపబడుచున్నవి.

పాశ్చాత్యులచే నీ నారమొక్క యుపయోగము తొలుత 18 వ శతాబ్దాంతమున గుర్తించబడెను. 1791 వ సంవత్సరమున ఈస్టిండియా

కంపెనీ వారిచే మొట్టమొదట నీనార యింగ్లండున కగుమతిచేయ నారంభింపబడెను. 19 వ శతాబ్ద ప్రారంభమున నీ కంపెనీవారు 28 స్కాట్లాండ్ జాటు నారతో తమ కార్ఖానాలందు త్రాళ్లను పేనించికూడ పంపదొడగిరి. 19 వ శతాబ్ద మధ్యమునుండి యీ ముడి నార యెగుమతియు త్రాళ్లు వస్త్రా నారవస్తువులయొక్క ఎగుమతియు క్రమముగ హెచ్చుసాగెను. ఇందుచే 1872 వ సంవత్సరము నాటికి స్వయపుసాగు వంగ రాష్ట్రమున 9 లక్షల యెకరములకు మించెను. 1921 వ సంవత్సరము నాటికి దీనిసాగు ఇండియా మొత్తముపై 15 లక్షల యెకరములపై జరుగుచుండెను. గతసంక్రామమునాటికి (1939 లో) దీనిసాగు సుమారు 31 లక్షల యెకరములకు పైబడియుండెను.

జాటు చీనాలో కొన్నిచోట్ల కూడ చిర కాలము నుండి సాగునందుండెను. ఇచీవల ఆమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములందును ఈజిప్టులోను కూడ దీని సాగునకై యత్నములు జరిగెను. కాని ఇండియాలో తప్ప తక్కిన దేశము లందెచ్చటగాని దీని సాగు విస్తరింపలేదు ఇండియా యే ప్రపంచమున కంతటికిని చాలవరకీ నారను స్థలము చేయుచున్నది.

ఇండియాలో నైనను జాటుసాగు ఒక వంగ రాష్ట్రమునందే హెచ్చుగ నున్నది. పరిసర రాష్ట్రములందుకూడ స్వల్పముగ సాగునందున్నది. 1940-41 సంవత్సరమునను 1945-46 లోను ఆయా రాష్ట్రములందలి జాటుసాగు విస్తీర్ణము లీ క్రింద తెలుపబడెను.

రాష్ట్రము	విస్తీర్ణము (ఎకరములు)	
	1940-41	1945-46
వంగరాష్ట్రము (పశ్చిమ భాగము)	577,000	204,000
" (పూర్వ భాగము)	4409,000	1855,000
అస్సాము	309,000	155,000
బీహారు	252,000	159,000
హచ్ బీహారు	45,000	20,000
ఒరిస్సా	29,000	2,000
త్రిపురా	18,000	10,000
	56,69,000	24,22,000

జాటు సాగు గత సంగ్రామం ప్రారంభించిన వెనుక అనగా 1940-41 న సం॥ న ఉచ్చస్థితి యందుండెను. అనంతరమున దీని విస్తీర్ణము దాదాపు 57 లక్షల యెకరములందెను. అంతకు ముందు సంవత్సరము లందెపుడు గాని దీనివిస్తీర్ణము 32 లక్షల యెకరములకు మించి యుండలేదు. 1940-41 తరువాత మరల దీని విస్తీర్ణము క్రమక్రమముగ తగ్గిపోయి 1945-48 వాటికి 24 లక్షల యెకరములకు తగ్గిపోయెను.

ఇండియాలోని మొత్తపు జాటుసాగు విస్తీర్ణమే యిటు తగ్గిపోవుట కాక ఈ సస్యము విరివిగ సాగుచేయబడు విస్తీర్ణమున ముప్పాతిక భాగము తూర్పుపాకిస్తాన్ (తూర్పుబెంగాల్)లో జేరి పోయెను. కాని జాబ్ మిల్లులున్న ప్రాంతములు ఇండియాలోనే అనగా పశ్చిమబెంగాల్ లో జేరిన కలకత్తా పరిసరములందున్నవి. ఇటుత్పత్తియగు ప్రదేశము చాలవరకు 27 వ పటము పాకిస్తాన్ లోజేరి, అది వినియోగపడు ప్రదేశము



ఇండియాలోనే యుండిపోవుటచే నిందకి మిల్లుల కింగుత్పత్తియగు జాబ్ చాలకపోవుట తటస్థించెను. కావున నీ సస్యపు సాగును హెచ్చించుటకు పశ్చిమ బెంగాల్ లోనూ, ఇతర చోట్లను హెచ్చుకృషి గావింపబడుచున్నది.

3. జాటుమొక్క లక్షణములు:-

జాటు మొక్కలలో పెక్కుజాతులు గుర్తింపబడుచున్నవి. కానియందు క్రింద పేర్కొనబడిన రెండుమాత్రమే సాగునందున్నవి. ఇందును మొదటిదీ (C. capsularis) ముఖ్యముగ మధ్యగూర్పుభాగములందు రెండవదాని కంటె హెచ్చుగ సాగుచేయబడుచున్నది. ఇది

జాటు మొక్క (లేతది) యచట సిరాజ్ గంజ్ పట్ అని వ్యవహరింప

బడుచున్నది. రెండవది (C. Olitorius)* దక్షిణ ప్రాంతము లందు కొంతవరకు సాగునందున్నది. ఇది డేజీపట్ అని వ్యవహరింప బడుచున్నది.

28 వ పటము ఆనుకూల పరిస్థితులలో జాటుమొక్క 8 - 15 అడుగులవరకు పెరుగు ఏకవార్షికజాతి. ఆకులొంటరి చేరిక నమరి యుండును. లఘుపత్రములు. బాణా కృత్రిని నిడివిగనుండును. అంచులు రంపగరిజీలియుం డును. పూవులు పసిమివర్ణముగలిగి చిన్నవిగనుండును. పుష్పకోశము పై భాగమున నైదుగ జీలియుండును. ఆ కర్మక పత్రములైదు. కింజల్కములనేకములు. అండకోశము 5 గదులు గలిగియుండును. బీజాండము

జాటు ఆకు లనేకములు. కాయలు సిరాజ్ గంజ్ పట్లో (పూతకొమ్మనుండి) $\frac{1}{2}$ గుండ్రదేరి $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ అం. పొడవుండును. డేజీపట్ కాయలు సన్నముగను 2-3 అం. పొడవును నుండును. ఇదియే యీ రెండు జాతులకును గల ముఖ్యభేదము.

4. జాటున కనుకూలమగు పరిస్థితులు; సాగు విధానములు:- వర్షము కొంత హెచ్చుగ గురిసి వాతావరణమున నార్ద్రత హెచ్చుగ నుండు ఉష్ణప్రదేశములును బలమైన వండలి నేల లును నీసస్యమున కనుకూలములు. వంగరాష్ట్రమున నిది సామాన్యముగ

* అంధ్రప్రదేశమున షేరింట లేక కొండమరెప అని వ్యవహరింప బడు నొకజాతి (C. fascicularis) వన్యముగ బెరుగుచున్నది. ఈ మొక్కలను గోసి యొండించి యాకులరాలిన పిమ్మట నా కంపతో పోలి కట్టలను గట్టుదురు. ఇది యీపనికి కంది వగైరా కంపకంటె శ్రేష్ఠముగ నెంచబడుచున్నది.

29వ పటము

జాటు కాయలు

A. గుండ్రకము

(పూర్ణాకృతి)



B. కొలరకము

(పూర్ణాకృతి)



మార్చి-ఏప్రిల్ లో విత్తబడు చుండును. అచట నీ కాలమునందును తరువాత తొలకరించు వరకును గూడ వేసి వర్షములు తగినంతగా గురియును. ఇట్టి పరిస్థితులు వంగరాష్ట్రము లందును కొన్ని పరిసర ప్రాంతము లందును మాత్రమే లభ్యమగుటచే దీని సాగు చిరకాలము నుండియు నా ప్రాంతము లందే జరుగుచుండెను. ఈ కృత్తి ప్రారంభమున గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి డెల్టాలలో కాల్య నీటి సహాయమున నీసాగు చేయుటకు చేయబడినకృషి విఫల మగుటకు వంగరాష్ట్ర పరిస్థితు లిందమరక పోవు టయే గారని మన చెప్పదగును. ఇటీవల తిరువా న్కూరు రాష్ట్రమున కొన్నిచోట్ల నిట్టి పరిస్థితు లమరియుండుటచే నచట జాటు సాగు జయప్రద మగుట కవకాశము గలదని కనిపెట్ట బడెను.

వంగరాష్ట్రమున మెరకగ నుండు తేలిక నేలలందు జాటును, మెట్టవరి, చెరుకు, బంగాళా దుంప వగైరాలతో మార్చి పెట్టుదురు. మెరకగ నుండు జిగురు నేలలందు మొక్కజొన్న, చెరుకు, ప్రత్తి, మెట్టవరులతో మార్చి పెట్టుదురు. జిగురుగనుండు పల్లపు నేలలలో నీసస్యము మొక్క జొన్న, చెరుకు, నారజనుము, వరి మొదలగు వానితో మార్చి సాగుచేయు బడుచుండును. పల్లపు నేలలలో మార్చి - ఏప్రిల్ లోను మెరక నేలలలో ఏప్రిల్ - మే నెలలలోను విత్తి సాగుచేసి దీని తరు వాత కాయధాన్యములు, సీమయవిసె మొదలగు పయర సస్యములను సాగుచేయు చుండురు.

నేలను బాగుగ దున్ని సత్తవ చాలని భూము లకు తగినంత పసువులయెరువును వేసి విత్తులను సామాన్యముగ వెదజల్లుదురు. 9 అంగుళముల

దూరముగల వరులలో గొర్రుతో వేయుటయు గలదు. ఒకటి రెండు సార్లు గొప్పత్రవ్వ లేక అంతరక్రమించేసి కలుపు తీయుదురు. సామాన్యముగ మొక్కలను మొదటికి గోసే గోగు మొక్కలవలెనే ముందుకొంచె మారనిచ్చి కట్టలుగట్టి కొన్ని రోజులు నిలుపుగను పిమ్మట కొన్ని రోజులు పరువుగను ఊరనిచ్చి యటై వారిను దీయుదురు. ఎకరమునకు 12 - 15 మణుగుల నార దిగుబడియగును. దీనికి గోగునారకంటె హెచ్చుధర వచ్చుటచే నీ సవ్యపుసాగు వలన హెచ్చు నికరాదాయము వచ్చును. ఇటీవల దీని ధర మిగుల హెచ్చుటచే దీనిసాగు కర్షకులకు మరింత లాభకరముగ నున్నది.

3. జూటునార యుపయోగము, ఉత్పత్తి, వ్యాపారము :— వంగ రాష్ట్రమునందును పరిసరములందును చిరికాలమునుండి యీ నారతో వేసిన లేక వడికిన పురి లేక దారముతో గోనె గుడ్డలను సంచులను తయారుచేయు గృహపరిశ్రమ మిగుల వ్యాప్తముగ నుండెను. ఈ పనికి గోగు, జనపనాగలికింటి యీ నార సామ్యముకూడెను. ఈ గుడ్డల నారలతో వేసిన దావికంటె మృదువుగను, సాఫల్యమునందును. కాని గట్టిదనమున వానికి సాటిరాదు. ఈ నారతో గుడ్డలను, సంచులను నేయబడుటయెగాక దారమును, ప్రాశును, నెంకులను, నడుముపటకాలును, ఎడ్లు వస్త్రా ల జంతువులపై వేసే రుకులను నొయించు గంతులను లేక వలసంచులను, పిల్లలనూగించు యుయ్యెలలను, ఉట్లను, నేలపై పరచు బరకముల వస్త్రాలును, ఇంకననేక ఉపకరణములను తయారు చేయబడుచుండెను. వ్యవసాయమునకు దోడుగ నీ గృహపరిశ్రమలు చాల ముండిరి పనిగల్గించుచుండెను. కాని 19 వ శతాబ్దపు న్యతీయభాగమున బ్రిటిషదీవులందు ముఖ్యముగా స్కాట్లాండు లేశమునందలి డండీ ప్రాంతములందును, ఈ లేశమున కలకత్తా ప్రాంతములందును † నారమిల్లు పరిశ్రమ విస్తంభించుటవలన నీచేతేపరిశ్రమలు క్రిమముగ నెనుకబడెను. ఇప్పుడీ లేశమున నాడబడు గోనెసంచులగాని గుడ్డలుగాని విదేశముల కగుమతిచేయబడు సంచులు, గుడ్డలుగాని చాలవరకు ఇంగ్లండులో దయారు

† తొలిమిల్లు 1854 వ సం॥ న నెలకొల్పబడెను.

చేయబడునట్లే. ఇటు సంచలను, గుడ్డలను దయ రుచేయుట కుపయోగింపబడు జాటునారకాక చాల నారయ్యెనుగాడ యెరుమతి చేయబడుచున్నది.

1938-39 సం॥ నాటికీదేశమున మొత్తపు జాట్ నార యుత్పత్తి 83 లక్షల బేళ్ళుండెను. ఇందునుమారు 70 లక్షలబేళ్ళు వంగరాష్ట్రమున యుత్పత్తియైనవే. 1945-46 సం॥ న మొత్తపు ఉత్పత్తి 78 లక్షల బేళ్ళకు తగ్గిపోయెను. వంగరాష్ట్రమున జాట్ ఉత్పత్తియగు ప్రదేశము చాల భాగముతూర్పుపాకిస్తాన్ లోచేరిపోవుటచే నిండియాలో నుత్పత్తియగు జాట్ 15 లక్షలబేళ్ళకు తగ్గిపోయెను. ఇందువలన సిడివరలో వేలుపబడినట్లు కలకత్తా ప్రాంతముందుగల నారమిల్లలకు తగినంత జాట్ లభ్యము కాకపోవుచున్నది.


ఇట్లుత్పత్తియగు నారలో చాల భాగ మిపు డీదేశపు మిల్లలంచె వినియోగపడి తయారగు సంచలను, గుడ్డలను హెచ్చుగ నెగుమతి యగుచున్నది. కొంత భాగము నారరూపమున గూడ యెరుమతి యగుచున్నది. సుమారు 20వ వంతు (5 లక్షల బేళ్ళు) చేతి పరిశ్రమలకును నితరస్థానికావసరములకును వినియోగపడుచున్నదని యంచినా చేయబడెను.

6. నారనొసగు నితర యేకవార్షిక సస్యములు

(1) నీమయవిసె:- *Flax-Linum usitatissimum*.
N. O. Lineaceae (హిం-మసి నీ, ఆ-ఆవి, క-అలసి, సం.క్షుమా):-
ఉత్తర హిందూస్థానమున చ ము రు దినుసుగ హెచ్చుగ సాగుచేయబడుచుండు నీ సస్యమునుండి కొంతవరకు నార ను దీయుటయు గలదు.

రహ్యలోను, మరియు ని ప్రశోములంగును నిది ప్రధానముగ నారణిగకే సాగుచేయబడుచున్నది. ఈ వానితో తయారుచేయ

30 వ పటము



A. పీచుయవినె రమ్మ (పూవులతో) $\frac{1}{2}$

B. పూవులు — కుడివైపున కింజల్కమును అండాశయములు మాత్రమే చూపబడినవి. $\times 2$

C. కాయ (పూర్ణకృతి)

D. గింజలు. $\times 4$

బడు గుడ్డ వస్త్రాలు లినెన్ (Linen) గుడ్డలనబడును. ఇవి గోనెగుడ్డల కంటె స్వేచ్ఛముగను, మృగువుగను నుండును. విరోపాఖండమున నూలు గుడ్డలనేతయు, ఉపయోగమును ప్రబలకమును పీచుయవినెనార గుడ్డలే విరివిగ వాడబడుచుండెను. ఈ సస్యమును చమురుదీనుసుగ సాగుచేయ బడుట చమురుదీయుట మొదలగు విషయములను గెరించి 'చమురు దీనుసులు' అను సంపుటమున విపులముగ తెలుపబడెను.

నారకొంతు ప్రధానముగ సాగుచేయుచోట దీనిని గింజలపంటకు కంటే నొత్తుగ జలుగురు. కాని సామాన్యముగ నిట్టి పంటనుండి కూడ విత్తులను దీసికొనియే దంటునుండి నారదీయుదురు. పశువులచే ద్రొక్కించినచో దంటు నలిగి తెగిపోవును గావున యంత్రసహాయమున కాయలను దూసివేయుదురు. కాని యీ నారను దీయుట జనప గోగునారలను దీయుటకంటే సున్నితమైనపని. రష్యా వనైరాలంగు దీని నూరవేయుటకు ప్రత్యేకపు తొట్ల నేర్పాటుచేసి పరిశుద్ధమైన నీటియంగు (దీని నూర తెచ్చి యంత్రసహాయమున నారను లోని పుండు విడదీయుదురు. కిమ్మట నీ నారను దువ్వి పీచు(Tow)ను విడదీయుదురు. ట్లు తయారుచేయబడు నార చాలా పరిశుద్ధముగ నుండును.

ఇండియాలో దీయబడు నార, యింత పరిశుద్ధముగ గాని, పను గణ్యతగలదిగ గాని యుండదు. కావున నిది యెగుమతికి బనికిరాదు. ఎగుమతి చేసినను దీనికి రష్యా వనైరాలలోని నాగకంటే చాలతక్కువ ధర (సుమారు సగము) వచ్చును. కావున నీ నార చాలవరకీ భేశముననే త్రాళ్లు వనైరాలకు పయోగింపబడు చున్నది.

దీహరుద్భావ్యమున నొకప్పుడు నీలిపరిశ్రమను నెలకొల్పిన పాశ్చాత్య కర్షకులు (Planters) నీలితోపాటు కీమయిన నైన గూడబెంచి, నార నెగుమతిచేయుటకు యన్నించిరి. కాని వారియుద్యమముంతగా కొనసాగ లేదు.

ఉత్తరహిందూస్థానమున సామాన్యముగ నొకయొకరమున సుమారు 40 మణుగుల దంటును, దానినుండి $4\frac{1}{2}$ మణుగుల నారయు $1\frac{1}{2}$ మణుగుల పేరును లభించునని యంచనావేయబడెను. అనగా దంటుసూనికపై నీరెంటి తూనికయు గూటికి 15 వంతులుండును. ఇదికాక సుమారు 8 మణుగుల విత్తులకూడ కావచ్చును.

(౨) గంజానార (Hemp-Cannabis sativa-N. O. Cannabinaceae):- ఇండియాలో ప్రభుత్వపు ఆజూయిషీక్రింద

కొన్నిచోట నీనార నూరవేయు నీటికి అవిరిమూలమున కొంత వేడి మిక్కించి, యీ వేడిమియంగు చెచ్చు తగ్గులలేకుండ జారురు.

భంగువైరా మత్తుద్రవ్యముల కొరకు సగిల్పముగ సాగుచేయబడుచుండు నీ మొక్కల కాడలనుండిగూడ నారనీయబడి యుపయోగింపగుచుండును. గింజాయి సాగుపై ప్రభుత్వ ఆజమాయిషీ లేక హిచ్చుగినుండిన

31 వ పటము



కాలమున నీనా కొంతవరకు విశోపాఖండమున కగుమతియగుచుండును. కాని యిప్పుడిది రష్యాలోను, కొన్ని విశోపీయ దేశములందుచు మాత్రమే నారకొరకు సాగుచేయబడుచున్నది. ఈ నార పోటీపలననే యీదేశపు జనపనార యొగమతి చాలవరకు తగ్గిపోయెను.

ఈ నార జనపనారవలెనే దారము, పురికొనరాళ్ళు, గోగెలు వనైరాలకుపయోగింపబడుచుండును.

మత్తుద్రవ్యముల కొరకు దీనిసాగును గూర్చి 'సంభారములు తోయోవధులు' అను

గంజాతకు ౧ సంపుటమున కొంత తెలుపబడెను.

పచ్చియెరువు కొరకు బెంచబడు చీలుగ (Daincha) మొక్కలు సకాలమున నుపయోగపడక మరీపోయినపుడు వాని కాడలనుండియు, విత్తుల కొరకు బెంచబడు మొక్కలనుండియు గోగు మొక్కలనువలె నూరవేసి నారను దీయుట కలగు. ఎండిన మొక్కలనుండి కత్తుల తీరిక కాలమందు గోగు మొక్కలనుండివలె తడవలను తీసి యుపయోగించుకొనుటయు గలదు.

కూరిగాయల కొరకు బెంచబడు బెండ మొక్కలనుకూడ 'నీటిలో నూరవేసి గోగు మొక్కలనుండివలె నారను దీసి యుపయోగించుట కలగు. కాని యీ మొక్కలు పలుచగ నాటి పెంచబడుటచే నార సాపుగ నుండదు.

పశ్యముగ బెరుగు తుత్తురవెండ (Abutilon indicum) మొక్కలనుండిగూడ యిట్లే నారను దీయవచ్చును.


7. కాండపు పట్టనుండి నారతీయదగు

బహువార్షిక జాతులు

(౧) రియా (Rhea Boehmeria tenacissima-N.O.

Urticaceae)- రామినారి (Ramie fibre) అనుపేరుతో కొన్ని
దేశములందు - ముఖ్యముగ చీనాదేశమున - విరివిగ నుత్పత్తి చేయబడు
చున్న జిగియైననారి యీ బహువార్షిక గుల్మపు కాండపట్టనుండి తీయబడు
చున్నది. రియాతుప్ప లీదేశమున అస్సాములో పవ్యముగ బెరుగుచున్నది.

32 వ పటము



కొంతవరక చట నీతుప్పలు ప్రత్యేక
ముగ బెంచబడి యీ నారి స్థానిక
ముగ వలలు మొదలగునానికుపయో
గింపబడుచున్నది. వీనిని బెంచుటకు
6-9 అం. పొడవుగల కాండఖండ
ములనుగాని, వేరుపట్టిన పిల్లలను
గాని 3-4 అ. యెడముగల వరుసలో
12-15 అం. దూరమున వరకాల
మున నాటదగును. ఖండములను నా
టుచో వీనిని సుమారు 3 అం. లోతున
సాగిల వేసి కప్పవలెను కొన్నిచోట్ల
ఎకరమునకు 12,000 ఖండముల
వరకు నాటుదురు. మరుచటి సంవ
త్సరపు తొలకరిననుండియు కర్రలను
3 నెలల కొకసారికోసి నారనుదీయ
వీలగును. వీనినుండి నారనుదీయుట
యితర నారిలను దీయుటకంటె

రియా మొక్క $\frac{1}{10}$ చాలకష్టము. త్రింకాయాకులను రాల్చి
వేసిన నిడివియైన జివ్వలను క్రిందికిగోసి నీటిలో నూరవేసి వానినుండి

1) వీనికచట 'కంకురా' యని పేరు.

పట్టను తడవలగదీయుదురు. ఇంతకునుండు వీని పైపొరను గోకివేయుటయు గలదు. ఊర పేయకుండ కొన్నాళ్లు మంచులో నుండనిచ్చి తడవలను దీయుటయుగలదు. తీసిన యీ తడవలను మరల కొంతకాల మూరనిచ్చి యప్పుడు వానినినుసిమి నారనుదీసి యెండబెట్టుదురు. వీనిని పసుపు కలిపిన నీటిలోగాని, బియ్యపుగంజిలోగాని చాకిరి సోడాకలిపిన నీటిలోగాని యుడకి వేట్టుటయుగలదు. ఈవిధముగ సామాన్యముగ కాడల తూనికపై నూటికి 2 వంతులు నారమాత్రమువచ్చును. ఎకరమునకు 7-8 మణుగుల నారయగును. కొన్నిపనులకు తడవలపై యుపయోగింపబడుచుండును.

చీనాగడ్డి (China Grass) యనబడు మరియొకజాతి రియా (B. Nivea) మొక్కలు చీనాలో విరివిగ బెంచబడి వానినుండి తీయబడు నార యనేకపనులకుపయోగింపబడుచున్నది. ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండములందు కొన్నిచోట్లను, అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములందును చీనాతి తోటలు వందల కొలది యెకరములపై బెంచబడి శక్తియంత్రముల సహాయముతో నారతీసి యెగుమతి చేయబడుచున్నది. ఒక్కొక్క యంత్రమునకు సనిగలిగించుటకు అధమము 500 యెకరములైనను నొకచోట పెంచవలెను. పచ్చికరైల తూనికపై నూటికి 3-5% నారచొప్పున నెకరమునకు సాలునకు 8-10 మణుగుల నార దిగుబడియగును. అనుకూల పరిస్థితులలో నింకను హెచ్చుగ నగుటయు గలదు. వర్షము తగివంత తురిసి సంవత్సరము పొడవునను వాయువును నేలయు తగినంత తేమగలిగియుండు ప్రదేశము లీతుప్పల పెంపకమునకనుకూలములు. కాని నేలయివక చేయకుండుటకు తగినవాటమును తగినంత సత్తువయు గలిగియుండవలెను.

ఇండియాలోగూడ నీతోటలను విరివిగనాటి యంత్రములతో నారను దీసి యెగుమతిచేయుటకు కొన్ని యత్నములు జరిగెను గాని యెచటను జయము గాంచలేదు.

(౨) జిల్లేవు :— ఈ కాయలనుండి యొకవిధమగు దూది లభించునని యివివరలో చెలుపబడెను. జిల్లేడు కాడల నూరవేసి పట్టనుండి నారనుగూడ దీయవచ్చును. ఈనార తక్కిన నారలన్నిటికంటెను

జగిలిగి పట్టవలె మృగువుగ నుండును. చేపలనుబట్టి గాలపుత్రాశ్లాను పేనుకొనుటకును వలలకును తరుమగ నుపయోగింపబడుచుండును. నీటిలో నానినను నీత్రాశ్లాంత శీఘ్రముగ చీకపోక హిచ్చుకాలమునున్నను. పచ్చి కర్రల తూనికపై నూటికి సుమారు 2½ వంతుల నారవచ్చును. కర్రల నూరవేయకుండ నారను దీయుటకలగు. ఇందులో జీవ్యలను మూరచెసి ముక్కలుగగోని 2,3 రోజులెండలో నా ర నిచ్చి నానబెట్టుకుండగనే సమ్మెటతో నలుగగొట్టి నా రనుదీసి దానినంటియుండు యితరభాగములను తొలగించి పుద్గపరచురు. దీనితో నట్లే పురిని త్రాశ్లాను పేనుచురు.

(3) మొ గ లి (Screw - pine - Pandanus oderatissimus - N. O. Pandanaceae సం-కేతకీ) :— ఈ పొదల ప్రకాండమునుండి పుట్టి నేలలోనికిడిగు సాఫయినయూడలనుండి కూడ నారదీయబడి నులకగ పేని విక్రయింపబడుచుండును.

అడవులందు స్వతస్సిద్ధముగ పెరుగు ఆరె (Bauhinia spicata) సోనింత (Sesbania aegyptica) వగైరా చెట్ల సాఫై న కొమ్మలనుండి కూడ నారను స్వల్పముగదీసి యుపయోగించుటకలగు.

నార ప్రత్యేకముగ తియబడకపోయినను అడ (Bauhinia vahli) తీగలనలైకాని లావుగనున్నచో చీల్చినాని, ఈ యా కులను ఇతర సరకులను కట్టలుగట్టుట కుపయోగింతురు. సన్నముగను, చాలగట్టి గను సాఫగనునుండు ఒకజాతి పాలకాడ (Ipomoea sp.) కూడ తరుమగ చీల్చబడకనే కట్టకుపయోగింపబడుచుండును.

8. కిత్తనార

American aloe - Agave americana -
N. O. Amaryllidaceae

హిందూ-బిలాయితీ కియా, కావా; అ-కట్టాజై

అమెరికాఖండపు టుష్ణభాగములనుండి ప్రవేశపెట్ట దేశమున తోటలయూవరణలకై కట్టవలమీద

తరుచునాటి పెంచబడు నీ కిత్తనారమట్టల (ఆకుల) నుండి తీయబడు నార జిగిగలిగి త్రాళ్లు గోనలు వస్త్రాల కుపయోగింపబడుచున్నది. దీనిని కొన్నిచోట్ల ప్రత్యేకముగ తోటలుగ వేసి పెంచుటయు యంత్రసహాయమున నారను విరివిగదీసి యెగుమతి చేయుటయుగలదు.

2. కిత్తనార మొక్క లక్షణములు, యీ గణము నందలి యితర నారజాతులు:—బాగుగ పెరిగిన కిత్తనారమొక్క

4-5 వ పటము



3-5 అడుగుల పొడవును మధ్య 4-5 అం. వెడల్పును గలిగి దళముగనుండు మట్టలను (ఆకులను) గలిగి యెదుగు బహు వారిక ఏక బీజక గుల్మము. మట్టలయంచులను, కొనలందును వాడియైన నుండుండును. ఈ యాకులన్నియు ననాస మొక్కయందు వలె క్రింగిననుండి గుబురుగ బయలుదేరును. ఎదిగినకొలదిని దానియందువలెనే పిల్లలు పుట్టి గుబురుగా పెరుగును. నల్పుయిట్లు సుమారు 12-15 సంవత్సరములెదుగునరీ తల్లి మొక్క మట్టలనెదుమ 10-25 అ. యెత్తునెదెరుగు పొడి స్థలమువంటి లావు పాటి వృంతముగల పెద్ద పువ్వు గుచ్చుము

కిత్తనార మొక్క $\frac{1}{40}$ శయలుదేరును. ఇంతటితో నీ తల్లి మొక్క పెరకువనించి క్రమముగ చచ్చును. పిల్కలు విజృంభించి యట్లే మరికొంతకాలమునకు గెలవేయును.

కిత్తనార గెలయనేక కాళులును, ఉపకాళులును గలిగి బూవులను విస్తారముగ బూయును. ఇందలి పువ్వునిచోళము రికేకులు గలిగియుండును. ఉచ్చము. కింజల్కములారు. గర్భకోశము మూడరలు గలిగియుండును. బీజాండము లనేకములు. కాయనిడివిగ నుండును గింజలనేకములు.

గలందులూ పూవులకు దోడుగగాని వానికి బదులుగగాని, చిరు మొగ్గలు (Bulbils) బయటచేరుటకలదు. ఇవి రాలి వేరుపట్టి మొక్కలగుచుండును.


కీత్తనారకమునందు మట్టలనుండి నారతీయవీలగు మరికొన్నిజాతులు గూడ కలవు. అంగుముఖ్యమగునవి కొన్ని యీ క్రింద పేర్కొనబడును.

(౧) నిలువుటాకుల కీత్తనార (A. rigida var. longifolia) :— దీనిమట్టలుకూడ సామాన్యపు కీత్తనారమట్టలవలెనే కానను అంచులనుగూడ ముందుగలిగియుండును. కాని యంతకంటె తక్కువ పెడల్పుగనుండి యంతగా నంగక నిక్కబాడుచుకొనియుండును. వీనినుండి తీయబడునార పైజాతి నారకంటె తక్కువమగుగగనుండును.

(౨) బొంబాయి కీత్తనార (A. vivipara) :— దీని మట్టలు కొనలందుమాత్రమే ములుగలిగియుండును. దీని నారయు నంత ముదురగలేక ధన్యమైనదిగ నుండును. దీనిగలయందు చిరు మొగ్గలు హెచ్చు బయటచేరును.

(౩) యుకటాన్ లేక సిసల్ కీత్తనార (Sisal hemp - A. sisalana) :— దీనిమట్టలును పైజాతిలోవలెనే కొననుమాత్రమే ములుగలిగి పైజాతులన్నిటికంటెను గణ్యమగునార వోసగును.

34 వ పటము



యుకటాన్ లేక

సిసల్ కీత్తనార 46

3. కీత్తనారను సాగుచేయదగు పరి

స్థితులు, తోటలను బెంచువిధము:- కీత్తనార మొక్క పెరుగుటకు వర్షమంతగా గురియని యుష్ణ ప్రదేశములను కూలములు. ఈ మొక్కలు నేలయందు పడును మిగుల తక్కువగనున్నను వరిలగలవు. కాని హెచ్చైన చోట శుష్క క్రొత్త చచ్చును. కావుననే వీనిని అవరణకొరకు పెంచునపుడు ప్రదేశమునకు మట్టను కొద్దిగొప్ప యెత్తైన కొరడినివేసి దానిపై త్రిప్పెనాటుదురు. తోటలకు నాటునపుడైనను కొద్దిగొప్పయెత్తైనగట్ల వేర్పరచి వానిపైననే నాటదగును.

వర్షముమిగుల దక్కువగురియు ప్రదేశములందలి జనురలేని యెర్ర నేలలు వీనికినుకూలములు. క్రింద కంకరపారదగ్గరనున్నను పెబ్బరి లేదు. ఈగోటల వర్షముమిగుల తక్కువగునుండు ప్రదేశములందు సుంధముగబెరిగినను నారను దీయుటకు వలయునంత నీటివసతిమాత్ర ముండవలెను. సామాన్య స్యములకుగాని, ఫలజాతులకుగాని బనికీరానిబంజరునేల అధమును 500-1000 యెకరములొకేచోట లభించుచోట, నారనుదీయుటకు దగినయంత్ర సామాగ్రికలకర్మాగారమును పెరికొల్పగలిగిననే కాని, కీర్తనారను విరివియుగుగోటలందు నారకొనికు బ్రత్యేకముగ బెంచుట లాభికరముగ నుండదు.

సామాన్యముగ పిల్కలను నాటియే కీర్తనారకొరకు పెంచబడుచుండును. విరివియుగుదోటల బెంచుటకు తగిన పిల్కలు అదివరలో నీతోటలుగల ప్రదేశములంద గాని లభింపవు. క్రొత్తచోట ముంగు దొంగినంతవరకు పిల్కలను సంపాదించి కొంత విస్తీర్ణమును నాటి క్రమముగ వీనిపిల్కలను తక్కిన విస్తీర్ణమున నాటుచుండవలసియుండును. గోటలచేయ నారంభింపకముందు కట్ట వలనవగైరాలలో మొక్కలువేసిన గెలలంగు బయలుదేరు చిరుపిల్కల (Bulbils) ను విరివిగ సంపాదించి నారదుళ్ళలోనాటి యచట నవి 2-3 సగాలు పెరిగిన వెనుకతోటనువేయ నారంభించదగును. ఇట్లే విత్తులను జలికూడ నారును పెంచవచ్చును. కానిమరియొక సంవత్సర మాల్యముగను.

నోట దలచునేలను నుండుగ తుప్పలు వగైరాలను వరకి వెండు తీసి, పుట్టలు వగైరాలను సాధ్యమైనంతవరకు త్రవ్వి చదునుచేయవలెను. తొలకరించిన పిమ్మట యిసుపనాగల్గినో తొమ్మిదేని అడుగులదూరమున రెండేని యడుగుల వెడల్పున లోతుగదున్ని పెద్దరక్కరేకు నాగటిని

వర్ష మెప్పుడైన హెచ్చుగ గురియుచో నేల కొరివయబడకుండ నదనపు నీరు పోవుటకు దగిన దిగుబాటు కాలవలనుగూడ నిపుడే యేర్పాటుచే గవలసి యుండును. వీనిలో నచటచట రాళ్ళను కేర్చి పొలు రీటికట్టల (Over-flow dams) నేర్పరచవలెను. ౧౦౫౫

వారి యీ ప్రజేకమునందలి మన్నుమధ్య నొక గట్టుగానేగ్విడునట్లుచేసికొని యీ గట్టుపై పిల్లలను లేక నారును ౪ అ. దూరమున నాటదగను. ఇట్లు చేయుచో నెక గమునకు ౪40 పిల్లలు పట్టును పిల్లల యడుగున నుండు ప్రాతయూకులను రెండు మూడింటిని దీసివేసి గట్టుమీద అవి వ్రాలి పోకుండుటకు వలయునంత మాత్రపులోతుననే నాటదగను. సెమ్మి లోళ్లు నాటిన బ్రాతుకుట కష్టము. పిమ్మట మధ్యమధ్య మరలబయలుదేరు తుప్పలను త్రవ్వి తీసివేయుచుండుటయు గట్టు వర్తముచే గొర్రెగరిన లేక తెగిపోయినచోట నురిల నెగ వేయుచుండుటయు తప్ప తొలిసంవత్సరమున లేయగలసిన పనియే యుండదు.

ఈ రెండవ సంవత్సరమున తొలకరించిన వెనుక నప్పటికచటనైన మొక్కలు చచ్చినచో నా బాల్లను మరల పుష్టియైన పిల్లలను నాటి భర్తీ చేయవలెను. పిమ్మట నాగవ సంవత్సరమువరకు నంగు పెరుగు తుప్పలను అప్పుడప్పుడు తీసివేయుచుండుటయు పశువులు తిరుగకుండ చూచుచుండుటయు తప్ప చేయదగిన పనియేమియు నుండదు.

మీ సం.నుండి మట్టలనుగోసి నాగను దీయ నారంభింపవచ్చును. ఈలోపలనే నిండులకువలయు నీటివనలిని గల్పించి, తగిన యంత్ర సామగ్రిని నెలకొల్పవలెను. అటు పిమ్మట నేటిట నెకరమునకు సుమారు 20,000 ల మట్టలచొప్పున గోసి కర్మాగారమునకు గొనిపోవుచుండవచ్చును.

కర్మాగారమున నారనుదీగంగా మిగులు చెత్తనెదారములన్నిటిని పోటలో వరుసలమధ్యపరచి, యవిచీకిన వెనుక వానిని మరుసటిసంవత్సరము గట్టుకొనవేయుమంటిలో చేరువట్ల జేయవలెను.

ఈ గట్టు నేలయొక్క వాటమునకడ్డముగా నుండవలెను.

ఈ యంత్రములలో అనిరి లేక యిరిగికి యంత్రములచే ద్రిప్పబడుచుండు పెక్కు ద్రవ్యముల (Drums)పై నమర్చబడియుండు గరిగల కత్తులచే వానిక్రింద బల్లపైనుండి కరికించబడు మట్టలందలి నార నంటి యందు యితర కణసంచాకులు (Tissues) గోకివేయబడును.

ఏదన సంవత్సరమున తొలకరిని గట్టనగ చేసిన వెనుక ప్రతి రంజేసిదుబ్బులనుధ్యను చొకపిల్ల చొప్పున మరల నాటవలెను. ఈ మొక్కలనుండి మరియారేండ్లలో మట్టనుగోయ నారంభించ వీలగును. ప్రాతరుబ్బులను క్రమముగ దీసివేసి పైని తెలుపబడినట్లు నేలయొక్క సత్తువను కాపాడుచో 25-30 సంవత్సరములవరకు గోటను లాభకరముగ బెంచవచ్చును. ఈలోపుగ నాకేండ్లముందుగ నే ప్రాతరునలవిధ్య క్రాత గట్టనేర్పరచి వానిపై మరల పిల్లలను నాటదగును. ఇట్లుచేయుచో యంత్రసామగ్రిని మరి మొకచోటికి కదుపనక్కరలేకయే పనిసాగు నుండును.

ఒకయొకరమున నుత్పత్తియగు 20,000 మట్టలును సుమారు 13-14 టన్నుల బరువుండవచ్చును. వీనినుండి యంత్రసహాయమున నాగనుదీయు చో 40 టన్నులకొకటన్ను (2½%) నాగ దిగుబడియగును. 1000 యొక రములగోటనుండి రీ వ సంవత్సరమునుండి యేటేట 325-350 టన్నుల నాగ దిగుబడియగును. సామాన్యపు కీత్తనారకులకులు సిస్లో కీత్తనారను సాగుచేయుచో నింతకంటె హెచ్చునాగ దిగుబడియగును. ఈగోటలందు మొక్కలను రీ ఆ. దూరపువరుసలలో రీ ఆ. యెడమున నాటవచ్చును. ఇట్లునాటుచో నొకరమునకు సుమారు 1200 మొక్కలు పట్టును. దీని నుండియు నేటేట నొకరమునకు సుమారు 13-14 టన్నులమట్టలే లభించును. కాని 1 టన్నునాగ దిగుబడియగుటకు 30 టన్నులమట్టలే చాలును కావున 1000 యొకరములనుండియు 425-450 టన్నులనాగ దిగుబడియగును. సామాన్యపుకీత్తనారి ధర టన్నుకు 20-30 పౌండు (రు 300-420) ఉండినకాలమున సిస్లో కీత్తనారధర టన్నుకు 28-35 పౌండ్లవరకుం డెను*.

*కావున సి సిస్లో కీత్తనారగోటలోని మొత్తము 1000 యొకరము లందును దిగుబడియగు 425 టన్నులకును, టన్ను 1కి పౌ 28 (రు 420)లచో॥ సుమారు 1,80,000 వచ్చునని లెక్కగట్టుచో సామాన్యపు కీత్తనార గోటలనుండి దిగుబడియగు 325 టన్నులనుండియు పౌ 20 ల (రు 300ల) చొప్పున సుమారు లక్షరూపాయలుమాత్రమే వచ్చును. కీత్తనారగోటల పంపకమున కై హెచ్చుకృపి జరిగిన కాలమున (40-45 సం॥ ల

ఇట్లు సామాన్యపు కిత్త నారతోటకంటె నీసిల్ కిత్త నారతోటలు హెచ్చు లాభకారియైనను నీచేశపు పరిస్థితులలో నీసిల్ కిత్తనార యన్ని తోటను, సామాన్యపు కిత్త నారవలె యేపుగ నెదుగకపోవుటచే నిది యీ దేశమున విస్తరింపలేదు.

మరియు, సైరోపాలో నితర నారలకున్నంత గిరాకి దీనికి-ముఖ్యముగ సామాన్యపు కిత్తనారకు-లేదు. ఇది తక్కిన నారలకంటె తగినంత చాకగ దొరకినపుడే దీనికి కొంత గిరాకీయొందును. కాని యంత్ర సామగ్రి యిప్పటివలె యలభ్యముగనాని, విగుల హెచ్చుధర గలిగి కాని యుండునట్టి కాలమున నీ తోటలను ప్రొత్తగ వేసి లాభమును దీయుట కవకాశము చాలతక్కువ.

కిత్తనార కట్టవలందలి మట్టలనుండి కర్నకులు స్వోపయోగమునకు గాని, స్థానిక విక్రయమునకుగాని నారను దీయదలచుచో, నీ మట్టలను గోసి యంచునగల ముండ్లను గీచివైచి నిలువున రెండుగ జీరి పెంటనే కాని, 3,4 రోజు రెండనిచ్చి కాని నీటిలో 7-10 రోజు లూరబెట్టి

(క్రిందట) వేయియొకరముల తోటనుండి నారను దీయుటకు వలయు యంత్రసామగ్రికి రు 60, 000 లు పెట్టుబడి కావలసియుండుననియు, తోటనుపెంచి నార నుత్పత్తిచేయుటకును యెగుమతికినిచేరి మొత్తపువ్యయము టన్ను 1కి రు 175 లు అగు ననియు ఖర్చుల నెంత హెచ్చుగనగనని లెక్కవేసినను వ్యయము టన్నుకు రు 280 లకు మించదనియును నంచనాతేలెను. ఇట్లుత్పత్తి వ్యయము టన్నుకు రు 280 ల చొప్పున లెక్కజూచినను నీసిల్ నారయుత్పత్తికి మొత్తము 425 టన్నులకు సుమారు రు 1,20,000 అగును. రాబడి రు 1,80,000 లోను నీ రు 1,20, 000 లు పోను నికరాదాయము రు 60, 000 లుండును. సామాన్యపుకిత్తనార 325 టన్నుల యుత్పత్తికిని నీచేటున లెక్కగట్టుచో వ్యయము రు 90, 000 లకు మించును. రాబడి యొకలక్షకు మించక పోవుటచే నికరాదాయము రు 10,000 లకు మించదు. వ్యయము హెచ్చినకాని, ధరతగినకాని నష్టమేరచ్చును.

పిమ్మట నామట్టల నేడేని బల్లపైగాని నునువైన రాతిపైనగాని మేగ బాది యందలి నారనుండి యితర పదార్థమును తొలగించి, బాగుగ నుసిమి యొండవేయవలెను. కొందరు ముందుగ నీ మట్టలను సమ్మేటలతో నలుగ గొట్టి యూరబెట్టి నారను దీయుటయు ఊరబెట్టకుండగనే నారనుండి యితర పదార్థములను బోవునట్లుచేసి నారను తయారుచేసికొనుటయు కూడ గలదు. కానియిట్లు నలుగ గొట్టుటలో మట్టలందలి రసముచింది యొడలికంటుచో దుగదపెట్టి పుండు పడవచ్చును. చెరుకుగానుగలు గల చోట నీమట్టలనందలి రోలర్లమధ్యనుంచి నలుగ గొట్టి నానవేయుటయు గలదు.

ఒక మణుగు నారనుదీయుటకు వలయు మట్టలను (సుమారు 200) గోసి తెచ్చి యీ విధముగ నారనుదీయుటకు $\frac{1}{4}$ శతపశువులయొక్కయు సుమారు 4రు మగవాండ్రయొక్కయు 4రు ఆగువాండ్రయొక్కయు పాటు కావలసియుండును†.

కీర్తనార తరుచు త్రాళ్లు, మోకులు, పలుపులు, బేళ్లు కైరాల కట్టు వక్రాలకు స్థానికముగ నుపయోగింపబడుచుండును మిల్లులందు గోనెనెడ్డల నేత కంతగా నుపయోగింపబడుటలేదు. కాని యిదివరలో నూచింపబడి నట్లు కొన్నిచోట నీనారతోగూడ పురినిపేసి గోనెపట్టాలను, సంచలను నేసికొను గృహపరిశ్రమకలదు. కాని యివి జనపనార, గోగునారపట్టాల కంటెను సంచలకంటెను భిరుసుగ నుండును.

పొగాకుతోటలు పెంచబడుచోట కీర్తనారమట్టలను సన్నముగ జీల్చి యా తడవలను పొగాకును దండలుగ గ్రుచ్చుటకుగూడ తరుచుగ నుపయోగింతురు.

† ఈ పాటువిలువ ప. జ. 18 రు 1-8-0 చొప్పునను, మగవానికి 8 ఆశాలవంతునను, ఆడుదానికి 4 ఆశాలు చొప్పునను లెక్కచూచుచో రు 2-6-0 లు ఆగును. దిగుబడియగు మణుగు కీర్తనాకు రు 7-8-0 లు వచ్చుచో సుమారు రు 6 లు మిగులవచ్చును. మణుగునారను దీయుటకు వలయు సుమారు 2000 మట్టలను కొనవలసియుండునెడల వానిని వేయింటికి సుమారు రు 2 ల చొప్పునగొనుచో మణుగునారనుదీసి విక్రయించుటవలన రు 2 లు మిగులును. ఇంతకంటె హెచ్చుధరకుగొనుచో విక్రయమునకు నారదీయుట కిట్లుగా టుగ నుండదు.

9. మట్టలనుండి నారదీయబడు

నితరజాతులు

(౧) మోరీసు నార (*Mauritius hemp-Furcraea*
gigantia-N. O. *Amaryllidaceae*) — మోరీసు నార మొక్క

కిత్తనారి గణములోనిది కాకిపోయినను, అది కుటుంబమునకు జేరిన మరీ
యొక జాతిలోనిది. ఎదియు అమెరికాఖండమునుండి ప్రవేశి పెట్టబడినదే.
దీనియాకులు (మట్టలు) కిత్తనారిమట్టలకంటె తక్కువ దళముగలిగి యంత

35 వ పటము



మోరీసు నారదుబ్బలు

కంటే నిడివిగను పెడల్పుగను నుండును. ఇదియు కీత్తనారమొక్కవలెనే 15-20 అడుగుల యెత్తువరకు పెరుగు స్తంభముగల గెనువేయును. కాని యందువలెనే పూవులకు బదులు చిరుమొగ్గలు బయలుదేరి ప్రవర్ధనమున కుపయోగించును. ఈ జాతిగోటలు అస్సీ కాశీండమునకు జెంఱిన మోరీసు దీవులందు విరివిగ సాగుచేయబడి యంత్ర సహాయమున నార తీయబడుచుండుటచే నీనాగుకు మోరీసు నారయని పేరుగలిగెను. అచట నీగోటల నుండి కీత్తనార గోటబడుండికంటే హెచ్చు నారి లభించుచున్నది. ఈ నార సినిల్ కీత్తనారతో సమానమగు ధని గణియగుండును. ఈదేశమున నీజాతి పేకెక్కలు కట్టవగుండును ఉద్యానమలండును అచటచట గాన నగును. కాని యెచటను నారకొరకు విరివి జెంచబడుచుండుటలేదు.

(9) నార లేక చానారి (Bowstring hemp -

Sansiviera zeylanica- N. O. Haemodoraceae) :—

ఈమొక్కయు కీత్తనార కుటుంబములోనిదిగాక మరొకొక కుటుంబము లోనిది. సన్నగను నిడివిగనుండు ముండ్లువేని యాకులనుగలిగియుండును. అకులు చెల్లనిపొడలుగలిగి జేబయవర్ణముతో నుండును. పూవులు సువాసనగలిగి యిందుక పసినివర్ణముతోగూడిన తెల్లపు వర్ణముగలిగియుండును. ఈమొక్కకిండియాలో స్వచ్ఛానముగ నెంచబడుచున్నది. ఈయాకులనుండి దీయబడు నారి వైజాతుల నారి కంటే మృగపుగను నుండును. నారివలెసాగిదీసినను ముండ్లముగ తెలికపోవుటచే నీనారతో పేసబడిన శన్ననిత్రాళ్ళు విలత్రాళ్ళుగ నుపయోగించబడుచుండును. కొన్నియడవులలో నీజాతి వనస్యముగ బెరుగుటకూడ కలగు. కొన్నిదేశములందీ జాతి మొక్కలగుగాడ కీత్తనారమొక్కల వలెనే నాటిపెంచి నారతీయుటగలదు. కానియంతకంటే దగ్గరగ (రిగ్గర, చొప్పన) నాటుదురు. అకులనారవేసినతో నారబలముచెడును. గాన, యంత్రసహాయమున

దీనినుండి నాగ కాక తక్కిన భాగములను గోకించెనిన, నాగనుకడిగి శుభ్రము చేసి యొండబెట్టుదురు. కిత్తనారనుండి వలెనే నూటికి 2½ వంతులు నార నిగుబడియగును.

ఈజాతిలో నింతకంటె నిడివిగను, వెడల్పుగను నుండు విచిత్ర వాతులుకూడ గలవు.

ఒకజాతి (*S. cylindrica*) యాకులు ముసలి కాడలవలె గుండ్రదేరి 3-4 అడుగుల పొడవుండ వ. దీనిని నలుగుట్టి నారతీయటయు గలదు.

(3) అనాస(Pine - apple)నారి:- ప్రసిద్ధమునీ ఫల జాతి యాకులనుండికూడ కొన్నిచోట్ల నారతీయబడి స్థానికముగ మప యోగింపబడుటయు, ఎగుమతి చేయబడుటయు గలదు. సిగల్ నారధర పాకేరి లుండినపుడీ నారధర పాకేరి 30 అండును. ఈ నారనుకూడ సాగనార

శ్రుతిమట్టల నూనెయకుండ నాగనుదీయుటకు సామాన్యముగ మట్టలను సమ్మెటలతో నలుగుట్టి నార గంటలగిపోయి నున్నబడిన కోల లగుల చెరుకుగానగల లోపెట్టి నలుగుట్టి కాని యొకబల్లపైపెరిచి, అరిగిపోయిన కొడవలి యరుగుంటి యరుగలకట్టి మట్టలను పెక్కు సార్లు తిరుగ, బోరపెసిగీయుదురు. తగిన చేయంత్ర మొకటికూడగలదు. ఇందు మరక క్రిమీటయందువలె నొక కత్తి యొకయెత్తైనబల్లపై వైకిని క్రిందికిని అడుచుండునట్లు బిగించి రెండవకొన బల్లక్రింద నమర్చబడి కాలితోద్రోక్కబడు నొకమీటచినర నొకత్రాటిచే సంధింపబడును. నలుగుట్టిన యొక్కొక్కమట్ట నీకత్తిక్రిందబల్లపైనుంచి కాలితో మీటను ద్రొక్కిపెట్టి మట్టను లాగుచో నందలి నారకాక తక్కిన పొరలు గీతివేయబడును. మీటను ద్రొక్కుటమూనుచో కత్తి దీనిపై నొక్కుట మానును.

వలెనే మట్టిల నారవేయకుండగనే దీయదగుచు కాని యీ నార తక్కిన భాగములనుండి యంతసులభముగ వీడిపోదు. కావున సులభముగ వీడు

36 వ పటము



అ నా స నో ట


టకుగాను ఈ యాకులను ఔరద్రవ్యద్రావణములలో కొంత కాలమునాత బెట్టుటగలదు. అకులతూనికపై నీనాఁయు 2½% దిగుబడియగును. ఈ నార పట్టువలె మృగవుగనుండును. ఈ నారయంతటను సమముగనుండకపోవుటచే దీనిని చువ్వి తరగతివారీగా విడదీసి విక్రయించుటయు గలదు.

10. అ ర టి నా ర

Plantain fibre—Musa sp. N. O. Musaceae

అరటిచెట్ల వికాండములందలి డిప్పల (ఆకులతోడి మల) నుండికూడ నారను దీయవీలగును. ఫిలిప్పైన్ దీవు

37 వ పటము



అరటిచెట్టు ౧/౧

లందు ప్రత్యేకముగ నార క్కారకే యొకజాతి(Musa textiles) యరటితోటలుగ పెంచబడి యాచెట్ల డిప్పలనుండి తీయబడిన నార మనిల్లానార(Manilla hemp)అను పేరుతో యెగువతి చేయబడుచున్నది. ఈ జాతి యరటి చెట్ల దేశపు బొంతయరటి చెట్లచు బోలి యంతకంటె ను మోటుగ నెదుగును. ఈయరటి పండ్ల దేశపు గింజల యరటి పండ్లవలె

మిరియపు గింజలవంటి పెక్కుగింజలతోగూడి యుండుటచే తినుటకంతగా బనికిరావు.

ఈతోట అరటితోటలవలెనే సుమారు పదేసి యడుగుల కొక మొక్కచొప్పున నాటి పెంచబడుచుండును. ఇట్లు పెంచినతోటను సుమారు 15-20 సంవత్సరములవరకుంచి తీసివేయుచుండరు. తోటకు

18-20 నెలల వయసు వచ్చిన వెనుక నందలి చెట్ల డిప్పలనుండి నాన తీయ నారంభింతురు.

ఈ నారనుకూడ సాగ నారమట్టలనుండివలె నీటిలో నూర వేయకొండ తీయ వలసియుండును. ఫిలిప్పైన్ దీవులలో నీపని యంతయు యంత్ర మో యమున చేయబడుచుండును. అచట $1\frac{1}{2}$ -2 H. P.* యెంజినుల సహాయమున బొంత కొని డిప్పల నీచి నారనదీయు చిన్నకర్మాగారములందీ యా పనియెచ్చుగా జరుగదన్నది. వీనిమూలమున నీనమునకు యంత్రపునైజనుబట్టి $1\frac{1}{2}$ -3 టన్నుల నారదీయవీలును. ఇటు తీసిన నారను క్షిప్రముగగడిగి యొండబెట్టుదురు డిప్పలకొనిన నూటికి సుమారు $1\frac{1}{2}$ - 2 శంతుల నారిని గుడిచుదును. సరిసంవత్సరములవయసు వచ్చిన తోటలనుండి యెంచునకు సాగుకు సుమారు $\frac{1}{2}$ టన్ను నార దొరుకవలెను. డిప్పలపైవైపునార పొడవు గ నుండును. కాని ముగును. లోనివైపునుండి తీయు నారి కురుచుగ నున్నను వృగువుగ నుండును. ఇది గుడ్డలనేత కుపయోగింపబడును. ముగును నారతో త్రాళ్లు మోతులు వగైరాలు తయారుచేయబడును. లావుపాటిమోతులు, యంత్రాగారములందలి తల్లిచక్రము లితగచక్రములను ద్రిప్పటకుగాను సంశింపబడు పట్టిల (Belts) కు బగులుగ నుపయోగింపబడి బాగుగ మున్నును. కావున నీ నారకును, త్రాళ్లకును గిరాకిగలదు.

ఈ బాలి యరటి చెట్లదేశమునకూడ ప్రవేశపెట్టబడెను. కాని, వీనిని బెంచి నారతీయుటకిందు ఫిలిప్పైన్ లో కంటే మెచ్చువ్యయముగుట చేతను, ఇంగువలన పండ్లకొరకుబెంచబడు సామాన్యపు టరటితోటల నుండి వచ్చునంతలాభము రాకపోవుటచేతను వీనిసాగంతగా వ్యాపింపలేదు.

* H. P. అనగా Horse Power లేక గుర్రములశక్తి అని యర్థము.

ఈదేశమున సామాన్యపు అరటిగోటలనుండి చేయంత్రములతో* నారనుదీని కొంత యదనపులాభమును దీయుటకీ శతాబ్దప్రారంభమున చాలకృషి జరిగెను. కాని యీ డిప్పలనుండి నూటికి 1-1½ వంతుల కంటే హెచ్చునార లభింపబడెను, ఈ నారమైనను మన్నియరటి నారయంత జిగిలేకపోవుటచేతను దీనికి గిరాకియు, అంతధరయు లేకుండెను. నారనుదీయుటకు వ్యయముపోను లాభమంతగా మిగులకపోవుట వలన నీ గృహపరిశ్రమ యెచటను కొనసాగలేదు.

నిలువుగజీల్చి యొండొట్టబడిన యరటిశిప్ప నుండి కాగితములను దయారుచేయవీలగును. వీనిని కర్రపీసాలలో చెక్కకును చెక్కకును మధ్య నుండులనుండి నీరు వస్తారా కారగుండుటకుగాను అచెక్కలమధ్యపెట్టి విగించుచుండురు. ఇవి దడులు, పంచెట్టు, పనమోఘలు వస్త్రాలను గట్టుటకు గాను తాటిసర్లకు బదులుగ నుపయోగింపబడుటయుగలదు. మామిడి వస్త్రాల జాతుల యట్లును గట్టువారీ యెండిన యరటిడిప్ప (అరటిపాత్తి) ముక్కలను అంటుగట్టిన భాగమునకు మైనపు గుడ్డకుబడులుగ జాట్టికట్టుచుండురు. సన్నముగజీలిన యరటిపాత్తి తడపలు తములపాకులతోగలు వస్త్రాల తలను పానులపైకగగట్టుటకును, తములపాకులను చిన్నచిన్న కట్టలుగగట్టుట మొదలగు పనులకును నుపయోగింపబడుచుండును. గత సంగ్రామకాలమున కాగితములకు కరవేర్పడినందున బాగుగపండి బూజాకట్టి రంగుచెడకుండగను, ముడతలపడకుండగను నొండబెట్టిన యరటినుకు ముక్కలపై కొందరు సిసీమాప్రకటనలు, మీటింగుల గోటీసులు వస్త్రాలను ముద్రించి పంచిపెట్టిరి.

* ఇందులకు సాగనార శీర్షికక్రింద వర్ణింపబడినయంత్రముపయోగపడును. అరటినారనుదీయుటకుపయోగింపబడు కస్తులు సామాన్యపు టినుముతోగాక తగినంత కఠినముగనుండి యినుమువలె కఠినమైన లోహముతో చేయబడుచో నార రంగుచెడదు.

11. తాటి నార

Palmyra fibre-Borassus flabelliformis-

N. O. Palmaceae

హిం. తాల్; ఓ. తాలా; అ. పనై; సం. తాల;

తాటియాకుల నిండ్లకప్పులు వృక్షాలకై నరికినపుడు వాని కమ్మల (తొడిమల)పై వైపునండి సుమారు 2-1 $\frac{1}{2}$ అం. వెడల్పును 1-1 $\frac{1}{2}$ x 3 ముల పొడవును గల నారతోగూడిన బద్దలను (నల్లను) దీసి యెండబెట్టి కట్టలలో గట్టి నింపేయగలరు. వలసినపుడు వీనిని తీసి తడిపి మెత్తబరచి సన్నముగ తీరి యీ చీలికలతో నాగటి యాకులు, పశువులకట్టత్రాళ్లు మొదలగు త్రాళ్లను వేయగలరు. ఈ చీలికలన్ని విధముల కట్టకును ఉపయోగింపబడుచుండను. మిగుల తేలియాకుల కమ్మనుండి కాని, మిగుల మురిపిపోయిన కమ్మలనుండిగాని తీరుబడు నల్లు క్రేపముగ నుండవు. సామాన్యముగ నూటికేబది కమ్మలనుండియే యిట్లు నల్లు తీరుబడుచుండును. కమ్మపైవైపున నుండు నీ పొగకును క్రిందవైపు గట్టి పొరకును మధ్య భాగమునుండికూడ నార తడవలను (బొండ్ల నారను) దీసి కట్టకుపయోగించుటగలగు. కాని యీ బొండ్లు నార పెళుసుగను బలహీనముగను నుండుటచే త్రాళ్లగ బేనటకుపయోగింపదు.


తాటికమ్మల దిగువభాగముల, అనగా రెండుగాజీలి ప్రకాండము నంటిపెట్టికొనియుండు భాగముల(జడటల)† నుండి ఎత్తని నారయేచలకంటె ముదురుగను, చిరుసుగను నుండు మరియొకవిధమగు నారయేచలు కూడ కొన్నిచోట్ల తీరుబడుచున్నవి. ఇవి చాలభాగము విదేశములగు మతి చేయబడి తుడుపుకుంచెలు (Dusting brushes) మొదలగు వానినికేయుటకుపయోగింపబడుచున్నవి.

† సుమారు 1 $\frac{1}{2}$ -2 అడుగులపొడవుగల దిగువభాగములింగులకుపయోగింపబడుచుండును.

* ఈదేశము సుమారువరియేండ్లక్రిందట(1891వ సంవత్సరమున అనగా వెనుకటి ఖరసంవత్సరమున) కరివుపట్టినపుడు ప్రారంభమైనదని

ఈ మునుగునార సామాన్యముగ 10-20 సంవత్సరముల వయసు గల లేత చెట్ల జవటలనుండియే తీయబడుచుండును. కాపుపట్టినచెట్ల జవటలనుండి తీసిననార పెళుసుగినుండును. మరియు నిచ్చెన సహాయమున

38 వ పటము



తాటితోపు

గోయవీలులేనంత యెత్తుచెట్లనుండి జవటలను గోయటకు నెట్టిబలిచి, యాండ్రమొదలగు చెట్లనెక్కు ప్రత్యేక కులమువాండ్రకేగాని యీపరి

చెప్పదురు. కానిగత 30-40 సంవత్సరములలోనే యిది స్రాముఖ్యతకు వచ్చెను. గత సంగ్రామకాలమున యెగుమతులాగిపోవుటచే నీ పరిశ్రమ క్షీణించెను. కాని యిటీవల మరల కొలకొనెను.

శ్రమవలన జీవించు సామాన్యపు పాటకజనమునకు సాధ్యపడక పోవుట పెద్దచెట్లనుండి జమ్మలను గోయకుండుటకు మరియొక కారణము.

లేత చెట్లజవటలం - నను బాగుగ నుండిరిన జవటలనుండి తీసిన నార మాత్రమే కొంచెముమించు నలుపుగింగు లేక నలుపుతోగూడిన గోధుమంగును తగినంత జిగియుగిరిగి శ్రేష్ఠముగ నుండును. ఇట్టి నార నిచ్చు జవటలనెంచి గోయుటలో గొంతయనుభవముగూడ కావలసి యుండును. ఇట్టింగురాక, తెలుపుకొడిగానుండు లేతనారి తగినంత జిగి లేక పెళుసుగను, బలహీనముగను నుండును. దీనికి గిరాకియు ధరయు కూడ తక్కువ.

జవటలనుగోసి వెంటనే యంచునుండుగిరిని కత్తితో గీచివైపు, రెండుగజేల్చి, వానిని కర్రవమ్మెటలతో నందలి నాగునుండి యిరివకణములు విడిపోవువరకు నలుగ గొట్టుగారు కొన్నిచోట్ల వీనిని నీటిలో నొక రాత్రి నానబెట్టి మరునాడు నలుగ గొట్టుటయు గలదు. నిలువయుండి అరి పోయిన జవటలను తప్పక నిట్లు నానబెట్టియే నలుగ గొట్టవలసియుండును.

ఇట్లు నలుగ గొట్టి తీసిన నాగు యేచలకింకను నంటియుండు నితర కణములు పోవునట్లు సుమారు ౧-1½ అం. వెడల్పును 2½-3 అ. పొడవును గల బల్లచెక్క పై నొక కొనకు సుమారు ౧ అంగుళము దూరమున రెండు వరుసలు 1 నడుగునుండి యానుపమేకులు దీగ గొట్టబడుటచే నేర్చుదురు వై నలపై పెక్కుసార్లుగాని పుద్రిముచేయుదురు. ఇట్లు పుద్రిముచేసిన నాగును సుమారు ౧౧ అంగుళముల యొండలో పలుచని నారబెట్టి కట్టలుకట్టుదురు. ఇట్లే యొండలో పరమిటవలన నాగుగింపు గూడ కొంత ముగరును.

ఇట్లు తయారుచేయబడిన మడినారను చిల్లిన కర్రకు బాహుర దిరిగి తయారుచేసినవారి వద్దనుండియు నంకలలోనుకొని, దానిని మరికొంత పుద్రిముచేసి, చున్ని యొండవెట్టి చిన్నచిన్న కట్టలుగట్టి రాగ కట్టలను

1 బల్ల వెడల్పునుబట్టి ఒక వరుసలో 6-9 మేకులును, రెండవ వరుసలో మరి 6-9 మేకులును దీగ గొట్టబడి పైని సుమారు 1 అంగుళముల యొత్తుండును. ఒక వరుసలోని మేకులను రెండవ వరుసలోని మేకుల కెదురుగా గాక వాని మధ్యస్థలముల కెదురుగా నుండును.

మరల 2-2½ ముసుగులు(ముసుగునకు 25 పౌనులు) తూగు పెద్ద మోపులుగ గట్టి కొన్ని కేంద్రములందుగల ఫ్యాక్టరీలకు విక్రయింతురు.

సామాన్యముగ నెలగను తగినంతజీరుసుగను ముదురుగను నుండు నార యొకతరగతిలోను యింతకంటె మెతగను సన్నముగను నుండి గోధుమరంగుతో నుండునది మరియొక తరగతిలోను జేర్చబడును †. లేత గోధుమరంగుగల నారకు ముదురుగోధుమరంగు వచ్చుటకీ నారను మరల తడిపియెండలో నారబెట్టుటయుగలదు. కొన్నిచోట్ల నీరెండు తరగతులుగ విడదీయబడిన నారను నేడేనిరాలిబండపైపరచి కాళ్ళక్రింద త్రొక్కించి కొంత మెరుగు పెట్టుదురు ‡. కొన్నిప్రదేశముల కగుమతికై యీ నారింకను హెచ్చనలుపుతోగూడిన రంగు చెచ్చుటకుగాను దీనికి చిల్లరవర్తకుల కార్ఖానాలలో నేగాని యచటనుండి యెగుమతి స్థానములకు బోయినవెనుక నచటి కేంద్ర కర్మాగారములందుగాని మరల రంగువేయుదురు. ఇంటులకీ నారను అన్ని భేద (Ferrous sulphate) కలక కాఱు (Myrabolan) పేరు, కాచు (Cutch) యిమాంటిని యొక్క ప్రమాణమున గలిపిన చిల్ల నీటితో నొక రాత్రి నానబెట్టి 3, 4 రోజులు గుట్టులగ పెట్టియించి పిమ్మట యెండలో పంచి యార్చివేతురు. అరిసవెనుక నారను మరల కట్టులగట్టదురు. కొందరు అన్ని భేదకీబనులు కాంగో రెడ్ (Congo red) అనుకృత్రిమరంగుడినును నాడుదురు. 10 గాలనుల నీటికి 14 పౌనులరంగు, 14 పౌనుల కలక కాఱుపేర్చి, 1-2 బుస్సుల కాచు చొప్పున గలుపుదురు. వీనితో ½ పౌను చాకిలిసోడా (Washing soda) కూడ తరుచు కలుపబడుచుండును. ఈ ద్రావణమును దయారు చేసి నారనూనెబెట్టుట కినుపపాత్ర లుపయోగింపబడుచుండును.

† కొన్నిచోట్ల నీ నారను ముదుగు, మధ్యము, సన్నము అను మూడు తరగతులుగ విభజింపబడుటయు గలదు.

‡ ఇట్లు కర్మాగారమున శుభ్రపరచి యెండించి తయారుచేయుటలో ఉత్పత్తిదారులనుండి కొన్ననారలో 4 వ శతు (25%) మాత్రమే 2 వ తరగతి నార లేలును. ఇందుగలము (12½%) 1 వ తరగతి నార లేలును. తక్కిన 62½% ను ఎండబెట్టినపుడు పోవులేయయు, రద్దనునై యుండును.

కేంద్ర కర్మాగారములందు కాని, యెగుమతి శేవులందరి కర్మాగారములందుగాని ఈ నాగదగ్గర పండుగల రువ్వెనలపై రువ్వి మరింత శ్రుద్ధము చేయబడిన నారి, (రంగువేసినదియు, రంగువేయనిదియు కూడ) మరలపొడవునుబట్టి తరగతివారీగా విభజించి 112 లేక 280 పానుల శేఖర నొక్కికట్టి విశేషముల కెగుమతి చేయబడుచుండును. కాకినాడ శేవునుండి యెగుమతియగు నాగ పొడవునుబట్టి 16 అం.లకు పైబడినది 1 వ తరగతిలోను, 17 మొదలు 16 అం. వరకు పొడవుగలది 2 వ తరగతిలోను, 18 అం. లకు తక్కువ పొడవుగలది 3 వ తరగతిలోను శేర్పబడుచుండును.

తాటి నార పరిశ్రమవలన గ్రామములందరి పాటకజనము (సామాన్యముగ మాలలు) వ్యవసాయపు కూలిపనులు తక్కువగ నుండు కాలమున (డిసెంబరు మొదలు జూన్ వరకు) కొంతపనికల్పించుకొని కొంతసామును గడింతురు. ఒకమగవాడును, అతనికుటుంబమునందలి ముగ్గురు ఆడవాండును పిల్లలునుకలసి దినమునకు సుమారు రెనిమిగంటలచొప్పున పాటు పడుచో వారమునకు సుమారు 14-18 మణుగుల (మణుగు 25 పానులు) నారను దీయగలుగుదురు. 10-15 సం.ల వయసుగల చెట్లనుండితీయబడు జవటలకూనికపై సుమారు 30-33% వరకు నాగ దీర్చబడియగును. ముది చెట్లనుండితీయబడుజవటలనుండి 20% కంటె హెచ్చుగ రాకపోవచ్చును. ఒక తిరిగిలో ఒకమణుగు (25 పా) నారనిచ్చుటకు 10 - 15 సం.ల వయసుచెట్ల జవటలు 103 యు, అంతకంటె ముదిచెట్లనుండి తీసిన జవటలు 195 యు, విగులించిన చెట్ల జవటలు 238 యు పట్టెను.

పైని తెలుపబడినట్లు ఒకకుటుంబము (1 మగవాడు, 3 ఆడవాండ్రు, పిల్లలు) దినమున కెనిమిగంటలపాటుపడి యొకవారమునదీయు 16 మణుగుల ముడి నాగ కను గతంత్ర గ్రామమునకు బూర్వపు సగటుధగ మణుగునకు 10 అణాలు (మణుగునకు 8 మొదలు 12 అణాలు) చొప్పున తెక్కజాచుచో వారమునకు రు 10-0-0 లు వచ్చును. 16 మణుగుల నారను దీయుటకు సగటున 10-15 సం. వయసుగల 80 చెట్లజవటలు కావలసి యుండును. వీనినిగోనికొనుటకు చెట్లయజమానికి చెట్టు 18 అణాచొప్పున

తాటిముంజలు, పండ్లు, లేగలు, బుర్రగుంజ, లేత మొవ్వులు మొదలగు నాహారముగ నుపయోగించు భాగములను గరించి పండ్లు రీ వ భాగమునను, తాటిబెల్లపు పరిశ్రమను గురించి 'చెరుకు, యితరచక్కెర పంటలు సిద్ధ ద్రవ్యములు' అను సంపుటమునను చెలుపబడెను.

తాటిచెట్ల పెంపకమును గురించియు, తాటికమ్మలు, గ్రూను వగైరా యితర భాగముల యుపయోగమును గూర్చియు, మరియొక సంపుటమున చెలుపబడును.

మొత్తముమీద నీ తాటిచెట్లు మెండుగలచోట, వీనినెక్కి యాకులు వగైరాను గోయుట మూలమునను, నారి, చాపలు వగైరా పరిశ్రమల మూలమునను బీదప్రజల నేతులు వ్యవసాయపు బహులంతగా లేని కాలమున కొంత యగ్గన చేసి జీవించుటకునున్నారు.

12. కొబ్బెరపీచు

Coconut - Cocos nucifera - N. O. Palmaceae

హిం. నారియల్; ఓ. నోడియా; అ. తేంగాయ్


క. తేంగిన; సం. నారికేళః

కురుచగనుండు యేచలుగల నార పీచు అనబడును. ఇట్టి దిచునుచున్నగు జాతులలో కొబ్బెర ప్రధానమైనది. జనుము, గోగు, కిత్తనారవగైరా నారలవలె నీకొబ్బెరపీచు (Coir fibre) కాండమునుండి లేక మట్టల (అకుల) నుండి కాక కాయల పై పెచ్చు (ఛొక్క) ల నుండి తీయబడుచున్నది. జనుము, గోగు, వగైరాకర్రలనుండి నారను దీయునపుడు గాని, పిమ్మట దానితోపురి పీచుటకు ముందు దువ్వుటలోగాని బయలుదేరు కురుచయేచలుగల పీచు (Tow) మరియొకవిధమైనది.

కొబ్బెరతోటల పెంపకమును గురించియు కొబ్బెర కాయలవ్వైరా ఆహారముగ నుపయోగించు భాగములను గురించియు పండు - 5 వ భాగమున విపులముగ చెలుపబడెను. కొబ్బెరచెట్టును గీచితీయంతీయకలునుండి బెలమును దయారుచేయుటనుగూర్చి 'చెరుకో, యితరచక్కెర పంటలు, పిష్టద్రవ్యములు' అనుగ్రంథమున చెలుపబడెను. ఇచ్చట ప్రధానముగ నీ కాయల వోచితీయబడు డొక్కటనుండి పీచుదీయుటను గురించియు దానివినియోగమును గురించియు మాత్రమే తెలుపబడును.

కొబ్బెరపీచు పరిశ్రమ, యీతోటలు మెండుగగల పడమటితీర ప్రదేశములంగ-ముఖ్యముగ తిరువాంకూరు, కొచ్చి, మలబారు, దక్షిణ కన్నడపు జిల్లాలందు-విస్తారముగ గలను. వైనురునంగను తంజావూరు

39 వ పటము



వ్వైరా దక్షిణాది జిల్లాలందు మార్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, విశాఖపట్నం జిల్లా కోస్తా భాగము లందును గూడ నీతోటలు కొంత హచ్చుగ నున్నను యింకెచటగాని యీ పరిశ్రమ యంత విరివిగ జరుగుచుండలేదు. ఇచ్చట తీయబడుపీచును దానితో పేసబడు త్రాడును పశ్చిమ తీరపు పీచంత గణ్యముగ నుండదు. దానికి గల గిరాకియు, ధరయు గూడ లేవు.

గోదావరి, తంజావూరు వ్వైరా

కొబ్బెరగొండలు ఖండ దృశ్యముఁ దెల్పజిల్లాలలో నీ పరిశ్రమను విరివిగ సాగించుటకీ ప్రాంతములందు పశ్చిమ తీరమునందు కంటే కూలి చేట్లు హచ్చుగ నుండుట కొంతవర కాటంకముగ నున్నది. ఈపరిశ్రమను గురించిన పరిశోధనలను స్థానిక పరిస్థితులలో జరిపి పశ్చిమతీరపు పీచువలె గణ్యముగ నుండి పిదేశముల కెగుమతిచేయదగు పీచును గట్టబాటుగ దీయు విధానములను గనుగొని అవ్వరమగు పెట్టుబడి కేర్పాట్లుగావించి యీ పరిశ్రమను ప్రోత్సహించుచో నది కొంతవర కభివృద్ధిగాంచవచ్చును.

ఇటీవల అమలాపురమున నీవరిశ్రమను విరివిగా సాగించుట కొక సంఘము (Company) స్థాపించబడి ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శాఖవారి లోడ్వాటులో కొంతకృషిజరిగెను. కాని యీ తుదనుట్టివట్లు గాన్నింపదు.

ఆంధ్రదేశమున పీచునుదీసి త్రాల్లనువేయు విధానము:-

ఈ ప్రాంతములగు కొద్వై-నోటలగుల శ్రవణముండి దొక్కలనుండి పీచునుదీయుటకు కాయలనుండి, మొలచినవెంటనే అనగా అందరిపరు నెండిపోకముందే ఆ దొక్కల నొక రాలిబండ్లపై కగ్రిన్వెట్టుటతోనలగ గొట్టుచు, పొట్లను గులిపివేయును. ఇందుల నానెయ్యెచలనుండి తిక్కిన కణ సంహతులు పూర్తిగవిడిపోవునట్లు చేయుదురు. నలుగురున్న దొక్కలపై నపుడపుడు నీటిని చీకరించు గుండురు. దొక్కలొరిపోయినచో ముందొకరాత్రి వానిని మంటిలోలెములలోగాని కత్తెటలోగాని నానబెట్టి మరునాడు పొట్టుదురు. ఇదావరిదెట్టెలో గొన్నిచోట్ల దొక్కలను మొదట కొంతవరకు నలుగుట్టి 15 రోజులు నానవేసి యపుడు మరల గొట్టుటగలరు.

ఇటుతీసి సుగ్రహ చివరీమ నెండవెట్టి విక్రయింతురు. శీతస్వయము గనే పురపేని త్రాల్లనువేసి యమ్ముదురు.

ఒక పాను పీచునుదీయుటకు దొక్కలపైజను బట్టియు, నందలిపీచు ప్రమాణమును బట్టియు, ముగురు శేతిలనుబట్టియు 4-7 కాయలదొక్కలు పట్టును. ఒకమణుగు (25 పౌ) పీచును దీయుటకు ఈ ప్రాంతము లందలి కాయలదొక్కలు సగటున 150 లెక్కచూడవచ్చును. సామాన్యముగ నిద్దరు అడువాండ్రు ఒకరోజులో వీనిని నలుగుట్టి పీచునుదీయ గలరు. ఈ పీచును 7-9 మంది అడువాండ్రు ఒకరోజులో పురిగావేస

9 బాగుగపండన అనగా ముప్పేటకాయల దొక్కలనుండి పీచు తక్కువగ దిగబడియగును. కాని యిది మృగవుగ నిగనిగలాడుచుండును. చినను జిగితక్కువ. చెట్టుననే యెండిరాలిన కాయల దొక్కలపీచుగాని, తీసినవెనుక నిల్యయుండిన కాయల దొక్కలపీచుగాని, పెళునెక్కి నాణెము నుండదు. వీనిని గొట్టి పీచుదీయుటయు గష్టము.

గలరు. పీచును కొంచెము కొంచెము తీసికొని రెండు అరచేతులలోనదిపి
మెలిపెట్టుదురు. ఇట్లు మెలిపెట్టినపురిని చెంబుముచేసి మణచి ఎదురుపురి
పెట్టుదురు. ఎందువలన దానిపురి ముగి విడిపోకుండును. ఈఫనివారుగ
చేతనైనవారు మనిషి 1 కి గంటకు 100 అడుగుల పురినిపేసగలుగుదురు.
పైనితొలపబడినట్లు చేరిన ఒకమణుగు పురిని ముగ్గురు మనుష్యులకడిన
మున మూడుపెట్టుగా పెని చేదస్త్రాళ్లు కావటిమట్లు వస్త్రాల కుపయోగించు
సన్నస్త్రాళ్ళను వేరుగచేసుదురు. ముగ్గురుపురి నుండియు నిట్టి త్రాడు
సుమారు 7½ పీచుల తయ్యగును. ఇట్టిత్రాడుధని మణుగు సుమారు
రు 3-2-0 చొప్పున నుండుచో 7½ పీచులకు రు 2-15-0 వచ్చును.
డొక్కలధర 100 కి 10 అశాల చొప్పున ధుక్కిరిన 150 కాయల
డొక్కలకగు రు 0-15-0లు మినహాయించగా పనివాండ్రకు రు 2-0-0లు
అనగా మగవానికి రోజు 1 కి 4 అశాలు చొప్పునను, ఆడుదానికి 2 అ
శాలచొప్పునను కిట్టెను. ఒకమగవాడును, ముగ్గురు ఆడువాండ్రు లేక
పనిచేయు వెయ్యసువచ్చిన కిట్టెనుల కటుంబ మోపనికి బూనికొని గిన
మున కనిమిగంటలు పనిచేయుచో, 3 రోజులలో నీవణుగు పీచునుదీసి
పురిపేని త్రాడువేయగలరు. ఇట్లువేయబడు ముప్పైత్రాడు 7½ పీచు
లను సుమారు 500 గజముల పొడవుండవచ్చును. పకనిగజముల పొడవు
చేదస్త్రాళ్లు ముగ్గురునకు 50 వూగును

సామాన్యముగ చాచోట్ల దీయబడు నిట్టి ముప్పైట త్రాడుగాక
అమలాపురిం రాజోలు తాలూకాలలోను, విరివియుగు చోటలుగల యితర
సముద్రపు తీర ప్రదేశములందు 9 పేటలువేసి వేసిన 3 అం. మధ్య
కొల్లగల త్రాడుకూడ విక్రయింపబడుచుండును. ఇట్టిత్రాళ్ళు మోట
తొండపు త్రాళ్లు, తెరచాపత్రాళ్లు, వలత్రాళ్ళు ముదలగవాని కుపయో
గింపబడుచుండును. ఇట్టిత్రాళ్ళను 3, 4 పేటలువేసి 1½-2 అం. మధ్య
కొల్లగల వెంతు త్రాడుకూడ వేయబడి విక్రయింపబడుచుండును. వీనికి
మణుగు 1కి మరి రు 0-8-0—1-4-0లు అదనముగా వచ్చును. ఇట్టి
త్రాళ్ళనువేసి విక్రయించుచో వేయటకు అదనపు పాటువిలవ పోగా
మణుగునకు 8-12 అశాలు విగుల వచ్చును.

పై రెండు విధముల త్రాళ్ళునుగాక యేచలు బాగుగ విడిపోక కొద్ది గొప్ప ముడుగు పీచునో బాగుగ బురియెక్కకుండ చేసిన కిచ్చాపురియే చొప్పత్రాడు అను పేరుతో చాకగ విక్రయింపబడుచున్నది. ఈచొప్ప త్రాళ్ళు సామాన్యముగ పంచెలు దిడులు వగైరాల కట్టుకట్టుటకును, అరటిచెట్లకు బోటుపెట్టి కట్టుటకును, కొబ్బెర మిరెప వగైరాల నెండ బెట్టు కిళ్ళీములచుట్టును పైనను కాకులు రాకుండ యలబడువలల నలుట కును, తోరణములు వగైరాలకును నుపయోగింపబడుచుండును. ఇదికాక నదులలోను, వాని కాల్యాలలోను, సముద్రమునందును నడచు కొయ్య పడ కలలోనికి నీరు రాకుండుటకు చెక్కకును చెక్కకును మధ్య ఎందులలో నిట్టి త్రాటిని చొక్కెట్టి వైవి కీలుత్రాయుదురు.

పడమటి తీరమున కొబ్బెరపీచు తీసి త్రాళ్ళచువేయు విధానము:—పడమటి తీరమున దీయబడు కొబ్బెరపీచు తక్కిన ప్రదేశ ములందు దీయబడు దానికంటె శ్రేష్ఠముగ నెండటకు ముఖ్య కారణము అచట డొక్కలను నలుగ గొట్టకమునుపు వానిని సుమారు 8-12 నెలల వరకు నుప్పునీటిలో ముగ్గుగ నూనెట్టుచున్నవని చెప్పదగదు. అచట వీడ్కోళ్లను కాయలను దింపిన యొకటి రెండు రోజులలోపలనేయొచి మరియొకటి రెండురోజులుగాటకుండ, సముద్రపుపోటుపాలులకు లో ఎగు నదిభాగముల (ఉప్పుచేళ్ళ) పడకలలో సుమారు 6 అడుగుల లోతుగ గోతులనుదీసి యందు పైమట్టమునకు 2-3 అ. దిగువవరకు మాత్రమే డొక్కలనువేసి వైవికొబ్బెరాకు తడకలన పరచి యున్నవిమంటిని వేసి కప్పుదురు. గోతులలోనుచోట కంపలిమన్న పొచ్చుగలిసియుండుచో కొంత వాయుప్రసారము లిగి నూడ్యజీవులభవస్థితి డొక్కలు మరింతయనుకూలముగ జీకి పీచురంగు తేటుగనుండును. ఇట్లు డొక్కలు వేసి కప్పినగోతులపై పోటుదగిలినపుడెల్ల అనగా దినమునకు రెండుసార్లు త్రొక్కినీరు పడుచుండును. ఇట్టిచోట్ల గోతులతీసికప్పిన కొన్నిదినములలో నాడొక్కలు చీక నారంభించి వానినుండి యొకవిధముగ (గంధక ఉదజ నదపు) వాసనవంటి దుర్వాసన బయలుదేరును. గోతులచుట్టును ఒకవిధ మగు బురదరంగునురుగు బయలుదేరును. చుట్టును మరికొంత దూరమువరకు కూడ నీరుమకిలిగానుండును. దానియొద్దెక్కడ హెచ్చును. సుమారెనిది

నెలలకు పిమ్మట వీచాన, నురుగు, నీరు మిక్కిలిగానుండుట, ఉష్ణత, యివియన్నియు తగ్గును. అప్పటికి కొక్కలు సరిగా నూరినవనుకొన దగును. అప్పుడు వీనినిదీసి యిదివఱలో పలుపబడినట్లొక రాతిపలకపై నలుగ గొట్టు గురు. ఇందుకు న నందలి నారయేచలనంబియుండు పొక్కు వర్షరాలు విడివడి, గలిపివేసినచో చాలవగు బోవును. అప్పుడాపీచును స్వచ్ఛమ యినరీతిలో బాగుగగడిసి యెండవేసి యుపయోగింతురు.

పడమటితీరమున పైనితెలుపబడిన రీతిని దీయబడుపీచు, అచటి కొక్కలు సుమారు 125 కొకమణుకు చొప్పున బయలుదేరును. ఇట్లుక బెట్టి కొక్కలను నలుగ గొట్టిన పద్ధియుండు తాజా కొక్కలను నలుగ గొట్టి పీచుదీయుటకంటె సులభముగ నుండుటే కాక యిపీచు బంగారువంటి పసిమిరంగుగలిగి జరిగానుండును. వేయికొక్కలకు సరిపడుగోతిని తీసి కప్పటకొక మనిషిపాటును, అవి మూరినవెనుక నానిని మరలదీయుట కొక మనిషిపాటును కావాలియుండును వీరిద్దరిని రోజుకులి 3 అనాలు చొప్పున రెక్కచూచుచో 1000 కొక్కల ఖరీదు రు 6-4-0 లు తేరి యూరవేసిన వేయి కొక్కలకును రు 7-4-0 లు అగును. 1 మణుగు పీచును దూరుచేయుటకు పట్టు 125 కాగుల కొక్కలకును రు 0-14-6 అగును. ఇట్లువేసి కొక్కలను పీచుదీయువారికి మరికొంత లాభమును తేర్చి వేయింటికి సుమారు రు 8 లకు విక్రయింపబడుటయు గలదు.

ఇట్లు విక్రయింపబడు కొక్కలను 125 టిని 1 రూపాయికిగొని పీచునుదీసి చేతితో పురిచేసి 9 పేటలుగల ప్రాటినివేయుటకు 12 గురు

2 కొబ్బరికొక్కలందలి నారయేచులు తానినము (Tannin) అనబడు నొకవిధముగు నెరు ద్రవ్యముతోజేరిన పొట్టుచే బంధింపబడి యుండును. ఈ బంధనమునుగూడి నారయేచలు (అనగాపీచు) విడివడుటకే నానినిట్లూరినట్లుగలుగు. తానినమును తీయనీటికంటె సుప్పనీరు బాగుగ గలిగింప గలదు. ఈ యుప్పనీరును, కప్పిన చోటగల బంకమన్నును కలసి, పీచునుబంధించు పొట్టుపైకూడ రాసాయనికముగ గొంతమార్పు గలిగించును.

అడువాండ్రయొక్కయు, నలుగురు మగవాండ్ర యొక్కయు పాటు అనఘము. ఎటూరబెట్టి తీసినపీచుతో వేసిననాటికి పడమటి తీగమున హెచ్చుధరవచ్చును. మగగునకు రు 4-6-0 నొప్పన లెక్క చూచుచో, దిగుబడి మగత్రాడు $7\frac{1}{2}$ వీసెలకును రు 4-2-0 లు వచ్చును. నొక్కకు రు 1-0-0 మినహాయింపగా రు 3-2-0 లు మిగులును. మగవానికి 5 అణాలచొప్పనను అడుదానికి $2\frac{1}{2}$ అ. చొప్పనను కిట్టును.

రాట్నముతో పురిపేనుట, త్రాళ్ళువేయుట :- పైని తెలుపబడినట్లు చేతితో పేసబడుపురియు దీనితో చేయబడుత్రాళ్ళును తగినంత గట్టితనమును సాఫను లేక మురుగుగ నుండుటచే విదేశములంగు వీనికి గిరాకీయు ధరయు లెక్కువ. ఎటికిల తక్కువపాటుతో నింతకంటె మేలుగనుండు సన్నని పురిని పేనుటకు వీలగు రాట్నములు కనిపెట్టబడి తిరువాన్కూరు కొచ్చి నుంస్థానములంగు వాడుక లోనికివచ్చెను. ఒక్కొక్క రాటమునంగు 2-3 క గుళ్ళవలకుండును. రాట్నపుచక్రము నొక యాడుమనిషి లేక పిల్లవాడు త్రొక్కుమండ కగురున కొకరుచొప్పన మరికొందరు కొంతపీచును తమచంకలలో బెట్టుకొని కగురునకంఠించుచుండురు. ఇట్లు పేసిన పురికి మరల యెగురు పురినెక్కింతురు.

ఇట్లు యంత్రచేయమున చేతితో నొక్కొక యాడుగ పేను సామాన్యపు పురికంటె సుమారు $2\frac{1}{2}$ రెట్లపొడవు సన్నపురిని దయారు చేయగలుగుదురు†.

ఇట్లు మేలైనపురిని సులభముగ దీయవీలగు రాటములను నమానానుబట్టి పల్లెటూరి వడ్డంగులకూడ సులభముగ చేయగలరు. 7 తలసంగ్రామమునకు బూర్యపొట్టి రాటపు 4000 రాటముందలి కడుళ్ళసంఖ్యనుబట్టి రు 5-15 లుండెను. ఇప్పుడైనను రు 15-20 లలో చేయించుకొనవచ్చును.

నాల్గొకగుళ్ళగల యిట్టిరాటము నొకదానిని శేయించుకొని పనిచేసి కొనుగో 5 గురు అడువాండుగ్రాకలిసి దినమునకు ఆధమము 7500 అడు

† ఇట్టి సన్నపురి చేతితో తయారుచేయవలెనన్న సామాన్యపు పురిని గంటకు 100 అడుగులు దీయగలుగు మనిషి సుమారు 50 అడుగులె తీయగలడు.

గుల పురిని దయారుచేయగలరు. ఇంగులకు 13 వీసెల (1 1/2 ముసుగు) పీచుకావలెను. పడమటితీరమున నీ 13 వీసెల పీచును తయారుచేయుటకు సుమారు 200 కాయలగొక్కలుపట్టును. వీనినుండి పీచునుదీయుటకు ఇద్దరు ఆ గు నాం గ్రు పనిచేయవలసియుండును. ఈ యిద్దరను గలిసి మొత్తముమీద 7 రు అడువాండ్లను 12 వీసెల ఫణిని దీయగలరు. ఇట్టి పురిధర ము గునునకు రు 6-0-0 * అందుచో 12 వీసెలకును రు 9 లు వచ్చును. అంగుండిగొక్కలు 200కు రు 1-10-0 లు ని నహించిన రు 7 - 6 - 0 లు మిగులును. ఒక్కొక్కమనిషికి ఒకరూ సాముకిపైగా కీట్టును.

వీక్షరములంగు పీచునకుకంటెను, త్రాళ్ళగుకంటెను నిమి క్షేపముగ దీయబడినపరికే యొక్కవ గిరాకీయు ధోయులగుదు. కొవుని పడమటి తీరమున నుత్పత్తియగుపీచు చాలవరికీట్లు పురిగానే విక్రయింపబడుచున్నది.

త్రాళ్ళనువేసి వానికి బాగుగ పురి యెక్కించుటకుగూడ నొక యంత్రము (Rope winch) పడమటి తీరమున వాడుకలో నున్నది. ఇది గత సంక్రామమునకు బూర్వము, మాడిరినిబట్టి రు 15-50 లకు లభించుచుండెను. వీలైన యంత్రముతో 3రు అడువాండ్రు లేక పిల్లలే 15000 అడుగుల పురినుండి 9 పేటల త్రాడును దినమునకు 3 మణులకే (1200 అడుగుల)చొప్పున వేసగలరు. మాడు మణులకు మ1కి రు 7-0-0లచొప్పున లెక్కగట్టుచో నిట్టిత్రాడునకునచ్చు రు 21-0-0లలోను పురిగకు రు 18-0-0 లను ని నహించిన రు 3 లు మిగులును. అనగా మనిషి కొక రూపాయి కీట్టును.

కొబ్బరిపీచు, త్రాళ్లు వగైరాల యుపయోగము:—
కొబ్బరిపీచు ఇదివరిలో సందర్భాను సారముగ నూదించబడినట్లు చాలవరకు

* కొచ్చి కేవలముండి యిప్పటి (17-10-1950) ధర 672 పానుల పుట్టికి గబ్బితనుబట్టి రు 404- రు 472 వరకుండెను. రు 400 ల చొప్పుననే లెక్కగట్టినను వాగునకు రు 15 లగును.

పురిగా చేనబడి దానితో వేయబడు వివిధములగు త్రాళ్ల రూపముననే వినియోగపడుచున్నది. ఇన్నయుగ చేనబడు కొబ్బెరపురితో వెనురు చాప లకు బడులు యిండ్లగులందును వసారాలలోను పరచుట కుపయోగించు బరికములను నేయుటయగును. ముప్పేట త్రాటితో నిదివరలో చెలుప బడినట్లు కావడి యుట్లును, సరుకులను వ్రేలాడదీయునుట్లును కాక, కొబ్బెర కాయలు, నోక్కలు వగైరాలను నెయ్యి చిక్కముల నల్లుటయగును.

కొబ్బెరపీచుతోను ఇన్నపురితోను కాళ్ళుతుడుచుకొనుటకు ద్వారము లవద్ద పరచబడు పీచుచదలు (Door mats) వగైరాలనుచేయు చుండుదురు.

కొన్నితరగతుల నైలుపెట్టెందును బస్సుల వగైరాలలోను కూర్చొ నుటకు లేక పరుండుటకు ఉక్కుతీగచుట్లు (Steel wire springs) లేకుండ తయారుచేసి అమర్చబడు మెత్తనింపుటకు తక్కిన పీచులకంటె కొబ్బెరపీచు శ్రేష్ఠముగ నెంచబడుచున్నది. ఇది వానియంత శీఘ్రముగ నణిపోకపోవుటచే మెత్త త్వరలో కట్టిపడిపోదు.

కొబ్బెరపీచు యేచలకున్నంత బిస (Resilence) మరియే సా మాన్యపు నారయేచకునులేదు. ఈపీచుతో వేసిన త్రాళ్ళు తక్కినత్రాళ్ల కంటె హెచ్చుగ సాగును. ఇందువలనను, ఈత్రాళ్లు తడిసినను తక్కిన వానికంటె చిర కాలము మన్నించేతను, నగులందును సముద్రములందును నిరుగుపడవలను, ఓడలనులాగు లేక లంగరుచేయుత్రాళ్ళును, తెలచాప త్రాళ్ళు వగైరాలగును హెచ్చుగ నుపయోగింపబడుచుండును.

పీచును దీయుట కుపయోగింపబడు డొక్క కాక కొంతడొక్క వంటచెరుకుగ నుపయోగింపబడుచున్నది. డొక్కలను నలుగుగొట్టి పీచును దీయునపుడు రాలుపొట్టుకూడ కుంపట్లలో బొగ్గునకుబడులు ఊకవలెను రంపపు పొట్టువలెను వంటచెరుకుగ నుపయోగింపవచ్చును సామాన్యముగ నిది మెరువుగనే యుపయోగింపబడుచుండును

(ర) కొబ్బెరపీచు, త్రాళ్లు వగైరాల వ్యాపారము, యెగుమతి :— ఆంధ్రదేశమున కొబ్బెరతోటలు కొంత హెచ్చుగ గల గోదావరి మధ్యద్వీపాలో తయారగు పీచును, త్రాళ్ళును, కొంతవరకు స్థానికముగనే వినియోగపడుచున్నను కొంతవరకు తక్కిన తెలుగు జిల్లా

లకును కొన్ని యితరప్రదేశములకును, పడవలమీదను, యితరవిధములను బంపబడి యచటవిక్రయింపబడుచున్నవి. ఈ ప్రాంతములనుండి విదేశపు టెగుమతులచాలతక్కువ. ఇతర తూర్పుతీరపు టెగుగుజిల్లాలోనున్న యిగుసరకు చాలవర కాయాప్రాంతములందును సమీప ప్రదేశములందును సుపయోగపడుచున్నది. వంగి రాష్ట్రమునను బొంబాయి, ఉత్తర రాష్ట్రము లందును స్వామిగు తయారగుపరుకును నాయాప్రాంతపరిసరములందే వినియోగపడుచున్నది. ఇండియాలో నీతోటలులేని యితరప్రదేశములకు వలయు కొబ్బరిపీచును, త్రాళ్లును చాలవరకు పశ్చిమతీరము (తిరువాన్కూరు, మలబారు, కొచ్చి, మైసూరుల) నుండియే కొంతముద్రమాగ్గమునను, కొంతభూమాగ్గమును స్వయయగుచున్నది. ఇంకనుమిగిలినది యాప్రాంతము నుండి విదేశమున కగుమతియగుచున్నది.

గోదావరి మధ్యద్వైపముండి కొబ్బరిపురియుత్రాళ్లును విదేశముల కగుమతియగు రేవుస్థలము కాకినాడ మాత్రమే. ఇచటనుండి యెగుమతి యగుసరకు చాలవరకు ఎవరు పురివేసిన రెండుపేటల పురిమాత్రమే. ఇది సామాన్యము (Ordinary) సన్నము (Fine) అతిసన్నము (Extra fine) అని యీదు తగిలుతులగ (Grades) నెగమతియగు చుండును. గణ్యతతక్కువగు నుండుటచే నీరేవునుండి యెగుమతియగు పురికి ధరతక్కువ. దీనికి సామాన్యముగ పశ్చిమతీరపు కన్యకములకు వచ్చినంతధర మాత్రమే వచ్చును.

పశ్చిమతీరమున పురివైరా లెగుమతియగు ముఖ్యమగు రేవుస్థలము కొచ్చి, కొంత కల్పికొట్ లేక కొజికోడ్ (Calicut or Kozhikode) నుండి ఆయాస్థానిక నామములగు పెక్కురకముల (Grades) పురి యెగుమతియగు చున్నది. ఇందు కొన్ని మరిల సామాన్య (Ordinary) ఉత్తము (Superior) ప్రత్యేక (Special) రకములగు విధజింపబడుచున్నవి. కొచ్చి రేవునుండి యెగుమతియగు రకములలో అలపాట్ (Real Alapat) సన్నపురి (Weaving) అనబడునవి ప్రత్యేకములు. వీనితో ఓడలం గుపయోగపడు లావుపాటి త్రాళ్ళను పేనుదురు. సన్నపురియు అలపాట్ను బరకములు వైరాలనేతకుకూడ సుపయోగించును. ఇంతకంటె తక్కువ రకములకూడ కొన్నిగవు. చొప్పత్రాడు

వంటి కనిష్ఠరకములు (Ropings) కూడ కొన్నిగలవు. వీనిధర సామాన్యముగ మంచి రకముల ధరలో సుమారు సగమే యుండును.

కల్పికోట రేవునుండి యెగుమతియగు పురి కొచ్చినుండి యెగుమతియగు మేలసరకంత బాగుగ నుండకపోవుటచే వీనికిధరకొంచెముతక్కువగ నుండును. అయినను వీపురి కొలంబోనుండి యెగుమతియగు సింహళపు పురికంటె ప్రేష్ఠముగనే పరిగణింపబడుచున్నది.

పశ్చిమతీరమునుండి పురియేగాక కొంతవీచును త్రాడునుగూడ యెగుమతియగుచుండును. కాని వీనియెగుమతులు పురియెగుమతులకంటె చాలతక్కువ.

చెన్నరాష్ట్రపురేవు స్థలములనుండి 1947-48 లో మొత్తపు యెగుమతి విదేశములకు 43,000 టన్నులకు మించియుండెను. ఇందు హెచ్చుభాగము పురియే. దీనివిలువ 5 కోట్ల రూపాయలకు మించెను. ఈయెగుమతులు 1913-14 వ సం॥ న దాదాపు 40,000 టన్నులండెను. కాని యప్పుడు వీనికి కోటిరూపాయలు మాత్రమేవచ్చెను.

చెన్నరాష్ట్రమునుండి విదేశముల కెగుమతియగు సరుకుగాక యీ దేశమందలి యితర రేవులకు సమద్రముమీదుగా 1947-48వ సం॥న 13,000 టన్నులకుపైగా యెగుమతియయ్యెను దీనివిలువ 94లక్షరూపాయలండెను. అనగా టన్నుకు సగటున సుమారు 720 రూపాయలండెను. విదేశముల కెగుమతియైన సరుకున కాసంవత్సరమున సగటున టన్నుకు రు 1,040లు చొప్పున వచ్చెను.

రైళ్ళు వైరా భూమార్గమున నెగుమతియైన పురి, త్రాళ్ళు వైరాల పరిమితుల లెక్కలు లభింపలేదు.

కొబ్బరి చెట్లయాకులు తడకలుగ నట్టి యవి చాపలుగను, పంచె శృంగై పొచుటకును మరుగుదడుల యాచ్ఛాదనకును, యిండ్లకప్పుల నేతకును నుపయోగింపబడుచున్నవి. కాని యీ యాకులందలి నారి యేచలు తాటియాకులందలి యేచలంతగట్టివి కాకపోవుటచే నీతడకలు తాటియాకు చాపలంత బాగుగనుండవు. అంత కాలము మన్నను మన్నవు.

13. నారతోగూడిన దినుసుల నొసగు నితర జాతులు

ఉడివరలో వ్యవస్థాపితమైన ముఖ్యమగు జాతులుగాక చాపలు, తవకలు, బుట్టలు, పేట్టెలు, పొడికలు మొదలగు గృహోపకరణములను దయ్యారుచేయుటకు బలికివచ్చు నారతోగూడిన దినుసుల నొసగు మరికొన్ని జాతులను గరించుకొనడం యొక్రింద సంస్కరణముగ చెప్పబడును.

(౧) ఈత (Wild date-Phoenix sylvestris-N.O. Palmaceae) :- అంధ్రకేశమున తరుచువన్యముగ నే బెరుగుచుండు యీ చెట్టుయాకులందలి యుపదళముల నుర్రెచి వానితోగూడ చాపల 40 వ షట్టము



ఈ త చెట్టు

నల్లదురు. ఈచాపలు నాటియాకులచాపల కంటెను మెచ్చుకాలము మున్నును. వీనియొక్క యందు సామాన్యముగ నెరుకులవాండ్రు మాత్రమే నిపుణులుగ నుండురు.

భిక్షూపచెట్టు (Date-Phoenix dactylifera) చెట్టు పెరుగు చోట్ల వీనియాకులుగూడ నిత్య యుపయోగింపబడుచుండును.

ఆకులు రెంచి వేయబడిన యాత్రలోక భిక్షూరపు జిన్నలను జీల్చి వానితో తట్టలు గంపలు వస్త్రాల నల్లుగరు. ఈవనిగూడ సామాన్యముగ నెరుకులవాండ్రచేతనే చేయబడుచుండును. చీల్చుకొండ నల్లబడు మంటిని మోయు గట్టి తట్టలు తరుచు ఉప్పురవాండ్రచే నొగడుచుండును. అందు వలననే వీనికి ఉప్పురి తట్టలును పేరు వచ్చెను.

ఈత చెట్టును, భిక్షూపచెట్టును గురించి పూర్వ నివ భూమున విప్రుల ముగ చెలుపబడెను. వీనినుండి తీయకలునదీసి బిల్లుమును వండుటన గూర్చి 'చెరుకు, ఇరిచిక్కెర పంటలు' అను సంపుటమున చెలుపబడెను.

41 వ పటము

పేము (Rattan or canepalm-

Calanus rotang- N. O. Palma

ceae):—కొబ్బరి, యాత్ర, భిక్షూర వలె నే

తొలకులుంబనులాజేరు నీమండ్రగల్పింకూడ

చెమ్ము హెచ్చుగల నగులు, వాగులు

మొదలగు ప్రవాహముల యొరలను వన్యముగ

బెరుగుచుండును. దీనికాండ్లము చాల జగియైన

వారియేచులుగ లిగి యుండును. పైజేడు మరింత

గట్టిగను నునుపుగను నుండును. పైబెత్తమున

బడు నిడివిగ్గున కాడలును, వాని చీలికలు లేక

పేర్పును బుట్టలు, పెట్టెలు, కుర్చీలు, నోళ్ళాలు,

మంచుపు చక్రీలు, ఉయ్యెలలోట్టు, చాపలు

వస్త్రాలనుజేయుటకుపయోగింపబడుచుండును.

పేముతో చేయబడినగృహోపకరణములు అంద

ముగను నునుపుగను నుండుటయేకాక చిరకా

లము మున్నును. దీనితో నిర్మింపబడు కుర్చీలు

వస్త్రాలు కర్రసామానులవలె కాతన్యముగ



పేముకు $\frac{1}{10}$ కాయ
(పూర్ణాకృతి)

శకుండుటచే యొక్కవ సౌఖ్యవంతముగ నుండును. పేములో సన్నబెత్తపు రకమునే కాక 1-1½ అంగుళము లావు కాండములు గల రకములకూడ గలవు. ఈ లావుపాటి కర్రలు పేముకుప్పిలు వస్త్రాల కోళ్ళకును లావుగ నుండదగు యితర భాగములకును గూడ నుపయోగింపబడును. వీనిని గుంప కో త్రవ్వ శక్తునుగోసి నునుపు చేసిన లావుపాటి కర్రలు చేతికర్రలుగను నుపయోగింపబడుచుండును.

ఇవ డీదేశమున కుక్కిలు వస్త్రాల నుపయోగింపబడు ప్రశస్తమగు పేపబెత్త మును కర్రలును చాలవరకు మలా కా మొదలగు విదేశముల నుండియే గుమలియగుచున్నవి. అచటి పండితకము కిల్కలను తొలకరిణ్ అనుకూటుగ చోట శల్లనో దీనినాటి పెంచదగను.

పేపపు అహయోగ్యములు. వీనిని గురించి పండ్లు లేని భాగములు దెలుపబడెను.

పేపయ కులు ముండ్లగిరిగియుండుటచే చెప్పుప్రదేశములందీదొంగ నావరణ బెంచవచ్చును.

(3) వెదురు(Bamboo-Bambosa arundinaceae. N. O. Graminaceae- హిం. బాప్స్, అ.యాంత్, సం వంశః): ఇది చెరుకుకంటెను ఏగుల పెద్దగ వెదురు బహువాసక తృణజాతి. చాల యడవులందు వన్యముగ నే పెరుగుచున్నది. వెదురుకర్రలను కలుపుచేర్చు తీర్చి వీనితో గట్టలు, సాంకిలు, తడకలు, చాపలు, చేటలు, జలెళ్ళ వస్త్రాలను దయారు చేయుదురు. కన్న వెదురును నాల్గచీలికలుగ మ్రోమేతీర్చి పసువులసాంకెదలి యలకలు, గండ్లప్రక్క తడకలు వస్త్రాలకుపచరించు బలమైన తడకలనుదురు. కొయ్యంతంధగులవైకట్లబడు యండకు గోడలకు బదులుగూడ నిట్టిబా మైన తడకలనలి మంటిని పేగుటయుగలగు. ఇండ్లకప్పులందు వాడుములపై నిట్టితడకలనలి పైని శోభనాళిపెంకు నేయ బడుచుండును. లావుపాటి గొంగువెదురు పెంకుటిండకు వాసుముగ నుపయోగింపబడుచుండుటయుగ గు. సామాన్యపు వెదుళ్ళు ధూరియిండ్ల కప్పులందు కలవగను దకులు, పంచెళ్ళు వస్త్రాలకును, చెరుకుగుమ్మను అలిచి చెట్లను నిలకట్టుట మొదలుగు నింక ననేక పనులకును నుపయోగింపబడును.

42 వ పటము



వెదురు పొద

వెదురుకర్రలనుండి శ్రేష్ఠముగు కాగి
తములను దయారుచేయుట కుపయోగింప
బడు గొంతుకూడ యంత్రసహాయమున తయారు
చేయబడును. ఈ రేశపు కాగితపు కర్మాగా
రములందీ వెదురుకర్ర విరివిగ నుపయోగింప
బడుచున్నది *. ప్రాతిగిరి లేక కొద్దిగొప్ప
శిథిలమైన వెదురుచాపలు, తిడకలు, బుట్టలు
కైరానుగూడ నానబెట్టి కాగితపుగుజ్జను
చేసవచ్చును †.

ఇతర తృణజాతులు:- వరిసాగు

విస్తారముగల చోట పరిశోధింపు వరిగడ్డియొక్క
కస్పరి కుపయోగింపబడుచున్నది. వరిగడ్డి
నుండియు అరిక మొదలగు నితరజాతులగడ్డి
నుండియు కాగితపు గొంతుగూడ దయారు
చేయవచ్చును. కాని వరిగడ్డి సామాన్యముగ
పసువులకే కాలకుండుటవలన దానినిటుప
యోగింప వీలుండదు. ఈగడ్డి పసువులమేతకు

* ఈ రేశమున తొలి కాగితపుమిల్లు 1867 లో వంగరాష్ట్రమున
నెలకొల్పబడెను. గత సంగ్రామమునాటి రేశమున 11 మిల్లులండెను.
ఇందాంధ్రరేశములోనిపుడు ప్రభుత్వము కొనినడుపుచున్న రాజమహేం
ద్రవరమునందలి గొకటి.

† దూది, జనపనార, గోగునార మొదలగు వానినుండికూడ కాగి
తపుగుజ్జను తయారు చేయవచ్చును. కానియవి బట్టలను, గోనెలములను
దయారుచేయుటకే చాలకున్నవి. సామాన్యముగ శిథిలమైన పెంటపోగు
లలో జేర్పబడు గుడ్డజేలికలు, చింకిగో నెగుడ్డలు, సంచులకైరాలే కాగి

పోను మిగులుచోట నీ గుఱును చేత కాగితముల కుపయోగింప వచ్చును. వరిగడ్డితో తాత్కాలిక మగు ప్రార్థు పే న బ డి తో సి న వరి పైరాల పననుకట్టలగట్టి మోయుట మొదలగు పనులకు తరుమగ నుపయోగింపబడుచుండును. దీనితో పెం తెలుచుట్టి, వీనితో ధాన్యగుల ముడికట్టలను, పురులను గట్టుటయుగలగు. ధాన్యగుల పాతరలలో గూడ గోతిప్రక్కల నీ పెంట్లనుమర్చుట గలదు.

అరికగడ్డిని పసుపులంతగా తినవు గావున ఇది లభించుచోట దీని గుఱును చేత కాగితమున కుపయోగింపవచ్చును.

ముంజగడ్డి (*Sachrum ciliare*) అవురుగడ్డి (*Vetevertia zizanoides*) మొదలగు కొన్ని వన్యజాతులగడ్డికూడ కాగితపు గుఱున కనుకూలమని కనుగొనగడెను. వట్టి శేఖో తడకలనలి వేవిలో ద్వార మలకును కిటికీలకును గట్టి నీరు న్నుంచుచుట్టచే లోనివాయువునకు చల దనమును, పరిమళమును గలిగించుట కుపయోగింపబడుచుండును. ఈ శేఖో నుండి పరిమళ తైలమును దీయుటను గురించి ముంగు తెలుపబడును.

కోపిరిగడ్డి మొదలగు కొన్నివన్యజాతులగడ్డితోనులకను, ప్రార్థను పేనుటయుగలదు.

(౫) తుంగ (Indian sedges - *Cyperus* sp. N. O.

Cyperaceae - హిం. మూతా, సం. మస్తా) :— రెండు జాతుల (*Cyperus corymbosus* and *C. tagitum*) తుంగ వెన్నుల కాడలనుజీల్చి వివిధములగు చాపలనలుదురు. కొన్నిచోట నీతుంగచాపల పరిశ్రమ చాల ప్రాముఖ్యతను విడనియున్నది. సామాన్యముగ నీరునిలచు బంటాయి మొదలగు పల్లపుప్రదేశములందు స్వతస్సిద్ధముగ బెరుగుచుండు తుంగ కాడలే యిందుల కుపయోగింపబడుచుండును. కాని కొన్నిచోట్ల

తపుగుఱును తయారుచేయుట కుపయోగింపబడుచుండును. ఇది వరి లో తెలుపబడినట్లు అరటిడిప్పలనుండికూడ కాగితపుగుఱును దయారుచేయు వచ్చును. ఇట్లు మితముగలభించు నారదినుసులగుఱు సామాన్యముగ చేత కాగితములను దయారుచేయుటకే నుపయోగింపబడుచుండును.

వీనిని బ్రత్యేకముగ నాటి బహువాష్టికముగ బెంచుటగలదు. అనుకూలమగు చోట్ల దీనిని నిరివిగ బెంచి యాపరిశ్రమను వ్యాప్తము చేయదగినది.

తుంగను బెంచుటకు, చిరకాలమునుండి నీటిలో బెరుగు నిట్టి జాతులు పుట్టుచు, చచ్చుచునుండు చెరువు గడ్డములు బంటాగోతులు మొదలగు సత్తువైన పల్లపు ప్రదేశము లనుకూలములు. సంవత్సరము పొడవు నను తరుచు నీటిని బెట్టవలసియుండునుగాన పైకి నోడవనకరము లేకుండి నీరుగట్టుచుండ వీరి చోట్లనే దీనిసాగు లాభకరముగ నుండును. నేలను శీతకాలాంతమున తగినంతలోతున నెరదీయగానే బెల్లనిచ్చి, యితర జాతుల నుండును వేచివేడిమికి చచ్చునట్లు చేయవలెను. తొలకరికి ముంగు పసుపులయెరువు నెకరమునకు 30-50 బండ్లవరకు దోలి వగముకురియగానే పరచి కలియుచున్నవలెను. కొంచెము నీరు చేరగానే వరిచేనికవలెను రెండు సార్లు దమ్ముచేసి లభించుచో 4-5 బండ్ల పచ్చికొట్టును పరచి త్రొక్కి యాక్రమణ వెనుక మరల దమ్ముచేసి సుమారు 8-9 అం. యెక్కుగ నెడిగిన పిల్కలను సంపాదించి 6 అంగుళముల కొకటి చొప్పున నాటవలెను. పిమ్మట తగినంత నీరుజేరినచో వరిచేనికవలెనే అప్పుడప్పుడు నీరుకట్టుచు రావలెను. వర్ష కాలాంతమునుండి తరచుగ అధమము వారమునకు 2 సార్లు నీరు కట్టుచురావలెను. అప్పుడప్పుడు (3-4 సార్లు) కలుపుతీసు వలెను. మరుచటి వేసవి (మేనెల) నాటికి కాడలు తొలిసారి కొతగు వచ్చును. అటు పిమ్మట ప్రతి సంవత్సరమునను జూలై నెలలో నొక సారియు, డిసెంబరు నెలలో నొకసారియు 25-30 బండ్ల చొప్పున పసుపుల యెరువును పంచి వెధుటనే కలుపుతీయించవలెను. ఈ పనిచేయు వాండ్ల కార్త్రత్రొక్కుడువలన నీ యెరువు నుంటిలో కొంతవరకు గలిసి పోవును. తగినంత నీరు నిలువనియపుడెల్ల నీరు కట్టుచురావలెను. అవగర మగుచో మరియొకటి రెండుసార్లు కలుపుతీయుచుండవలెను. ఇటు చేయుచుండుచో నేటిట సాగుకు రెండుసార్లు (నవంబరులో నొక సారియు, మేలో నొక సారియు) కాడలను గోసి కొనుచుండవచ్చును.

ఈ కాడలను గోసినవెంటనే వానిని పొడవు, లావువారీగా విడ దీసి యెండబెట్టవలెను. పిమ్మట వీనిని వానిలావునుబట్టియు అల్లవలసిన చాపల దళమునుబట్టియు, ఒక్కొక్క కాడను 2, 4, 8 లేక 12 చీలికలుగ

జేసి కట్టుకట్టి వామివేసి, క్రమముగ నుపయోగింపవచ్చును, లేక యితరులకు విక్రయింపవచ్చును.

తగినంత లాభకిరముగ నున్నంతవఱకు పెంచుచు పిమ్మట నేలకు కొన్ని సంవత్సరములు విశ్రాంతియిచ్చి మిగిల నాటవచ్చును.

పైనసూచింపబడినవిధమున పనిచేయుచో సామాన్యముగ వొక్కొక కోతకు సుమారు 100 *కాపుల (సుమారు ౨0 మైలుమారులు) యెండిన కాడలు లభింపవచ్చును.

తొలిసంవత్సరమున సుమారు రు 375-400 లు వ్యయముగ ననియు, నాసంవత్సరపు రాబడి కొంచెమించుచు దీనికి సరిపడననియు, తరువాతి సంవత్సరములలో నేలేటరు 275-300 లవ్యయమునో రు 700 — 800 రావచ్చుననియు నంచినా వేయబడెను.

(౪) జమ్బు (Indian bulrush-Typha elephantina- N. O. Typhaceae):— తుంగవలెనే నీరు నాచుగనిలచు బంటాకోసుల మురగ కోళ్లు ముదలగు వానిలో స్వతస్సిద్ధముగ బెరుగుచుండ నీగల్బులయొక్క దళముగను సుమారుక యగులక్షమువఱకు పెడల్పును 1½-2 గజము వరకు పొడవును గలిగియుండును వీనినెండబెట్టి తుంగచాపలకంటెను దళముగనుండు చాపలగ నల్లమంగరు. ఈచాపలను జల్లవలెట్టి బండవై నవర్చి ధాన్యమును దోలటయు, పొణక రూపమునట్టి ధాన్యములను నిల్వచేయుటయుగలగు. ఈ యాకులతో పనినాండ్రు వర్షకాలమున తడియకుండ నెట్టివైచుండి క్రిందివిధముగ పప్పు కొని పనిచేయవలెగు గూడలనుచేసివాడుటయు విక్రయించుటయుగలను.

14. పట్టుపురుగుల కాహారమునొసగు

జాతులు

పట్టుదారము కొన్ని జాతుల కీటకములు కోశస్థశలో
గట్టుకొను గూళ్లనుండి తీయబడుచున్నది. మేలై నపట్టుతూతిక
(Mulberry) ఆకులను ఆహారముగబెట్టి పెంచబడు నెక

43 వ పటము

సూ త క తు ప్ప లు $\frac{1}{40}$

జాతి పురుగులగూళ్ళనుండి తీయబడుచున్నది. ఈపట్టే ప్రపం
చమున విరివిగ నుత్పత్తిచేయబడుచున్నది. ఈజాతి (Bom-

byx mori)పురుగులను బెంచుటకుగాను వలయు తూతిక తోటలును విరివిగ బెంచబడుచున్నవి. తూతిక చెట్ల పెంపకమును గురించి పండ్లు - నాలవ భాగమున దెలుపబడెను.

అముదపు చెట్లయాకులనుదిని పెరుగు మరియుక జాతి (Erisilk worm *Attacus ricine*) పట్టుపురుగులు కూడ కొన్నిచోట్ల పెంచబడి కొంతపట్టు తీయబడుచున్నది.

పొత్తిపట్టు అనునది (Tassar silk వన్యముగ బెరుగు చెట్లయాకులనేదిని పెరిగి గూఢ్మకట్టుకొను మరియుక జాతి (*Antharia posphia*) పురుగుల గూళ్ళనుండి లభించుచున్నది.

కృతకపు పట్టు (Artificial silk) అనునది రాసాయనిక సంస్కరణము గావింపబడిన చూడి, లేక కర్రలగుజ్జలోని సెల్యూలోసు (Cellulose) నుండి దీయబడు మృగజైవ దారము. చూడినుండి తయారుచేయబడు రేయన్ (Rayon) అనబడు కృతకపుపట్టు కర్ర గుజ్జనుండి తయారుచేయబడు విస్కోజా (Viscose) కంట్రెక్స్ పైమెనది. కృతకపు పట్టు కర్మాగారములు జపాన్, అమెరికా, విరోపాలలో చాల చోట్ల గలవు. ఇటీవల నిండియాలోగూడ దీనిని దీయు కర్మాగారము కటి పడమటి తీరమున నెలకొల్పబడెను.

ఆయా నారలదిగుబడిని బట్టి పట్టిక

నారకము	దిగుబడి పానులు	కర్రల, మట్టలు వగైరాల తానికపై నార దిగుబడి %
A. ఏక వార్షిక జాతులు		
1 శమము ఎకరము 1కి	500-800	3% (ఎండినకర్రలతానికపై)
2 గోగు ,,	600-1000	3½-4% (పచ్చికర్రల తానికపై)
3 కాట్ ,,	1000-1200	4-5% ,,
4 సీమయవిసె ,,	300-120 100-120 (సీమ)	15-16% (ఎండుకర్రల తానికపై)
B. బహు వార్షిక జాతులు		
1 రియా ఎకరము 1కి	600-800	3-5% (పచ్చికర్రలతానికపై)
2 కిత్తనార ,,	600-800	2-2½% (పచ్చిమట్టల తానికపై)
3 సిస్టోనార ,,	1000-1200	3-3½% ,,
4 సాగనార ,,		2½% ,,
5 అనాసనార ,,		2½% ,,
6 అరటివార (చేశవాడి) ,,		1-1½% ,,
7 మనిలా అరటివార ,,		1-2½% ,,
8 తాటివార (10-15 సం॥ వయసు చెట్లనుండి 1000-కి ...)	250	30-33% (జమటలతానికపై)
9 శేకలేక ముడిచెట్ల జమటలు 1000 కి కాబ్బెరపిచు-1000	125	20-25% ,,
కాయల దొక్కలనుండి	150-250	

కొన్ని ముఖ్య జాతుల నారతో
 పేనిన సమానలావు త్రాళ్ల తారతమ్యబలమును
 దెలుపు పట్టిక

(మూల త్రాడుబలము 100x. నెంచినచో

1. నూలుత్రాడు	100
2. జనుము	115
3. గోగు	84
4. కిత్తార	105
5. సాగనార	91
6. కొబ్బెరపీచు	65
7. జిల్లేడునార	160

II చమురు దినుసులు

చమురులలో చాల భాగము నూవులు, ఆముదములు మొదలగు గింజలనుండియు, తత్తుల్యమగు కొబ్బెర, జీడిపప్పు మొదలగు వానినుండియు లభించుచున్నవి. బియ్యము, గోధుమలు, కాయధాన్యములు వగైరా అన్ని జాతుల గింజలందును చమురు ఏదోకొంత యుండును. కాని చమురు హెచ్చుగ-సామాన్యముగ నూటికి 25 వంతులైనను-నుండు జాతుల గింజలనుండియే చమురు తీయబడుచుండును†.

† అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములలో నూటికి 20 వంతులకు తగ్గి యుండు ప్రతిగింజలనుండి గూడ చమురు విరివిగ తీయబడుచున్నది.

గింజలనుండి లభించు చమురులు చాలవరకు స్థిరతైలములు (Fixed oils) అనగా గాలిపారినను శీఘ్రముగ నారిపోయి హరించనివి. ఉ: నూవులనూనె, ఆముదము.

కాని యీస్థిరతైలములలో నీమయవినెనూనె (Linseed oil) మొదలగు గొన్ని యేవస్తువులకైన పలుచగ బూసినచో గాలిపారి కొన్ని మార్పులనొందుటచే కొంత త్వరలో నారిపోయి యావస్తువు జిడులేక మరల పొడిగానగును. ఇట్టి చమురులు శోషక తైలములు (Drying oils) అనబడును. నూవు, పేరుసెనగ మొదలగునవి యింత శీఘ్రముగ మార్పునొందక చాలకాలము జిడుగనే యుండును. ఇట్టి చమురులు అశోషక తైలములు (Non-drying oils) అనబడును*. స్థిరతైలములలో చాలభాగము సామాన్యపు శీతకాలపు చలికి పేరుకొనక ద్రవరూపముననే యుండును. కొబ్బెరనూనె వంటివి కొన్ని స్వల్పమగు చలికే నేయివలె పేరుకొనును†.

‡ ఇట్టి స్థిరతైలములు కర్బనము, ఆమ్లజని, ఉదజని అనుమాడు మూల ద్రవ్యములు గలవి. స్నేహామ్లములు (Fatty acids) అనబడు వొక తరగతి ఆమ్లములతోగూడిన సంకీర్ణసంయుజ్యములు. చాలవర కాయముల గ్లిసరిడములు (Glycerides) ఎస్టర్లు (Esters) అయియుండును.

* ఇట్టి చమురులలోని ముఖ్య ద్రవ్యము లినోలిక్ (Linolein) అనునది.

† ఇట్టి చమురులలోని ముఖ్య ద్రవ్యము ఓలీక్ (Olein) అనునది.

‡ ఇట్టి చమురులలోని ముఖ్య ద్రవ్యము స్టీయరిక్ (Stearin) అనునది.

పై రెండువిధముల చమురులునుగాక, వాము, ఏలకులు మొదలగు కొన్నిజాతుల గింజలనుండియు*, నిమ్మగడ్డి (Lemon grass) మొదలగు కొన్నిజాతుల యాకుల నుండియు, వట్టి వేళ్లు (Cuscuss roots) మొదలగు కొన్నిజాతుల వేళ్లు నుండియు, గులాబీ మొదలగు కొన్నిజాతుల పూవులనుండియు, నారింజ గణమునందలి కొన్నిజాతుల పండ్ల ఫలకవచముల (తొక్కల) నుండియు అస్థిరతైలములు (Volatile or essential oils) అనబడు మరియొక తరగతి చమురులు స్వల్పముగ లభించుచున్నవి. ఇవి గాలిపారుచో నీరావిరియై పోవునట్లు వాయురూపము నొంది శీఘ్రముగ హరించిపోవును. కొంతవరకీ యస్థిరతైలములుకూడ శోషక తైలములవలె ప్రాణవాయు సంయోగము వలన మార్పులను చెందుటయుగలదు. కావున వీనిని గాలి చొరకుండ మూతపెట్టిన పాత్రలందే నిల్వచేయవలగును. పైని పేర్కొనబడిన ఆయాద్రవ్యములందీ యస్థిరతైలములు స్వల్పముగ నున్నను వీనియుపయోగముయొక్క ప్రాముఖ్యతనుబట్టి యివి తీయబడి వినియోగింపబడుచున్నవి.

* గుళయావు బులుంబమునందల వాము, జులగ్ర మొదలగునవి సామాన్యముగ గింజలని భృతహరింపబడుచున్నను, శాస్త్రరీత్యా యివి ఫలములే.

అస్థిరతైలములును† స్థిరతైలములవలెనే చాలవరకు ద్రవములే. హారతి కర్పూరమునంటి కొన్ని ఘన ద్రవ్యములునుగలవు. ఇవి ద్రవరూపము నొందకయే గాలిపారిన కొలది వాయురూపముచుజెంది హరించును.

చమురుదీనుసులకు సంబంధించిన పరిశ్రమలలో ఆయా ముడివస్తువులయంకి చమురునుదీయుట ముఖ్యమైనది. ఈ చమురుదీయు విధానము దీను సు యొక్కయు, చమురు యొక్కయు స్వభావముననుసరించి ఈ క్రింద దెలుపబడినట్లు వివిధములుగ నుండును.

I. స్థిరతైలములను దీయువిధానములు :—

A. వంటపద్ధతి. ఉ: కొబ్బెర, అముదకు వగైరాలు. ఈ పద్ధతిని ఎవరియింట వారు తమ స్వోపయోగమునకు వలయుశ్రేష్ఠముగు చమురును స్వల్పముగ దయారు చేసికొనవచ్చును. కాని యీ విధాన మిప్పుడు చాలవరకంతరించెను.

B. ఒత్తిడి పద్ధతి.


1. పెళుపులచే ద్రిప్పబడు గానుగలతో:—ఇది నూవులు మొదలగు గింజలనుండి చమురు దీయబడుచుండు సామాన్య విధానము.

† అస్థిరతైలములలో చాల భాగము కర్బనము, ఉదజనియను రెండు మూలద్రవ్యముల సంయుజ్యములు. కొన్ని యస్థిరతైలములలో అమలజనికూడ చేరియుండుటగలదు. ఉ: హారతికర్పూరము. కొన్నిటిలో గంధకముకూడ జేరియుండును. ఉ: జెలులిలోని యస్థిరతైలము.

ప్రతి గ్రామమునను నీ పరిశ్రమవలన కొన్ని కుటుంబములు జీవించుచున్నవి. చాలచోట్ల సామాన్యముగ నుపయోగమున నున్న కేశవారీ గాను

44 వ పటము

A.



మగ్గ వాడీగానుగ $\frac{1}{8}$

1. కోట-పైభాగము; 2. కోకలి;

3. పిండిని కదుపుకోల; 4. బా; 5.

పంకము లేక బామ్మకొయ్య; 6. నీల

కర్ర; 7. చమురు వెలవడు దోసె;

8. సంభిత్రాడు.

గలు ఆభిలభారత గ్రామ పరిశ్రమల సంఘమువారిచేతను. చెన్నరాష్ట్రపు పారిశ్రామిక శాఖవారిచేతను, అంత కంటే హయ్యు చమురును దీయగలుగునట్లు కొన్నిసంస్కరణలు గావింపబడియున్నవి. కేశవారీ గానుగతో వేరుసెనగగింజలనుండి 40% చమురు రాగా ఆభిలభారత పరిశ్రమల సంఘమువారి మగ్గ వాడీగానుగతో 44% చమురు దిగుబడి యయ్యెను.

2. మనుష్యులచేద్రిప్పబడు

ఒత్తిడి మరయంత్రములతో:-

ఒకప్పడిది చాలప్రాముఖ్యతనువహసియుండెను. అందుమను, వేరుసెనగ నూనె, కొబ్బెనూనెయు నిటు తీయబడుచుండిన ముఖ్యమగు చమురులు. ఇప్పటికిని పారిశ్రామికోపయోగమునకు వలసినతమదము వేరుసెనగ

వగైరాల చమురిట్టి యంత్రములతోనే కొంతవరకు దీయబడుచున్నది.

3. శక్తియంత్రములతో:-

ఇందుల కుపచరించు యంత్రములు మరల మూడు విధములు: